



# Prevalor®

80 WG

**ΠΡΕΒΑΛΟΡ 80 WG**  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:**  
Το Prevalor 80 WG είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Χάρη στη διασυστηματική δράση του, το Prevalor 80 WG επιτυγχάνει τη διάφορη των φυτικών αμυνών του φυτού και δρα αποτελεσματικά κατά των μυκήτων που συνδέονται άμεσα με τη φυτόσφαιρα (Phytophthora), καθώς και κατά ασθενειών που προκαλούνται από δασύμυκη όπως το βακτηριακό κλάμμο (Επίθετα απηνόσκη-αχλαδιά).

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος.  
**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναθεωρώντας συνεχώς.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**  
**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**  
**ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:**  
**ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ "NASHI" (ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΟ), ΚΥΔΩΝΙΑ:**  
Βακτηριακό κλάμμο (Επίθετα απηνόσκη). Ψεκασμοί φυλλώματος.  
**Μεσοστάσιμα εφαρμογών:** 3-4 ημέρες. Προληπτικές εφαρμογές την περίοδο της ανθοφορίας από το στάδιο του «φουσκώματος» των οφθαλμών και ανάλογα με τις συνθήκες και την πίεση της προσβολής. Εφαρμόστε 3-4 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή (3η εφαρμογή). 3-4 ημέρες αργότερα μπορεί να είναι απαραίτητη και μία 3η εφαρμογή στην περίπτωση που ο κίνδυνος μόλυνσης του φυτού είναι μεγάλος και η ανθοφορία παρατείνεται.  
**Δόση:** 375 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

**ΜΗΛΙΑ:** Φυτόσφαιρα (Phytophthora spp.). Ψεκασμοί φυλλώματος.  
Α) Στο φυτόκο εφαρμοστεί έναν ψεκασμό το μήνα κατά την περίοδο της βλάστησης και μέχρι 4 φορές το χρόνο. Β) Σε ανήλικα δένδρα εφαρμόστε προληπτικά. Κατά την ανθοφορία. Ένα (1) μήνα μετά την ανθοφορία. 2 μήνες μετά την ανθοφορία. Για θεραπευτική προστασία εφαρμόστε έναν (1) ψεκασμό κάθε μήνα κατά την περίοδο της βλάστησης με όρα τις 4 εφαρμογές.  
**Δόση:** 250 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 4.

**ΕΞΕΡΙΑΔΕΙΑ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΔΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΝΕΡΑΤΣΙΑ, ΓΚΡΕΠΙ-ΦΡΟΥΤ, ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ):**  
Φυτόσφαιρα (Phytophthora spp.). Ψεκασμοί φυλλώματος. Τρεις (3) εφαρμογές την άνοιξη. Στις αρχές του Ιουλίου (2ο κύμα βλάστησης). Το Σεπτέμβριο (με το τέλος του 2ου κύματος βλάστησης).  
**Δόση:** 250 γρ. σκ./στρέμμα.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 200-400 λίτρα/στρέμμα.  
**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.  
**ΠΕΠΙΟΝΙ (ΥΓΕΙ):** Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis). Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.  
**Δόση:** 400 γρ. σκ./στρέμμα.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα.  
**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.  
**ΦΥΛΛΟΜΙΑ (ΥΓΕΙ):** Σπίνες Λιμού, Φυτόσφαιρα (Phytophthora fragariae, Phytophthora cactorum).  
Α. 1η χρονιά της φύτευσης μία (1) εφαρμογή κατά τη φύτευση, και μετά 1-2 εφαρμογές τον επόμενο μήνα της εφαρμογής.  
Β. 1η χρονιά παραγωγής την περίοδο της άνθησης με την έναρξη της βλάστησης 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα ενός (1) μηνός. **Δόση:** 500 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-70 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

**ΡΑΔΙΚΙ:** Φυτόσφαιρα (Phytophthora oenotherae). Εμβάπτιση ριζών (ριζών) δόρυκας 1-2 λεπτών, κατά τη μεταρύτεση (σπορέο). **Δόση:** 375 γρ./100 λίτρα νερού. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.  
**ΡΑΔΙΚΙ (Υ):** Φυτόσφαιρα (Phytophthora oenotherae). Μία (1) εφαρμογή ανά έτος. Ψεκασμός του υπέργειου τμήματος (φυλλώμα) κατά τη μεταρύτεση (σπορέο).  
**Δόση:** 15 γρ./στρ. μέτρο. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 1.  
**ΡΑΔΙΚΙ (Υ):** Φυτόσφαιρα (Phytophthora oenotherae). Δύο (2) εφαρμογές ανά έτος. Ψεκασμός του υπέργειου τμήματος (φυλλώμα). **Δόση:** 500 γρ. σκ./στρέμμα.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-80 λίτρα/στρέμμα.  
**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2.  
**ΛΥΚΙΣΚΟΣ:** Περονόσπορος (Pseudoperonospora humuli). Ψεκασμός φυλλώματος με μεσοδιάστημα 14 ημερών.  
**Δόση:** 625 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 60-80 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**  
1. Σε περίπτωση εφαρμογής στο υπέργειο τμήμα ραδικού να μην εφαρμόζεται το Prevalor 80 WG σε συνδυασμό με άλλο σκεύασμα κατά την περίοδο του «δυναμώματος».  
**ΣΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΜΗ:**  
Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά τύπου "Nashi" (Αχλαδόμηλο), Κυδωνιά: 28 ημέρες. Επισπερδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεράτζι, Γκρεπ-Φρούτ): 15 ημέρες. Πεπόνι: 3 ημέρες. Φράουλα: 14 ημέρες. Ραβδί - 1 εφαρμογή/έτος (εμβάπτιση ριζών / σπορέο): 21 ημέρες. Ραβδί - 2 εφαρμογές/έτος: 14 ημέρες. Λυκίσκος: 14 ημέρες.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** 24 ώρες.  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:**  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστάμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές αειθαλωματικές συνθήκες.  
**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**  
Η αποσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψόμενος τουλάχιστον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Το κενό υλικό σκευάσματος εξετάσσεται από πίεση ή γίνεται τεμπλό έλεγχο (τα νερά του ετελλώματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχήσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποθίνονται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**  
Διατηρείται το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό προστατευμένο από υγρασία, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.  
**ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:** Βλέπε συσκευασία.



Διανομέας:  
**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**  
Μεσογίων 335, 15231  
Χαλάνδρι  
Τηλ.: 2106726381  
Fax: 210 6749514-5



Bayer Ελλάς ABEE  
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000  
Fax: 210 6109100  
www.cropscience.bayer.gr

P28831



# Prevalor®

80 WG

1 kg e

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 60379/16-07-2013

**Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)**  
Εγγ. Σύνθεση: fosetyl-AI 80% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 16,67% β/β

## Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

με προστατευτική και θεραπευτική δράση

ΠΡΟΣΟΧΗ



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**  
Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ABEE  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100



# Prevalor®

80 WG

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**  
• Προκαλεί σοβαρά οφθαλμικό ερεθισμό. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**  
• Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από πρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα απομικρικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανθεκτική ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια ανθεκτική ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ**  
**Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**  
• Εάν δεν υποχρεώ ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση συγχύματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.  
Απομακρυνθείτε από την επείγουσα περιοχή. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα που διαρκούν, ζητήστε απεχτή βοήθεια.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** μετακινήστε στον καθαρό αέρα.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400 και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε τα καλά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε αμέσως γιατρό. Θεραπεία του ματιού από οφθαλμίατρο.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ειδοποιήστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία.  
**Πληροφορίες για το Γενάρ:**  
**Αντίδοτο:** δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

Γραμμή έκτακτης ανάγκης Bayer 24/7 από σταθερό: **800 1135 335** από κινητό: **210 6166 332**



C 10 7041 19