

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιομόρφος ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων με 10-40 λίτρα ψεκαστικό υγρό ανά στρέμμα, ανάλογα την καλλιέργεια και πίεση ψεκαστικού έως 2 ατμόσφαιρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απορροπτικού νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστάσιμη δόση σκευάσματος αναδύοντάς το συνεχώς. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΞΥΡΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Μη μιλάνετε λίμνες, κανάλια και γενικότερα υδάτινους πόρους, με το σκίασμα ή τις χρησιμοποιούμενες συσκευασίες του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ζεπάνι είναι υπό πίεση ή γίνεται τριπλό βάλανμα (να νερό του ζεπάνι μόνον ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπτά για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης ενσωπώνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε το ψεκαστικό μηχανήματα τελείως. Καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος με καθαρό νερό. Ζεπάνι με το ψεκαστικό με καθαρό νερό το οποίο θα περάσει και από τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10 της χωρητικότητας του ψεκαστήρα με νερό. Αδειάστε και πάλι τον ψεκαστήρα. Επανεκλάβετε τη διαδικασία προσθέτοντας ένα κατάλληλο για το σκοπό αυτό απορροπτικό αφού γεμίσετε κατά το ήμισυ το δοχείο με νερό. Αναδείψτε και περάστε το διάλυμα από τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού και αφήστε το μίγμα νερού και απορροπτικού να σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον αναδύοντας συνεχώς. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να καθαριστούν ξεχωριστά με απορροπτικό και καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε το νερό με πίεση από σωλήνες και ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Μην ψεκάζετε τα απόνερα σε υαλοθώρακες καλλιέργειας ή χωματόφρακτα που προορίζονται για τη σπορά υαλοθώρακων καλλιέργειας.

ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΑΠΟΧΩΝΕΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρες ήλιο, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μέσα στην αρχική και απορροπτική συσκευασία του, προστατευμένο από υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, το σκίασμα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Περιεχόμενο: 75 γρ.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
Βλέπε στην επιφάνεια της φιάλης



Lontrel
720 SG

ZIZANIOKTONO

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Ευγυνήμενη σύνθεση:
clorpyralid monoethanolamine: 94,9% β/β
(clorpyralid ισοδύναμο οξύ: 72 % β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 0.11 % β/β

A.A.D.A.: 70018/28.01.2013



Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλον ζιζανίων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

** Εμπιστοσύνη στην Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΔΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου ή περίεχου ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς. Μαζέψτε τη χυμώδη ποσότητα.

ΠΡΩΤΕ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικές συμβουλές: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο ασθενής είναι ανίσθητος ή έχει σπασμούς.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με καθαρό νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επικοινωνήστε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε τις οδηγίες συμπτωμάτων.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SSG (24/7): +302105714417

Για να αποφευχθεί επιβλάβη για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μη ρυπαίρετε τα νερά με το σκίασμα ή τα κενά της συσκευασίας του.

Για να προστατέψετε τα επιτήματα να χρησιμοποιήσετε το σκίασμα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αμείκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιτηματικά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αμείκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από ακαλλιέργητη γη.

Κάτοχος της άδειας:

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Υπόγειο 2 και Λ. Κηφισού 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα,

Τηλ.: +30 2106889700

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στη αγορά:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι,

Τηλ.: 213 006 5070



ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΕΛΙΔΑ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το LONTREL 720 SG είναι εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλον ζιζανίων των οικογενειών Compositae & Leguminosae και εφάρμογο εδάφη των ειδών Solanaceae, Polygonaceae & Umbelliferae. Το δραστικό του συστατικό ανήκει στην Χημική Ομάδα των Pyridine Carboxylic Acids. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται τόσο μέσω των ηθμωδών όσο και των ξυλωδών αγγείων. Συγκεντρώνεται δε στους μερισματικούς ιστούς. Τα ζιζάνια μετά τον ψεκασμό δείχνουν συμπτώματα επίδρασης αυτών (φυτο-ορνίθια). Τα κύρια συμπτώματά είναι η οξυμένη αναπνοή οδηγεί στο θάνατο του ζιζανίου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. **Υγκος ψεκαστικού υγρού:** 10-40 λίτ./στρέμμα. **Χορηγούμενη δόση:** 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως τον κλείσιμο των γραμμών. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Ελακοκράμβη ερμηνή: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπουκιών. Εφαρμόσιμη μόνο την Άνοιξη. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1.

Ελακοκράμβη χειμερινή: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπουκιών. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Αραβοσίτος: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 2 κόμβων. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1.

Σόργο: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 8 φύλλων. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Παντζάρι: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή μέχρι το κλείσιμο των γραμμών. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Δασικές εκτάσεις, Λιβάρι για κλωστοϋφαντουργεία: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Καλλιέργειες για σποροπαράγωγα (κρεμμύδι, πράσο, σπινάκι, σπανάκι, πατάνακι, λάχανο, παντζάρι, κουνούδι, γοργόλιθο, κόκκινο λινάρι, σπανάκι και άλλα): Δόση: 14 γρ./στρέμμα. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1.

ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ (Κουά και άλλα): Κατάλληλο στο έδαφος κατά το έλεγχό τους:

Α. ΕΥΑΣΤΙΝΑ ΕΩΣ ΠΛΟΥ ΕΥΑΣΤΙΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: Α1. ΠΟΛΥΤΗ: Κίρσο Από 15 cm ύψος και πριν την εμφάνιση ανθικών οργάνων. Πικρία: Πριν τα 6 φύλλα. Λαούρα: Από 15 έως 20 cm. Ζυχός: Από 5 έως 8 φύλλα. Μηδική (shoots): Ως την ανθοφορία. Τριφύλλι: Ως την ανθοφορία.

Α2. ΕΠΙΘΑ: Ανθίμια: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Καντάρο: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Χρονόβηθος: Από 2 έως 6 φύλλα. Νταούρα: Από 2 έως 6 φύλλα. Κουά: Τα 2 φύλλα. Γαλιανόβηθος: Από 2 έως 6 φύλλα. Πικρία: Από 1-2 φύλλα. Ζυχός: Από 2 έως 6 φύλλα. Λασιόνα: Πριν την άνθηση. Χαμομήλι: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Σενικό: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Ηλιάνθος: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. Ανθρίκο: Πριν την άνθηση.

Β. ΖΙΖΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΑΣΤΗΤΑ: Πολύγωνα: Στα 1-2 φύλλα. Αστροκίφολος: Στα 1-2 φύλλα. Αιθούα: Στα 2 έως 6 φύλλα. Παράληθα: Στα 2 έως 6 φύλλα. Χαμαλέκια: Από το τέλος της εμφάνισής του.

ΤΑΡΑΧΙΝΗΕΙΣ: 1. Η αποτελεσματικότητά του LONTREL 720 SG δεν είναι ικανοποιητική ενάντια σε βότα, πολύγωνα, οξυάλιδα, μακάρι, Epilobium spp., τσουκνίδα, καλλισπίδα (Galium sp.), στέλλα, γυνοπέδιο, και ζιζάνια των οικογενειών Cruciferae και Lamiales.

2. Ελακοκράμβη: Αφού οι εφαρμογές πραγματοποιούνται από το τέλος του χειμώνα ή την αρχή της άνοιξης δηλαδή 5-6 μήνες μετά τη σπορά της καλλιέργειας, τα ζιζάνια βρίσκονται συχνά σε στάδιο ανάπτυξης που προχωρημένο από το καταλληλότερο για την εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται έντονα η προσεκτική λαούδι (με τη μορφή προθετού στο ψεκαστικό μίγμα και στη δόση 0,174 kg του LONTREL 720 SG.

3. Αραβοσίτος: Μέχρι το ύψος των 80-70 cm, πριν η καλλιέργεια καλύψει και νεκρώσει το ζιζάνιο.

4. Δασικές εκτάσεις: Να χρησιμοποιείται μετά τη φύτευση ή όταν τα νεαρά φυτά έχουν περάσει την ηλικία του 1 έτους μετά τη σπορά. Σε κάθε περίπτωση το LONTREL 720 SG δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν περάσει ένας χρόνος από τη μεταφύτευση ή τη σπορά. Εκλεκτικότητα στα δασικά είδη: Το LONTREL 720 SG είναι εκλεκτικό για τα ακόλουθα δασικά είδη:

Abies nordmannica, Abies pectinata, Piceas abies, Picea omatica, Pinus cembra, Pinus nigra, Pseudotsuga douglasii, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Eucalyptus europaea, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Sorbus aria, Syringa vulgaris. Για όλα τα άλλα είδη, είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε τους κατάλληλους οργανισμούς ή το τεχνικό τμήμα της Dow AgroSciences σχετικά με την εκλεκτικότητά του LONTREL 720 SG.

5. Παντζάρι: Χρησιμοποιείται σε διαδοχικές εφαρμογές με δόση 8,7 γρ./στρέμμα, με μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 7-10 ημερών.

6. Στην περίπτωση των καλλιεργιών για σποροπαράγωγα: Να μη χρησιμοποιείται το LONTREL 720 SG σε συνδυασμό με λάδι.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΝΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχειρίση ανθεκτικότητας: Οδηγίες για χρήση επ' **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Α.Π.** Το LONTREL 720 SG είναι πιο αποτελεσματικό όταν ψεκάζεται την περίοδο που τα επιτήματα πλατύφυλλα ζιζανίων είναι στα αρχικά ευαίσθητα στάδια. Στα πολυετή να εφαρμόζεται στην πλήρη άνθηση. Το LONTREL 720 SG συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε ακραίες κλιματικές ή οργανωτικές συνθήκες (πχ. Κρύος καιρός, ξηρασία, φτωχή γονιμότητα εδάφους, θερμοκρασία πάνω από 25° C, κ.λ.) που δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών. Στην περίπτωση που εφαρμόσει τη δράση του θα είναι αργή. Το LONTREL 720 SG δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν αναμένεται βροχόπτωση σε μία ώρα από την ολοκλήρωση του ψεκασμού. Μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν ο καιρός είναι ξηρός και επικρατούν άνεμοι. Για την αποφυγή αυτοεπιρροών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστάται η τήρηση αμείκαστης ζώνης 5 μέτρων. Για τον εδαμώδη βίκο, τον ορακά και τις ταπεινές δε χρειάζεται απόσταση ασφαλείας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκίασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Τα υπολείμματα των καλλιεργιών που έχουν ψεκαστεί με το LONTREL 720 SG να μην χρησιμοποιούνται ως λίπασμα ανακομμένων καλλιεργιών και λαχανικών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Για τις καλλιέργειες που δεν επιτρέπεται η χρήση του clorpyralid, θα πρέπει να υπάρχει μία προέλαση 125 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της σποράς ή της φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας ή της καλλιέργειας αντικατάστασης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Συνιστάται να τηρηθεί μεσοδιάστημα 15 ημερών από τον ψεκασμό πριν τη βόσκηση ζώων ή ψεκασμό άγριων ζώων.

ΤΕΛΕΥΑΙΑ ΕΠΙΜΕΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΚΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ): Ζυχοειδή: 42, Ελακοκράμβη: 56, Αραβοσίτος: 80 (για ενόρση), 90 (για σπορά), Σόργο: 42 (για ενόρση), 70 (για σπορά), Παντζάρι: Λιβάρι: 42. Δασικές εκτάσεις - Καλλιέργειες για σποροπαράγωγα -