

# VETEBOLO Calcium - D3

Διαιτητική ανόργανη ζωοτροφή για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Ειδικός διατροφικός σκοπός: Μείωση του κινδύνου για επιλόχειο πάρεση και υποκλινική υπασβεστιαμία.

**Σύνθεση:** (11.1.6) Χλωριούχο ασβέστιο\*, (11.1.1) Ανθρακικό ασβέστιο θαλάσσιας προέλευσης [ασβεστόλιθος]\*, Κραμβέλαιο (υδρογονωμένο) (006386-EN), (13.6.4) Αλατα λιπαρών οξέων (στεατικό μαγνήσιο), (13.5.5) Σορβιτόλη. \*πηγές ασβεστίου

**Πρόσθετες ύλες ανά κιλό (kg):**

**Βιταμίνες και προβιταμίνες:** 3α671 Βιταμίνη D3 (Χοληκαλσιφερόλη): 2.000.000 UI/kg.

**Συντηρητικά:** 1α282 Προπιονικό ασβέστιο\*: 252.000 mg/kg.

\*πηγές ασβεστίου

**Αναλυτικά συστατικά:** Ασβέστιο 24 %, Νάτριο 0 %, Φώσφορος 0 %, Μαγνήσιο 0,08 %.

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Εταιρεία/Παρασκευαστής: TECHNOVET-EUROTONIC Z.A. de Iumunoch, 200 Rue Pierre & Marie Curie, 29510 BRIEC, FRANCE, Tel.: (+33) 02 98 64 46 32. Αριθμός Έγκρισης: aFR29020702.

Η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών οργανικών οξέων ή αλάτων τους αντενδείκνυται όταν ένα ή περισσότερα απ' αυτά χρησιμοποιούνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ή την προσεγγίζουν. Το μείγμα διαφόρων πηγών προπιονικού ασβεστίου δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα στις πλήρεις ζωοτροφές.

Διανομέας:



ELANCO ELLAS A.E.B.E.

Λεωφόρος Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αττική, Ελλάδα

Τηλ.: (+30) 2130065000

Θεσσαλονίκη: Τηλ.: (+30) 2310289100

www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr

Αριθμός έγκρισης/Approval number: aEL5400030

Αριθμός εγγραφής/Registration number: 22200 540 000033

**Συσκευασία:** Κουτί των  
**30 βόλων των 108 g.**  
**Καθαρό βάρος: 3,240 kg.**

Αριθμός Παρτίδας/Batch:

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από:

## Οδηγίες για τη σωστή χρήση:

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συσκευή χορήγησης στομαχικού βόλου (συσκευή απελευθέρωσης στη μεγάλη κοιλία):

- Δώστε ένα βόλο στην αρχή του τοκετού,
- Στη συνέχεια, δώστε ένα βόλο 12 έως 24 ώρες (εντός της ίδιας ημέρας) μετά τον τοκετό.

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ειδικού διατροφολόγου.

Συνιστώμενη διάρκεια χρήσης: Από την εμφάνιση των πρώτων σημείων του τοκετού έως δύο ημέρες μετά τον τοκετό.

Άμεση αποδέσμευση βόλος