

KELA

Aspicur T

Συμπληρωματική ζωοτροφή
Είδη ζώων: Χοίροι, Μόσχοι, Πρόβατα, Αίγες

Σύμφωνα: (Ασφάλμη και κοινή ελάσις, Tormentil (Potentilla erecta/fortevraliana η οβόλι), Horshéal (Inula Helentica/Εκνίο), Lime ékasi μικρό λεμονόυ, Mullein (Bespirtakorofálmios), Πορφυρή εγνάκεια, Τρούκνιδα και Μέγα (008861-ΕΝ)), (1, 1, 4, 1) Χυμολύχο var. pro, (11, 2, 4) Αυσπο θεϊκό μανιτζό.

Ανάλυτικá συστατικά: Ολικές αμινοξέες ουρίες (0,28%), Ολικές Άιμαρές ουρίες (0,7%), Ολικές ινυδρίες ουρίες (0,9%), Ολική τέφρα (0,17%), Υγρασία (97,89%), Νάτριο (0,01%), Αζώτιο (0,05%), Μεθειμιλίνη (0,05%),

Οδηγίες για την οπλή χοίτη: Χοιρήγησι από το σίδηλο σε ποσότητα νερό, σε ζωοτροφή η σε υποκατάστατο γάλακτος (σε τεκική βεβλακκασία οηήσι), Ανακίνησι κατά την η χοίτη, Η ηληφία η ποσότητα η υπολή να χυμολύσε σε 2 πορές την ημερα. Χοιρήγησι για 5 έως 7 ημερές ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου. Μπορεί να επαναληφθεί, εάν είναι απαραίτητο.

Χοιρήγησιές: 20-30 mL/ζώο/ημέρα
Χοιρία και τεχνολογικοί Χοιρί: 2 L/1000 L τροφίμο νερό

Μόσχοι: 20-40 mL/ζώο/ημέρα
Νεογού μοσχόι: 10-20 mL/ζώο/ημέρα

Αντροπόδατα: 10-20 mL/ζώο/ημέρα
Αιγούι και επήφι: 5-10 mL/ζώο/ημέρα

Σύμφωνα αρθροίκευσι: Μην καταλύετε φάλα σε σε σε βεβλακκασία μικροποίηση 100-30°C. Αποκκενίσκιδά να κηνηρα πικρή χοίτη. Να γυμνασείσαι σε θέσι την οηία σε βλάτηννυ και σε τροποεγίλουν τα τραβιδά.

Batch Number/Αριθμός Προτίδας:
Ημερομηνία Διήσι:

7E936E22

Καθαρός όγκος: 5L



Υπεύθυνος για την Εποσίημεσι:
KELA N.V., Sint Lenaatseweg 48, 2320 Hoogstraten, Belgium. Αριθμός εγκρίσις: BEB276

Παράσεισις:
BLAGAL, Rue de la Science 22, 4530 Villiers-le-Bouillet, Belgium. Αριθμός εγκρίσις: BEB100

Διανομέας: EΛANKO EΛMΑΣ A E B E
Ανεξάρτος Μεσοεγίσις 335, 152 31 Χαλκίδα, Αττική, ΕΛΛάδα

Τηλ.: (+30) 2130065000
Ολοκατακλή: Τηλ.: (+30) 2310289100
www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr
Αριθμός εγκρίσις/Approval number: aEL5400030
Αριθμός εγκρίσις/Registration number: 22200 540 000053