

Herbiclean Concentre

Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία: Pelargonic acid 25 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 71,99 % β/β
ΑΑΔΑ:70550 /EP - 09/08/24

Herbiclean Concentre

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. **P264:** Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. «Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση». Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. **P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **P332+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **P362+P364:** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην ξεπλύνετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι. Μην ειαρομίζετε όταν έντομα επικινσαστές (μέλισσες, βομβίνου) και ωφέλιμα έντομα είναι παρόντα.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΕ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Δαβάση 65, Τ.Κ.: 17672 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.: 6948608999

 **SBM** Κατάλογος της δόσεις: SBM DEVELOPPEMENT SAS, 60 Chemin des Mouilles, 69130 ECUULLY, Γαλλία

480ml e



Διανομέας: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**
Α. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070



Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής, για τον έλεγχο και καταπολέμηση των ζιζανίων και των παραφυώνων/λαιομαργών βλαστών. Περιέχει τη δραστική ουσία πελαργονικό οξύ. Δρα με αποξήρανση, διαταράσσοντας την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης των φυτών και τα αποτελέσματα είναι ορατά πολύ γρήγορα (24 ώρες).

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό στο φύλλωμα των ζιζανίων, στις παραφυώδες/λαιομαργά ή στους βλαστούς/στελέχη, που πρέπει να είναι στεγνά πριν τον ψεκασμό.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διάλυματος εφαρμογής: Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεδιόντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδεδιωση καθ' όλη την διάρκεια της εφαρμογής. Να ψεκαζέται αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά περίοδο/Μεσοδιάστημα ψεκασμών σε ημέρες
		κ.εκ./10 τ.μ.	Όγκος ψεκ. υγρού (κ.εκ./τ.μ.)		
Σπαρτά**	Καταπολεμούμενα ζιζάνια*	120 κ.εκ.	0,5-1 λίτρο	Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων όταν βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη (λιγότερο από 10 εκ. ύψος) και επανάληψη ψεκασμού, εάν χρειαστεί.	8/21

** Καλλιπωστικά δένδρα και θάμνοι (NINZZ), Πυρηνόκαρπα (NNNOS), Μηλοειδή (NNNOK), Μικροί καρποί και μούρα: Βατόμουρα RUBFR, Καρποί ασπροσταμομαριός RUBCA, Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) RUBID, Μύρτιλλα VACAN, VACCO, VACVG, VACMY, VACAR, Μύρτιλλα μακρόκαρπα VACMA, Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα) RIBUC, Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα) RIBMI, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς ROSCN, ROSM, ROSRG, Μούρα (μαύρα ή άσπρα) MORAL, MORNI, Καρποί κουροζυλιάς SAMNI, Εγκατεστημένες καλλιέργειες, Ακαλιέργειες εκτάσεις (βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδοί, σε χώρους με φωτοβολταϊκά πάνελ, σε ποστικές και αγρωστικές περιοχές)

Παρατηρήσεις: Το HERBICLEAN CONCENTRE έχει γενικά μέτρα αποτελεσματικότητας.

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Βρύοφυτα (Bryophyta IBRYPF), Ζυχοί (Sonchus asper - SONAS), Ήρα πολιάνη (Lolium multiflorum - LOLMU), Ήρα πολυετής (Lolium perenne - LOLPE), Καφέλλα (Cirsium bursa-pastoris - CAPBP), Κόνηα (Erigeron canadensis / Conyza canadensis - ERICA), Λουβουδιά (Chenopodium album - CHEAL), Μαρτάκος (Senecio vulgaris - SENVU), Πεντάνυδρο (Plantago lanceolata - PLALAL), Πικραλίδα (Taraxacum officinale - TAROF), Πόα κοινή (Poa annua - POAAN), Πολυκόμμη (Polygonum aviculare - POLAV), Στελλάρια (Stellaria media - STEME), Τριφυλλά λευκό έρπον (Trifolium repens - TRFRE), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla - MATCH)

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποικιστεί: Εφαρμόστε κατά προτίμηση το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε ελάχιστες θερμοκρασίες 15°C, σε καιρικές συνθήκες που διεκδικούν την ανάπτυξη. Να γίνεται πλήρης και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών. Το HERBICLEAN CONCENTRE καταστρέφει όλα τα πράσινα μέρη των φυτών. Μην το εφαρμόζετε σε φυτά που δεν είναι στόχοι, συμπεριλαμβανομένου του χλοοτάπητα. Να αποφεύγετε τον ψεκασμό σε άλλα γειτονικών φυτών διότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς. Μην το εφαρμόζετε σε υγρά φυτά ή εάν αναμένεται βροχή δύο (2) ώρες μετά την εφαρμογή. Μην το εφαρμόζετε αντίθετα στον άνεμο. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική πελαργονικό οξύ, η οποία ανήκει στην ομάδα 0 κατά HRAC.

Διείσδυση ανθεκτικότητας

Συνιστάται η ανάλαση με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή και αναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην έρχεστε σε επαφή με την ψεκασμένη επιφάνεια ή με τα ψεκασμένα φυτά έως ότου στεγνώσουν τελείως. Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση παιδιά και κατοικίδια ζώα έως ότου στεγνώσει η ψεκασμένη περιοχή ή τα φυτά.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά ή γύρω από φυτά (τριανταφυλλιάς, θάμνος, καλλιπωστικά δένδρα εγκατεστημένου φυτικού φράχτες κ.α.) να αποφεύγετε τη μεταφορά του ψεκαστικού νέφους με τον αέρα και την επαφή του με τα φυτά.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσπαση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα νερά μέσο συσκευασίας (φιάλες) ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήση, αναπτείνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Όλες οι χρήσεις: -.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

 **SBM** Κατάλογος της δόσεις: SBM DEVELOPPEMENT SAS, 60 Chemin des Mouilles, 69130 ECUULLY, Γαλλία

480ml e



Διανομέας: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**
Α. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070