

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/υερίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Γενικές πληροφορίες: Μην δίνετε υγρό και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύντε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόν σε καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.

**Αντιδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»*

**Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.** (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το AVANZA 400 SC εφαρμόζεται προσταρτικά και μεταφυτευτικά της καλλιέργειας ρυζιού και των ζιζανίων. Η εφαρμογή γίνεται σε αγρό κατακλιμένο με νερό με σταθερή στάθμη νερού (≥4 cm). Μετά την εφαρμογή προτείνεται η διαίτηρηση του νερού στον αγρό για τουλάχιστον 7 ημέρες. Για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας διατηρήστε το νερό στον αγρό για 8-10 ημέρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδύοντας συνεχώς. Ξπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Εφαρμόστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού της όγκου. Αναδύστε το νερό ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Γεμίστε τη δεξαμενή έως τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε απορρυπαντικό. Αναδύστε για τουλάχιστον 10-20 λεπτά και αδειάστε ξανά τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αφαιρέστε και καθαρίστε ξεχωριστά όλα τα μέρη του ψεκαστικού υγρού. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού όγκου της δεξαμενής. Αναδύστε για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Καθαρίστε σχολαστικά τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού εξοπλισμού.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Οι φιάλες δεξιωνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Gowan®**

# Avanza' 400SC

## ZIZANIOKTONO

Εγγυημένη σύνθεση: Benzobicyclon: 34,7% β/ο (400 γρ./λιτ.)  
Βοηθητικές ουσίες: 60% ββ

Εναιωρηματοποίησης συμπύκνωμα (SC)

## Ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση αγρωστωδών, κυπεροειδών, πλατύφυλλων ζιζανίων και του κόκκινου ρυζιού στην καλλιέργεια του ρυζιού.



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κάτοχος της άδειας:  
Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α'  
Χαλαστρά, 57300, Θεσσαλονίκη  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
Λ. Μεσσηνίου 335, 15231, Χαλάνδρι  
Τηλ.: 2130065070



Α.Α.Δ.Α.: 70414  
Ημέρα χορήγησης: 01.04.2022  
Ημέρα λήξης: 28.07.2022

Περιεχόμενο:  
**750 κ.ε.κ.**

### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το AVANZA 400 SC είναι ειδικά ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού. Η δραστική ουσία του AVANZA 400 SC, Benzobicyclon, ανήκει στους παρεμποδιστές της βιοσύνθεσης της πλαστικότητας μέσω της παρεμποδιστής του ενζύμου 4-HPPD. Διαθέτει διαορεπτική χημική δομή από τις υπόλοιπες ομάδες ζιζανιοκτόνων του παρεμποδισμού του ενζύμου 4-HPPD.

Το Benzobicyclon ως παρεμποδιστής της διοξυγενάσης του 4-υδροξυφαινόλη-πυροσταφυλικού οξέος (4-HPPD), είναι η μόνη δ.ο. του Group 27 HRACWSSA (Legacy F2/HRAC), που εφαρμόζεται στην καλλιέργεια του ρυζιού.

### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ρύζι: Για την αντιμετώπιση Αγρωστωδών (Μουχράνες, Λεπτοχλόη), Κυπεροειδών (Μοσχοκίττηρη) και Πλάτυφυλλων ζιζανίων (Επισπινθήρα) και του Κόκκινου ρυζιού. Δόση: 75 κ.ε.κ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προσταρτικά της καλλιέργειας του ρυζιού έως την έναρξη του αδελμάματος. Στάδιο ζιζανίων: Προσταρτικά και έως την έκπτυξη του δεύτερου πραγματικού φύλλου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερηγητική περίοδο: 1

### Παρατηρήσεις:

- Μετά την εφαρμογή διατηρήστε τον αγρό κατακλιμένο για τουλάχιστον 7 ημέρες. Για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας διατηρήστε το νερό στον αγρό για 8-10 ημέρες.
- Το AVANZA μπορεί να εφαρμοστεί προφυτευτικά και μεταφυτευτικά της καλλιέργειας. Οι εφαρμογές στο χρόνο σποράς (πριν ή αμέσως μετά) παρουσιάζουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα από ότι οι καθυστερημένες εφαρμογές. Ο ιδανικός χρόνος εφαρμογής είναι κατά τη βλάστηση των νεφρών.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΤΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ**

### Διαχείριση για τη μείωση πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το AVANZA συστήνεται να εναλλάσσεται με ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζιζανίων (όχι διαδοχικές εφαρμογές) συνδυάζοντας όλες τις διαθέσιμες καλλιερηγτικές, βιολογικές και χημικές πρακτικές.

Το AVANZA διαθέτει εναλλακτικό τρόπο δράσης από άλλα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα στην καλλιέργεια του ρυζιού. Δρα μέσω της παρεμποδιστής του ενζύμου 4-HPPD και μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ζιζάνια που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα ανασταλείς ALS και ACCase.

Συνιστάται να εφαρμόζεται το AVANZA όταν τα ζιζάνια βρισκονται σε νεαρό στάδιο και έχουν έντονη ανάπτυξη και να ακολουθείται η προτεινόμενη διαχείριση των νεφρών.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΥΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ**

Δεν απαιτείται εφάρση του προϊόντος εφαρμόζεται με την ορθή γεωργική πρακτική.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το AVANZA δεν είναι φυτοτοξικό για την καλλιέργεια του ρυζιού όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. Σε περιπτώσεις ανάπτυξης στο βυτίο με άλλα ζιζανιοκτόνα ή εφαρμογές σε πρόσφατα εισαγόμενους ποικιλιών ρυζιού στην αγορά, συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.

### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Ρύζι: Δεν εφαρμόζεται. Ορίζεται από το χρόνο επίμβασης.

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χύριο θύρο, δροσερά, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών.