

AMALGEROL

ΚΛΠ 6(Β): ΜΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΦΥΤΩΝ

Φυσική μορφή: Υγρό

Συστατικά άνω του 5% κατά βάρος προϊόντος: Ορυκτέλαιο¹ (Αριθ. CAS μη διαθέσιμος [Αριθ. EC 919-857-5] και 64742-95-6), Εκχύλισμα φυκιών *Ascophyllum nodosum*¹ (Αριθ. CAS 84775-78-0), Πολυγλυκολικός εστέρας¹ (Αριθ. CAS μη διαθέσιμος)

Πρόσθετα συστατικά: Αιθέρια έλαια¹, φυτικά εκχυλίσματα¹

¹ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών

Παρασκευαστής: Hechenbichler GmbH, Susanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Austria, Tel.: +43 512 291810-0, E-mail: office@amalgerol.com, www.amalgerol.com

Διανομέας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λ. Μεσογείων 335, 152 31, Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το άνοιγμα και τη χρήση. Γεμίστε τον ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα νερού που απαιτείται και ξεκινήστε την ανάδευση πριν προσθέσετε το AMALGEROL διατηρώντας παράλληλα την ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Διατηρήστε την ανάδευση συνεχώς κατά τη διάρκεια του ψεκασμού! Φοράτε γυαλιά ασφαλείας. Μην εισπνέετε το εκνέφωμα ψεκασμού. Καθαρίστε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες μετά τη χρήση.

Ψεκάστε το πρωί ή το βράδυ. Μην αφήνετε το παρασκευασμένο διάλυμα ψεκασμού στον ψεκαστήρα για μεγάλα χρονικά διαστήματα (όπως όλη τη νύχτα). Μην εφαρμόζετε σε συσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή ταχύτητα ανέμου, υψηλά επίπεδα φωτός ή μετά από έντονη βροχή. Οι εφαρμογές ψεκασμού συνιστώνται μόνο όταν η κρηώδης επιφάνεια του φυλλώματος είναι άθικτη.

Συνδυαστικότητα: Το AMALGEROL είναι συμβατό με τα περισσότερα προϊόντα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, κ.λπ.). Όταν χρησιμοποιείτε πολλά προϊόντα στη δεξαμενή ψεκασμού, μπορεί να προκύψουν αλληλεπιδράσεις. Διεξάγετε δοκιμές ανάμιξης και συμβατότητας πριν συνδυάσετε το AMALGEROL με άλλα προϊόντα και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες χρήσης για κάθε προϊόν που θα προσθέσετε στη δεξαμενή. Κατά την ανάμιξη με προϊόντα που περιέχουν χαλκό, τηρείτε αυστηρά τη συνιστώμενη δοσολογία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης:

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σε εγκεκριμένο εργοστάσιο διάθεσης αποβλήτων.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, την εισπνοή και την κατάποση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια εάν αισθανθείτε αδιαθεσία και επιδείξτε την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 (24 ώρες).

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο μεταξύ +5 °C και +25 °C. Προστατέψτε από τον παγετό, τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Διατηρήστε το δοχείο ηερμητικά σφραγισμένο. Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα ή ζωοτροφές. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Ημερομηνία λήξης: Στις συνθήκες αποθήκευσης που αναφέρθηκαν, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Αρ. παρτίδας / Ημερ. παραγωγής: Βλέπε συσκευασία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση: Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ολόκληρη την ποσότητα του προϊόντος. Απορρίψτε τα υπολείμματα και τα άδεια δοχεία σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές οδηγίες των αρχών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το AMALGEROL είναι ένας μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών για χρήση σε εκτακτικές και άλλες καλλιέργειες.

Εφαρμογή στο έδαφος: Εφαρμόζεται με ψεκασμό στο έδαφος, εφαρμογή σε γραμμές, μέσω αρδευτικού συστήματος ή κατά τη σπορά. Με στάγδην άρδευση: 1 - 1,5 λίτρο/στρ. ανά καλλιεργητική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης.

Διαφυλλική εφαρμογή: Εφαρμόζεται στα φύλλα καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Εφαρμογή πριν από τη μεταφύτευση: Εμβάπτιστε τα φυτά σε διάλυμα συγκέντρωσης 1 % για 10 λεπτά πριν από τη μεταφύτευση ή ψεκάστε στη γραμμή πριν από τη μεταφύτευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δόση εφαρμογής (στο έδαφος ή διαφυλλικά): 200 – 500 κ.εκ./στρ. ανά εφαρμογή.

Διαφορετικές δόσεις προτείνονται για ορισμένες χρήσεις.

Όγκος νερού: Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα για πλήρη διαβροχή εδάφους και φυλλώματος.

Συχνότητα και διάστημα εφαρμογών: Συνήθως συχνότητα εφαρμογής όπως περιγράφεται παρακάτω. Είναι δυνατές επιπλέον εφαρμογές. Ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών εφαρμογών: 10 έως 14 ημέρες.

Χρόνοι εφαρμογής: Οι εφαρμογές συνιστώνται στα πιο σημαντικά στάδια ανάπτυξης, ιδίως στην έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, στην άνθηση και στο στάδιο της καρπώσεως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλλιέργεια	Δόση	Μέθοδος Εφαρμογής	Στάδιο Εφαρμογής	Αριθμός Εφαρμογών	Ισχυρισμός
Εκτακτικές καλλιέργειες	500 κ.εκ./στρ	Ψεκασμός φυλλώματος	Καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο	1 - 3	Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών – Αύξηση απόδοσης

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εφαρμογές κατά τη διάρκεια του κύκλου βλάστησης

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΡΟΥ (σιτηρά, καλαμπόκι, ελαιούχες καλλιέργειες, πατάτα, ζαχαρότευτλα, ινώδεις καλλιέργειες, ψυχανθή, κ.λ.π.): 1 έως 3 εφαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (φυλλώδη και σταυρανόη λαχανικά, οπωροφόρα λαχανικά, ριζώδη, βολβώδη ή κονδυλώδη λαχανικά, κ.λ.π.): 1 έως 4 εφαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ (εσπεριδοειδή, αμπέλι, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ελιά, ακτινίδιο, φράουλα, μούρα, τροπικά και υποτροπικά φρούτα, κ.λπ.):

1 έως 10 εφαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Έως 1 λίτρο/στρ. για εφαρμογές εδάφους στις αρχές της άνοιξης για οπωροφόρα δένδρα και αμπέλια.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: 1 έως 5 εφαρμογές καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

- **Ετήσια φυτά**
- **Πολυετή φυτά** (πωύδη, θάμνοι και δέντρα)

ΓΚΑΖΟΝ: Εφαρμογή 0,75 - 1,5 λίτρα/στρ. AMALGEROL. Χρησιμοποιήστε αραιώση 1:100 σε νερό. Συνιστάται η εφαρμογή κάθε 2 - 4 εβδομάδες.

- **Χρήση σε:** Υπάρχων χλοοτάπητας, Εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα, Νέα σπορά
- **Μέθοδος εφαρμογής:** Σύστημα ποτίσματος.

Εφαρμογές εκτός του κύκλου βλάστησης

Πριν από την καλλιέργεια: απλώστε στο αυλάκι σποράς ή ψεκάστε στο έδαφος και ανακατέψτε αμέσως πριν από την προετοιμασία της σποροκλίνης.

Μετά τη συγκομιδή: εφαρμόστε στα υπολείμματα της καλλιέργειας στο έδαφος και στη συνέχεια ενσωματώστε.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 24,25 κιλά

ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΓΚΟΣ: 25 λίτρα



www.amalgerol.com

