



ACENTIN®

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Paraffin oil 79 % β/ο ή 94,05% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 6 % β/β

**ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ
ΕΠΑΦΗΣ**

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14896/18.12.2024

Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Σλοβενία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος

Μεσογειών 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική,

Τηλ.: 213 006 5000, e-mail: contact@elanco.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **5** ΛΙΤΡΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **EUHA01:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: P405+P102:

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Sp3e:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **5 μέτρων** σε Εσπεριδοειδή και **10 μέτρων** σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά και Αμπέλι. **Sp3e:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη. **Sp8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυμέλες κατά τη χρήση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: P301+P310+P331: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777**

UFI: PCF0-40S0-J00J-ANSP

Ημερ. Παραγωγής (Man. Date)/Αρ. Παρτίδας (Batch No.): Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

ALBAUGH®
your alternative

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως και σε θερμοκρασία >0°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά (κλημεντίνες), Πορτοκαλιά, Φράπα, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα, Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Ελιά, Αμπέλι: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμεία, κινητές μορφές και αυγά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής – Στόχος – Δόσεις σκευάσματος – Χρόνος εφαρμογής:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά, Φράπα): Για Κόκκινη ψύρα, Άσπρη ψύρα, Παρλατόρια/Μάυρη ψύρα, Μυτιλόμορφη ψύρα, Κίτρινο τετράνυχ, ακάρεα (*Eutetranychus banksi*, *Panonychus citri*), δόση 1000 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000 - 3000 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 100 - 200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν

την αλλαγή χρώματος των καρπών.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα): Για Ψύρα Σαν-Ζοζέ, δόση 750 - 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): Για Ψύρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβακάδα, δόση 750 - 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.

ΕΛΙΑ: Για Λεκάνιο, δόση 750 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από τη συγκομιδή μέχρι την άνθηση (BBCH 00-59) ή από την πώση των πετάλων έως την έναρξη της πύξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου (μέγεθος 50% του τελικού) (BBCH 71-75).

ΑΜΠΕΛΙ: Για Ψύρα, Ψευδοκκοκο, δόση 750 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/στρ. Χειμερινή εφαρμογή πριν την άνθηση (BBCH 00-57). Για Κίτρινο Τετράνυχ, Κόκκινο τετράνυχ, δόση 750 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για όλες τις καλλιέργειες: Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός. 4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 5. Να μη γίνεται εφαρμογή του σκευάσματος επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet. 6. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης ανά 100 λίτρα και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ.) ανά στρέμμα, όπως έχει οριστεί για κάθε καλλιέργεια.





ACENTIN®

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Paraffin oil 79 % β/ο ή 94,05% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 6 % β/β

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ
ΕΠΑΦΗΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14896/18.12.2024

Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Σλοβενία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος

Μεσογειών 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική,

Τηλ.: 213 006 5000, e-mail: contact@elanco.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **10** ΛΙΤΡΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **EUHA01:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: **P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. **P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. **P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Sp3e:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **5 μέτρων** σε Εσπεριδοειδή και **10 μέτρων** σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά και Αμπέλι. **Sp3e:** Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη. **Sp8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυμέλες κατά τη χρήση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: **P301+P310+P331:** Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

UFI: PCF0-40S0-J00J-ANSP

TKI_GB_Acentin_10L_E_211124_EZ2056-GR-020-000

Ημερ. Παραγωγής (Man. Date)/Αρ. Παρτίδας (Batch No.): Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

ALBAUGH®
your alternative

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται στην αρχική του απараβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως και σε θερμοκρασία >0°C. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά (κλημεντίνες), Πορτοκαλιά, Φράπα, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα, Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Ελιά, Αμπέλι: Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμεία, κινητές μορφές και αυγά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής – Στόχος – Δόσεις σκευάσματος – Χρόνος εφαρμογής:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά, Φράπα): Για Κόκκινη ψύρα, Άσπρη ψύρα, Παρλατόρια/Μαύρη ψύρα, Μυτιλόμορφη ψύρα, Κίτρινο τετράνυχο, ακάρεα (*Eutetranychus banksi*, *Panonychus citri*), δόση 1000 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000 - 3000 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 100 - 200 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν

την αλλαγή χρώματος των καρπών.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα): Για Ψύρα Σαν-Ζοζέ, δόση 750 - 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): Για Ψύρα Σαν-Ζοζέ, Βαμβακάδα, δόση 750 - 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 150 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.

ΕΛΙΑ: Για Λεκάνιο, δόση 750 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή από τη συγκομιδή μέχρι την άνθηση (BBCH 00-59) ή από την πώση των πετάλων έως την έναρξη της πύξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου (μέγεθος 50% του τελικού) (BBCH 71-75).

ΑΜΠΕΛΙ: Για Ψύρα, Ψευδοκκοκο, δόση 750 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/στρ. Χειμερινή εφαρμογή πριν την άνθηση (BBCH 00-57). Για Κίτρινο Τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο, δόση 750 - 1500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (375 - 1500 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού 50 - 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για όλες τις καλλιέργειες: Μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής. 2. Κατά τη χρήση του σκευάσματος τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. 3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός. 4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας. 5. Να μη γίνεται εφαρμογή του σκευάσματος επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet. 6. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης ανά 100 λίτρα και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ.) ανά στρέμμα, όπως έχει οριστεί για κάθε καλλιέργεια.



7 640166 486961 >



ACENTIN®

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Paraffin oil (CAS 8042-47-5)

Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Paraffin oil 79 % β/ο ή 94,05% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 6 % β/β

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

ΕΠΑΦΗΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΙΑ**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14896/18.12.2024

Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, SI-2327 RACE, Σλοβενία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 335, 15231,

Χαλάνδρι, Αττική,

Τηλ.: 213 006 5000, e-mail: contact@elanco.gr



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. **EU401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: P405+P102:

Φυλάσσεται κλειδωμένο,

μακριά από παιδιά. **P202:**

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν

διαβάσετε και κατανοήσετε τις

οδηγίες προφύλαξης. **P270:** Μην

τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/

περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. **Sp1:** Μην ρυπαίνετε το νερό

με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό

εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. **Sp3:** Για να προστατέψετε

τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας

από τα επιφανειακά ύδατα: **5 μέτρων** σε Εσπεριδοειδή και **10 μέτρων** σε

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά και Αμπέλι. **Sp3:** Για να προστατέψετε

τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας

5 μέτρων από μη γεωργική γη. **Sp8:** Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, Μην

χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν

γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: P301+P331: Σε περίπτωση

κατάποσης καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε

αμέσως με άφθονο νερό. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει,

ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:**

Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει

ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείσθε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

UFI: PCF0-40S0-J00J-ANSP

Ημερ. Παραγωγής (Man. Date)/Αρ. Παρτίδας (Batch No.): Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

® TM trademark or trade name of Albaugh, LLC or an affiliated company

ALBAUGH®
your alternative