

# SELECT NG<sup>®</sup>

(clethodim 12% β/ο)

## ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70509/27.11.2023


Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: clethodim 12% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 86,34% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience SAS Route d'Artix B.P. 80, 64150 Nogueres, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ριζαρέιου 16, Τ.Κ:15233, Χαλάνδρι, Τηλ: 210 5578777, Αρ. ΓΕΜΗ: 122521307000



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: HGXX-1NEW-HH2E-087Y

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Περιέχει clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς προφυλάξεις και τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας.

GR-2914503-04-0426

Αρ. Παρτίδας/Ήμερ. Παραγωγής:  
Βλέπε συσκευασία



5 L  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ



**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικός καθολικός ή κατευθυνόμενος ψεκασμός στις γραμμές φύτευσης με χρήση γεωργικού ελκυστήρα. Το ψεκαστικό υγρό να βρίσκεται υπο συνεχή ανάδευση κατά την εφαρμογή.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

#### **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες:**

**ΕΛΠΑ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ):** Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 150 κ.εκ./στρέμμα. Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 300 κ.εκ./στρέμμα. Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 400 κ.εκ./στρέμμα. Με όγκο ψεκ. υγρού 10-50 λίτρα/στρέμμα. Δύο (2) κατευθυνόμενοι ψεκασμοί κάτω από την κόμη των δέντρων από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως και μετά τη συγκομιδή. (BBCH 00-μετά τη συγκομιδή) και μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου, με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 90 ημέρες.

**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΛΙΜΜΕΤΙΑ (ΜΟΣΧΟΛΕΜΟΝΟ), ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ:** Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 150 κ.εκ./στρέμμα. Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 300 κ.εκ./στρέμμα. Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 400 κ.εκ./στρέμμα. Με όγκο ψεκ. υγρού 10-50 λίτρα/στρέμμα. Δύο (2) κατευθυνόμενοι ψεκασμοί κάτω από την κόμη των δέντρων από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως και μετά τη συγκομιδή. (BBCH 00-μετά το BBCH 70) και μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου, με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 90 ημέρες.

**ΡΥΖΙ:** Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 150 κ.εκ./στρέμμα. Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη σορά και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου.

**ΚΑΡΟΤΟ:** Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου (BBCH 12-45) και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-45). Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 200 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλιουρας είναι 15εκ. (BBCH 12-45). Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ:** Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 ως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19). Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 200 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 ως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου.

**ΒΑΜΒΑΚΙ:** Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 ως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν ο βέλιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Για Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 250-300 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** Για Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\* με δόση 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 12-19) και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωή ανάπτυξη, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα

μέχρι την αρχή του αδελφώματος, (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν ο βέλיוρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 250-300 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. **ΠΑΤΑΤΑ:** Για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής (BBCH 12-33). Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν ο βέλיוρας είναι 15 εκ (BBCH 12-19) και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 250-300 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν τα ζιζάνια είναι 15εκ. (BBCH 12-33). Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ:** Για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωή ανάπτυξης, από τα 3-4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-33). Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 200 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλיוρας είναι 15εκ. (BBCH 12-33). Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 250-300 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια είναι 15εκ. (BBCH 12-33). Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**ΑΜΠΕΛΑΙ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ), (ΦΥΤΩΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ):** Για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 200 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) κατευθυνόμενος ψεκασμός κάτω από τις γραμμές φύτευσης, από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως πριν τη συγκομιδή των καρπών. (BBCH 00-85) και μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Αυγούστου. Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 400 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) κατευθυνόμενος ψεκασμός κάτω από τις γραμμές φύτευσης (BBCH 00-85) και όταν τα ζιζάνια έχουν ύψος 15-20 εκ. και μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Αυγούστου. Με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα.

**ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ (ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΑ):** Για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 200 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) κατευθυνόμενος ψεκασμός κάτω από τις γραμμές φύτευσης, από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως και μετά τη συγκομιδή. (μετά το BBCH 70) και μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Οκτώβρη. Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 400 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) κατευθυνόμενος ψεκασμός κάτω από τις γραμμές φύτευσης, από το στάδιο του ληθάργου των οφθαλμών έως και μετά τη συγκομιδή. (μετά το BBCH 70) και όταν τα ζιζάνια έχουν ύψος 15-20εκ., μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Οκτώβρη. Με όγκο ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρέμμα.

**ΤΟΜΑΤΑ:** Για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 100-150 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από το στάδιο του σχηματισμού του 2<sup>ου</sup> φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα ή περισσότερων πλευρικών βλαστών (BBCH 12-29) και μεταξύ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου. Για **Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια\*** με δόση 200-300κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από το στάδιο του σχηματισμού του 2<sup>ου</sup> φύλλου στον κεντρικό βλαστό έως την εμφάνιση εννέα ή περισσότερων πλευρικών βλαστών (BBCH 12-29) και όταν τα ζιζάνια έχουν ύψος 10 εκ. και μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου. Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**ΦΑΚΗ\*, ΡΕΒΥΘ\*, Χρήσεις ήσσονος σημασίας:** Για **Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια** με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. Ένας (1) ψεκασμός από το 3<sup>ο</sup> έως το 9<sup>ο</sup> πραγματικό φύλλο. (BBCH 13-19). Με όγκο ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα.

**Παρατήρηση:** **1.** Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του. **2.** Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης. **3.** Η εφαρμογή του σκευάσματος να πραγματοποιείται όταν τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του 5<sup>ου</sup> αδελφού βλαστού (BBCH 12-25) και τα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια βρίσκονται από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως πριν την επιμήκυνση του στελέχους (BBCH 13-29). **4.** Στις καλλιέργειες των μηλοειδών, εσπεριδοειδών, ελιάς και αμπελιού να γίνεται στοχευμένος ψεκασμός στα ζιζάνια και να κατευθύνει προς τα κάτω. **5.** Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. **6.** Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. **7.** Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες φράπας και ακόρδου. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια αυτή από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σε αυτές τις καλλιέργειες.

8. Η χρήση στα γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και την φράπα. 9. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες φακής και ρεβυθίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

#### **\*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

##### **-Ελιά:**

- στη δόση 150 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη (BBCH 12-25): Ευαίσθητα ζιζάνια: Μεγάλη αγρ. Βρώμη, Βρώμος ο μέγας, Βρώμος ο άγονος, Μικρή μouxρίτσα, Αγριοκρίθαρο, Πολύανθη Ήρα, Σπονδυλωτή Σετάρια.

- στη δόση 300 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη (BBCH 13-29): Ευαίσθητα ζιζάνια: Βέλιουρας (ύψος 10-25 cm).

- στη δόση 400 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη (BBCH 13-29): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριάδα (ύψος 10-25 cm).

##### **-Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Λιμμετία (μοσχολέμονο), Γκρέιπφρουτ:**

- στη δόση 150 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη (BBCH 12-25): Ευαίσθητα ζιζάνια: Μouxρίτσα, Αγριοκρίθαρο, Πράσινη Σετάρια, Μετρίως ευαίσθητα: Μεγάλη αγρ. Βρώμη.

- στη δόση 300 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη (BBCH 13-29): Ευαίσθητα ζιζάνια: Βέλιουρας. Μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο το έρπον (ύψος 10-25 cm).

- στη δόση 400 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη (BBCH 13-29): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριάδα (ύψος 10-25 cm), Βέλιουρας, Αγρόπυρο το έρπον.

##### **-Ρύζι:**

- στη δόση 150 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη (BBCH 12-25): Ευαίσθητα ζιζάνια: Μouxρίτσα, Άγριο ρύζι. Μετρίως ευαίσθητα: (*Echinochloa hispidula*).

##### **-Καρότο:**

- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια (BBCH 13-21): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη, Άγριο ρύζι, Αλεπονουρά, Αιματόχορτο, Βρώμος, Λειβαδοπόα, Λεπτή ήρα, Λεπτόχλοα, Μouxρίτσα, Πολύανθη ήρα, Σετάρια, Φάλαρη.

- στη δόση 200 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Βέλιουρας.

##### **-Κρεμμύδι, Σκόρδο:**

- στη δόση 100-150 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια (BBCH 13-21): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη, Άγριο ρύζι, Αλεπονουρά, Αιματόχορτο, Βρώμος, Λειβαδοπόα, Λεπτή ήρα, Λεπτόχλοα, Μouxρίτσα, Πολύανθη ήρα, Σετάρια, Φάλαρη.

- στη δόση 200 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Βέλιουρας.

##### **-Βαμβάκι, Ηλιανθος:**

- στη δόση 100-150 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια (BBCH 13-21): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη, Άγριο ρύζι, Αλεπονουρά, Αιματόχορτο, Βρώμος, Λειβαδοπόα, Λεπτή ήρα, Λεπτόχλοα, Μouxρίτσα, Πολύανθη ήρα, Σετάρια, Φάλαρη.

- στη δόση 200-250 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Βέλιουρας.

- στη δόση 250-300 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριάδα, Αγρόπυρος, Βέλιουρας, Νεραγριάδα, Πολυετής ήρα.

##### **-Πατάτα:**

- στη δόση 100-150 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια (BBCH 13-21): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη, Άγριο ρύζι, Αλεπονουρά, Αιματόχορτο, Βρώμος, Λειβαδοπόα, Λεπτή ήρα, Λεπτόχλοα, Μouxρίτσα, Πολύανθη ήρα, Σετάρια, Φάλαρη.

- στη δόση 200-250 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Βέλιουρας.

- στη δόση 250-300 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριάδα, Αγρόπυρος, Βέλιουρας, Νεραγριάδα, Πολυετής ήρα.

##### **-Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα:**

- στη δόση 100-150 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια (BBCH 13-21): Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη, Άγριο ρύζι, Αλεπονουρά, Αιματόχορτο, Βρώμος, Λειβαδοπόα, Λεπτή ήρα, Λεπτόχλοα, Μouxρίτσα, Πολύανθη ήρα, Σετάρια, Φάλαρη.

- στη δόση 200 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Βέλιουρας.

- στη δόση 250-300 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριάδα, Αγρόπυρος, Βέλιουρας, Νεραγριάδα, Πολυετής ήρα.

##### **-Αμπέλι:**

- στη δόση 200 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μouxρίτσα, Αγριοκρίθαρο, Ήρα, Σετάρια.

- στη δόση 400 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγρόπυρος, Αγριάδα, Πολυετής ήρα, Βέλιουρας.

##### **-Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά:**

- στη δόση 200 κ.εκ./στρ.: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μouxρίτσα, Αγριοκρίθαρο, Ήρα, Σετάρια.

- στη δόση 400 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγρόπυρος, Αγριάδα, Πολυετής ήρα, Βέλιουρας.
- **Τομάτα :**
- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο, Μουχρίτσα. Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, Βρόμος, Λεπτή ήρα.
- στη δόση 150 κ.εκ./στρ.: Ευαίσθητα ζιζάνια: Σετάρια, Αγριοβρώμη, Βρόμος, Λεπτή ήρα, Πάνικο.
- στη δόση 200-300 κ.εκ./στρ.: Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: Αγρόπυρο το έρπον, Πάσπαλος, Βέλιουρας, Αγριάδα, Πάνικο.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό.
- Αν αναμένεται βροχόπτωση εντός τουλάχιστον μίας ώρας από τον ψεκασμό, μην ψεκάσετε.
- Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη. Μην το εφαρμόζετε όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε συνθήκες στρες από ξηρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία clethodim, η οποία ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**


- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας: • Εάν έχει εφαρμοστεί δόση έως 200 κ.εκ/στρ, μπορούν να φυτευτούν ραπάνια/ραφανίδες, σόγια, μαρούλι, τομάτα καρότα, αγγούρια, και κρεμμύδι. • Εάν έχει εφαρμοστεί δόση έως 300 κ.εκ/στρ μπορεί να φυτεύει καλαμπόκι μετά από 7-10 εβδομάδες και βρώμη μετά από 9-15 εβδομάδες.
- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχαστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες, εκτός από την εφαρμογή σε νεαρά φυτά αμπέλου τα οποία δεν έχει ελέγξει η φυτοτοξικότητα.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:** Καρότο: **40 ημέρες.** Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πατάτα: **56 ημέρες.** Βαμβάκι, Ηλιανθος: **100 ημέρες.** Αμπέλι (εγκατεστημένοι αμπελώνες και φυτώρια, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά (εγκατεστημένες καλλιέργειες και φυτώρια): **Μη εφαρμόσιμο.** Τομάτα: **30 ημέρες.** Ελιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Λιμμετία (μοσχολέμονο), Γκρέιπφρουτ, Φράπα: **7 ημέρες.** Ρύζι: **Μη εφαρμόσιμο.** Φακή, Ρεβύθι: **60 ημέρες.**

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλειστή, σε χώρο δροσερό, με θερμοκρασίες μικρότερες των 35 °C, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δεκαοχτώ (18) μήνες.

**Συνδυαστικότητα: --**





## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: HGHX-1NEW-HH2E-087Y

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Περιέχει clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παράτεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια και πρόσωπο κατά την ανάμιξη, φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν απέकाστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη: α) για τη δόση των 100-150 κ.εκ./στρέμμα, 5 μέτρα ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. β) για τη δόση των 200-300 κ.εκ./στρέμμα, 5 μέτρα ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%. γ) για τη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα, 5 μέτρα ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%. Επικινδύνουν για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Αναφέρατε ότι το σκεύασμα περιέχει διαλυτή υδρογονάνθρακα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

# SELECT NG®

(clethodim 12% β/ο)

## ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70509/27.11.2023


Εγγραμμένη σύνθεση: Δραστική ουσία: clethodim 12% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 86,34% β/β

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, με διασυστηματική δράση, για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδιστής του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience SAS Route d'Artix B.P. 80, 64150 Nogueres, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ριζαρείου 16, Τ.Κ:15233, Χαλάνδρι, Τηλ: 210 5578777, Αρ. ΓΕΜΗ: 122521307000



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ

UFI: HGHX-1NEW-HH2E-087Y

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Περιέχει clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

GR-2914503-04-0426

Αρ. Παρτίδας/Ημερ. Παραγωγής:  
Βλέπε συσκευασία



5 L  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

