

Gibberellic acid 10% Υδατοδιαλυτά Δισκία (ST)

**GrowGib®**

**GrowGib®**

Gibberellic acid 10%

Υδατοδιαλυτά Δισκία (ST)

Εγγυημένη σύνθεση: Gibberellic acid 10 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες 89.25 % β/β

Το γιββεριλλικό οξύ είναι μια φυσική ορμόνη των φυτών που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης, διεγείροντας τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων με αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξημένη καρπόδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8280/30.4.2018

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Κάτοχος της άδειας: L. GOBBI SRL, Via Vallecaldà 33, 16013 Campo Ligure (GE), Genova, Italy, Τηλ.: +39 010 920395, Fax: +39 010 921400, E-mail: a.zanasi@gobbi.it  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Περιβόιας 6, 145 64 Νέα Κηφισιά, Τηλ.: 210 6252600, www.phytorgan.gr  
Διανομέας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Α. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31, Τηλ.: 2130065000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

**100 γρ.**  
10 δισκία των 10 γρ.



### ΠΡΟΣΟΧΗ



- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. - Περιέχει: Άνυδρο κίτρι-κό οξύ. «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

UFI: 8A50-A092-Y00V-P7H5

υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Επίσης, παραμένει σταθερό μετά από 8 εβδομάδες αποθήκευσης στους 40°C. **ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε εσωτερική συσκευασία**

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ.** • Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλει-δομένο. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις / εκνεφώματα. • Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. • «Σε περίπτωση επανεπίστροφου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο». • Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ.** • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εισπνοής των αναθυμιάσεων, μετακινήστε το άτομο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το φάρμακο και ξεπλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. • Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμένει. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. • Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.**

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος σε γραμ. προϊόντος /στρέμμα (max) - Όγκος ψεκαστικού διαλύματος /στρέμμα - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής)**

- **Μηλοειδή (Αχλαδιά).** - Για αύξηση της καρπόδεσης και διέγερση της φυσιολογικής ανάπτυξης του καρπού. Δόσεις: 12 γραμ. (1,2 δισκία). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Εναρξη στο 20-30% της άνθησης έως τέλος άνθησης. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.
- **Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια).** - Για αύξηση του μήκους των τσαμπιών. Δόσεις: 30 γραμ. (3 δισκία). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 30-100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (70% πτώση των πετάλων) και 5-12 ημέρες αργότερα. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 2 (5 ημέρες). - Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής. Δόσεις: 30 γραμ. (3 δισκία). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 60-100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την καρπόδεση μέχρι διάμετρο ράγας 3-4 mm. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 2 (8 ημέρες).
- **Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια).** - Για αύξηση του μήκους των τσαμπιών. Δόσεις: 5 γραμ. (0,5 δισκίο). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστούς μήκους 10-15 cm. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.
- **Αμπέλι (για παραγωγή σταφίδας).** - Για αύξηση του μεγέθους της ράγας. Δόσεις: 10 γραμ. (1 δισκίο). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Μέγεθος ράγας 3 mm. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1. - Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών. Δόσεις: 5 γραμ. (0,5 δισκίο). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.
- **Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά).** - Για καθυστέρηση της ωρίμανσης. Δόσεις: 20 γραμ. (2 δισκία). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.
- **Εσπεριδοειδή (Κλημεντίνες, Μανταρινιά).** - Για διέγερση της καρπόδεσης. Δόσεις: 10 γραμ. (1 δισκίο). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την πλήρη άνθηση έως στο 2/3 της πτώσης των πετάλων. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 2 (7 ημέρες).

- **Εσπεριδοειδή (Λεμονιά).** - Για καθυστέρηση της συγκομιδής, μείωση του αριθμού των μικρών καρπών και αύξηση του μεγέθους των καρπών. Δόσεις: 20 γραμ. (2 δισκία). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.
- **Αγκινάρα.** - Για πρωίμηση της παραγωγής και καλύτερη ποιότητα. Δόσεις: 20 γραμ. (2 δισκία). Όγκος ψεκ. διαλύματος: 40-100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Ο πρώτος ψεκασμός κατά τον σχηματισμό του κεντρικού άνθους. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 3 (15 ημέρες).

**Παρατηρήσεις:** (1) Ασπερμες ποικιλίες (Σουλτανία, Thompson, ...) (2) Σουλτανία. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή για καλή κάλυψη των σταφυλιών. Ψεκασμοί κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ενα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. (3) Σουλτανία. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ενα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. (4) Μαύρη Κορινθιακή. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ενα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού. (5) Η αζωτούχος λίπανση και η άρδευση θα πρέπει να αυξηθεί. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**Συνδυαστικότητα:** -

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι του σημείου απορροής ή στοχευμένοι ψεκασμοί.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα αυτού του προϊόντος σε λίγο νερό, σε ξεχωριστό δοχείο και προσθέστε το διάλυμα στη δεξαμενή. Ξεπλύνετε το δοχείο στη δεξαμενή. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ψεκασμού λεπτομερώς. Στραγγίστε το σύστημα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη δεξαμενή ψεκασμού, τη βέργα και τα ακροφύσια δύο έως τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή για όλες τις καλλιέργειες: -**