

130mm



DOMINATOR[®]

MEGA 480 SL

ζιζανιοκτόνο

SL (Πυκνό διάλυμα)
Glyphosate

Εγγυημένη σύνθεση: **Glyphosate οξύ 48% β/ο** (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 60,8% β/ο), **βοηθητικές ουσίες: 47,50 % β/β**

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ, ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΑΡΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ, ΞΥΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΒΑΓΧΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ - ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

A.A.D.A.: 70047 / 21.05.2013

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει disodium cocoamphodipropionate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να μην έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Φοράτε ολοσωλή φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απεκαστή ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη: 5 μέτρων ή 1 μέτρο σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φθοκοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά το δέρμα με νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμοστεί συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΥΠΗ: KASJ-QHGY-PW0V-PDHV

Κάτοχος της άδειας:

Albaugh TKI d.o.o. Grajski trg 21,
SI-2327 RACE, Σλοβενία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 67 26 381, Fax: 210 67 49 514



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: **3,75 ΛΙΤΡΑ**

Ημερ. Παραγωγής / Αρ. Παρτίδας: Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας.

*Trademark of Albaugh, LLC or an affiliated company.



TKI-GR_Dominator_Mega_480_SL_15L_F_21-11-24



Ειδικές συνθήκες, γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 1. Να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή των καρπών με το σκεύασμα ή με το έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί. 2. Για τις ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 3. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές. 4. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκείμενου να αποφευχθούν υπολείμματα. 5. Να μην γίνεται ψεκασμός, αν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 6. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 7. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή. 8. Να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιμο προϊόν πριν τη συγκομιδή τους. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία glyphosate, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητική μέτρα), προκείμενου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

της σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --

της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε αγρούς μετά την συγκομιδή και πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών για τα ετήσια ζιζάνια και δεκαεπτά (14) ημερών, για τα πολυετή ζιζάνια πριν την κατεργασία του εδάφους.

της πρόσδεσης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια. Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας του: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (να νερό του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού κατασφραγισθούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαράβιαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων και υδροχαρών ζιζανίων, βελωνιών φυτών καθώς και για την καταπολέμηση της οροβάγχης του καπνού. Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ενζύμιο EPSPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος* - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ), ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά), ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά), ΕΛΙΕΣ: Για Ετήσια ζιζάνια* (Αγρωστώδη και πλατύφυλλα) δόση 115-150 κ.εκ./στρ. Για Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμτι, Αντράκλα δόση 300-450 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης καθόλη τη διάρκεια του έτους. Μέχρι 2 εφαρμογές. Για Πολυετή ζιζάνια*: Για Αγριόδα δόση 565-667 κ.εκ./στρ. Για Βελιούρα, Φτέρη δόση 375 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή, Μέχρι 1 εφαρμογή. Για Κύπερη 1η εφαρμογή κατά την άνθιση με δόση 400 κ.εκ./στρ., 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με δόση 375 κ.εκ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/ στρ.

ΒΑΜΒΑΚΙ*: Για Ετήσια ζιζάνια (Αγρωστώδη και πλατύφυλλα) δόση 115-150 κ.εκ./στρ. Για Πολυετή ζιζάνια: Για Βελιούρα δόση 375 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθισης. Μέχρι 1 εφαρμογή. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/ στρ.

ΚΑΠΝΟΣ: Για Οροβάχνη, ψεκασμό καλωψεύς: ι. 40 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με 30 κ.εκ./στρ. ή, 60 ημέρες μετά τη μεταφύτευση με 45 κ.εκ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-40 λίτρα/στρ.

ΑΓΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ: Για Ετήσια ζιζάνια* (Αγρωστώδη και πλατύφυλλα) δόση 115-

150 κ.εκ./στρ. Για Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμτι, Αντράκλα δόση 300-450 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξη. Μέχρι 2 εφαρμογές. Για Πολυετή ζιζάνια*: Για Αγριόδα δόση 565-660 κ.εκ./στρ. Για Βελιούρα, Φτέρη δόση 375 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή, Μέχρι 1 εφαρμογή. Για Κύπερη 1η εφαρμογή κατά την άνθιση με δόση 400 κ.εκ./στρ., 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με δόση 375 κ.εκ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/ στρ.

ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΕΚΤΑΞΕΙΣ: Για Ετήσια ζιζάνια* (Αγρωστώδη και πλατύφυλλα) δόση 115-150 κ.εκ./στρ. Για Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμτι, Αντράκλα δόση 300-450 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξη. Μέχρι 2 εφαρμογές. Για Πολυετή ζιζάνια*: Για Αγριόδα δόση 565-600 κ.εκ./στρ. Για Βελιούρα, Φτέρη δόση 375 κ.εκ./στρ. Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή, Μέχρι 1 εφαρμογή. Για Κύπερη 1η εφαρμογή κατά την άνθιση με δόση 400 κ.εκ./στρ., 2η εφαρμογή σε περίπτωση αναβλάστησης με δόση 375 κ.εκ./στρ. Μέχρι 2 εφαρμογές. Για Ξυλώδεις θάμνους, Δένδρα, Βάτα κλπ δόση 375-600 κ.εκ./στρ. Όταν βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Μέχρι 1 εφαρμογή. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/ στρ.

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΡΑΒΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ: Για Υδροχαρή ζιζάνια δόση 600 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μόνο σε στεγνά κανάλια, κοντά ή κατά την άνθιση των ζιζανίων. Μέχρι 1 εφαρμογή. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/ στρ.

***Μέγιστη δόση στο σύνολο των εφαρμογών 112 ημερές: 432 γρ. δ.ο. glyphosate/ στρέμμα.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Για την καταπολέμηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως μια με δύο εφαρμογές (χειμώνα-άνοιξη ή/και καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων και την καλλιέργεια όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης. 2. Για την καταπολέμηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως μια εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο μετά από αυτή. 3. Στο βαμβάκι ο ψεκασμός πρέπει να είναι κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών πριν την έναρξη της άνθισης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των φυτών. Προτείνεται η χρήση προστατευτικών καλυμμάτων (καλυπτήριων) γύρω από τα ακροφύσια. 4. Στις δένδρευτες καλλιέργειες ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των ψεκαστικών σταγονιδίων με φύλλωμα τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επωλυμένες πηλές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους σπυρώνες από το τρίτο (3ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 5. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Μολόχα, Τσουκνίδα, Πολυκόμτι, Λατάνια, Αντράκλα η δόση κυμαίνεται από 300-450 κ.εκ./στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης τους. 6. Για την αγριόδα η εφαρμογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15-30 εκ. 7. Για τη φτέρη η εφαρμογή να γίνεται μετά το ξεπλύμα της κορυφής. 8. Η χρήση στη Λεμονιά περιλαμβάνει τη χρήση στην Κίτρινη. 9. Η χρήση στη Μανταρινιά περιλαμβάνει τη χρήση στις Κλημενίνες. 10. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει τη χρήση στη Νεκταρινιά.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή τυχόν συσσωρεύσεων υπολειμμάτων στους καρπούς. Για την οροβάχνη στο καπνό εφαρμόζεται με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με ψεκασμό καλωψεύς της φυτείας. Χρησιμοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδύοντες τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή ακληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ελιά (επιτραπέζιες ποικιλίες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες), Βαμβάκι, Καπνός: 7 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημενίνη, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κίτρινη, Αμυγδαλιά, Αγροί μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας ή πριν την κατεργασία του εδάφους για σπορά, Ακαλιέρητες εκτάσεις, Κατά μήκος αρδευτικών & στραγγιστικών καναλιών (απουσία νερού): Μη εφαρμοσμένο.

TKI-GR_Dominator_Mega_480_SL_B_21-11-24



multi - com

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Ν. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ - ΑΛ. ΑΓΓΕΛΗΣ Ο.Ε.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 299-301, 133 41, Άνω Λιόσια
Τ. 210 2484071, 010, 047 - Fax: 210 2483831

info@multi-com.gr

DESIGN SPECIFICATIONS

Job Name: KARBELAS DOMINATOR MEGA 480 SL

File: Adobe Illustrator

Size: 130x143


Creation/Revision: 29-07-2025

COLOUR GUIDE:



PRINTING SPECIFICATIONS

Wind # - Φορά εκτύλιξης (No) : A SIDE (N4) - B SIDE (N3)



CYLINDER REPEAT: 88 T (279,4mm)

ACROSS: 1 ΔΙΑΚΕΝΟ: 3 mm

AROUND: 2 ΔΙΑΚΕΝΟ: 9,7 mm

Εγκριση / Approval

Date: _____

Approved: _____ Signed: _____

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
WHEN APPROVING THIS ARTWORK PLEASE MAKE SURE
THAT THE BELOW POINTS ARE CHECKED

- ☐ Όλα τα κείμενα ή η αντιγραφή είναι σωστά, συμπεριλαμβανομένων ορθογραφία
- ☐ All text or copy is correct including spelling
- ☐ Διχωρισμός χρωμάτων ή εμφάνιση είναι σωστή
- ☐ Colour separation or appearance is correct
- ☐ Αριθμός barcode είναι σωστός
- ☐ Barcode number is correct
- ☐ Τυχόν στοιχεία ή οι κωδικοί προϊόντος είναι σωστά
- ☐ Any item or product codes are correct
- ☐ Όλες οι δηλώσεις βάρους είναι σωστές
- ☐ All weight statements are correct
- ☐ Διευθύνσεις ή τα τηλέφωνα είναι σωστά
- ☐ Address or phone numbers are correct
- ☐ Όλες οι προειδοποιητικές δηλώσεις ή τα λογότυπα είναι σωστά
- ☐ All warning statements or logos are correct
- ☐ Οι διαστάσεις της μακέτας είναι σωστές
- ☐ Dimensions of the model are correct

Παρακαλούμε στείλετε την έγκρισή με e-mail ή με fax. Είναι δική σας ευθύνη ότι η μακέτα είναι σωστή, είτε λάβαμε το αρχείο από εσάς ή τη διαφημιστική σας είτε φάναξή από εμάς (εξ'αοκλήρου ή με αλλαγή). Η MULTICOM δεν υφίσταται καμία ευθύνη (γραμματική, γραφική) ή μικρές αλλαγές της αρχικής μακέτας από τη στιγμή που υπάρχει η έγκρισή σας.
Please send your approval by e-mail or by fax. It is your responsibility that the model is correct, whether we received the file from you or your advertising agency or built by us (entirely or changes). MULTICOM is not responsible for any errors (grammar, graphical) or small changes of the original scale model from the moment it is authorized