

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτιση και κατά την εφαρμογή». Πλύνετε τα χέρια με το σκεύασμα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση περιεχομένου/περίεκτου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

5 μέτρων σε πατάτα
20 μέτρων σε αμπέλι, τομάτα, κολοκυνθοειδή, κρεμμύδι, σκόρδο και ασκαλώνια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται:

- Να εφαρμόζεται πάντα σε μείγμα με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης κατά του περονόσπορου.
- Η εναλλαγή του σκευάσματος με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης.
- Να μην εφαρμόζεται για πάνω από τρεις διαδοχικές φορές.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Zoxium[®] 240SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Zoxamide 24 % (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: 77,31 % (β/β)

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερναρίωσης σε διάφορες καλλιέργειες



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.Δ.A.: 60692/27.06.2018

Περιεχόμενο: 325 κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας:

GOWAN CROP PROTECTION LIMITED,
Highlands House, Basingstoke Road,
Spencers Wood, Reading,
Berkshire RG7 1NT, Ηνωμένο Βασίλειο

Gowan[®]
CROP PROTECTION LIMITED

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου σε διάφορες καλλιέργειες. Το Zoxamide της οιάδης των Βενζιμιδαζολίων είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής που πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση της σθένειας. Δρα εξειδικευμένα εναντίον των ωομυκήτων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση σταματώντας την ανάπτυξη των μυκήτων και τη βλάστηση των σπόρων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου. **Δόση:** 62,5-75 κ.εκ./στρέμμα (62,5-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Πρωληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. (5 φύλλα). **BVCH:** 15-79. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 5/8-10.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Υ), ΣΚΟΡΔΟ (Υ), ΑΣΚΑΛΩΝΙΑ (Υ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου. **Δόση:** 62,5-75 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Πρωληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 3^{ου} φύλλου (>3 εκ.). **BVCH:** 13-89. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 4/8-10.

ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερναρίωσης. **Δόση:** 62,5-75 κ.εκ./στρέμμα (62,5-75 κ.εκ./100 λίτρα/στρ). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Πρωληπτικές εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. **BVCH:** 20-85. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 5/8-10.

ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ), ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Υ+Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου. **Δόση:** 62,5-75 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 1^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. **BVCH:** 11-89. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 4/8-10.

ΠΕΠΟΝΙ (Υ+Θ), ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ+Θ), ΚΟΛΟΚΥΘΑ (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου. **Δόση:** 62,5-75 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο έκπτυξης του 1^{ου} φύλλου της καλλιέργειας. **BVCH:** 11-89. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 4/8-10.

ΠΑΤΑΤΑ : Για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερναρίωσης. **Δόση:** 62,5-75 κ.εκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Πρωληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν από το στάδιο της έκπτυξης του 1^{ου} πλευρικού βλαστού της καλλιέργειας (5 εκ.). **BVCH:** 20-80. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων:** 5/8-10.

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της σθένειας.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προϊοντοτήσεων όπου εφαρμόζονται.
 3. Το μεσοδιάστημα εφαρμογών δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 10 ημέρες και θα πρέπει να περιοριστεί στις 8 ημέρες όταν η πίεση της σθένειας είναι υψηλή.
 4. Στο αμπέλι, όταν εφαρμόζεται σε πρόγραμμα καταπολέμησης κατά του περονόσπορου με επεμβάσεις στις πιο κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης της Φαίδας στήλης (*Botrytis cinerea*, *BOTRICH*), έχει δευτερεύουσα δράση για τον έλεγχο της Φαίδας στήλης.
- ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις.
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες):**

Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια): 28

Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια: 14

Τομάτα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: 3

Πατάτα: 7

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείτε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΣΥΝΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡ: Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βρείο. Ξεπλύνετε το βρείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας

