



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ

ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 335 - 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ.: 213 006 5000 - FAX: 210 674 7772, 210 674 9514
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΛ: 213 006 5006
website: www.elanco.gr - e-mail: contact@elanco.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΛΥΜΠΟΥ 31 - 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Τ.Θ. 1240 - 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ.: 231 028 9100
FAX : 231 028 9101
e-mail: thessaloniki@elanco.gr

Χαλάνδρι, 30-8-2018

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, εξαιτίας της αλλαγής των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (mg/l) της δραστικής ουσίας Chlorpyrifos (686/2018/Καν.ΕΕ), έχουν τροποποιηθεί οι αποφάσεις άδειας διάθεσης των σκευασμάτων **DURSBAN 750 WG** και **DURSBAN 480 EC**, σύμφωνα με την **8337/110309/08.08.2018 Υπουργική Απόφαση**. Η τροποποίηση αφορά στο φάσμα δράσης και στην τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Στο νέο φάσμα δράσης δε συμπεριλαμβάνονται οι καλλιέργειες καρότο, ραπάνι, κρεμμύδι, σπαράγγι, έχει αλλάξει στα εσπεριδοειδή το μεσοδιάστημα εφαρμογών από 15 σε 60 ημέρες και η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή από 30 σε 21 ημέρες και έχει αλλάξει στο βαμβάκι η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή από 20 σε 90 ημέρες.

Παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπ' όψη σας ότι τα ισχύοντα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/l) πριν την τροποποίησή τους από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από τις 5 Δεκεμβρίου 2018.

Η χρήση των σκευασμάτων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη νέα Υ.Α., ώστε να μην παραχθούν προϊόντα με υπολείμματα μεγαλύτερα των επιτρεπτών ορίων.

Σχετικά με τα σκευάσματα που έχετε ήδη στην διάθεσή σας, κατά την πώλησή τους στους παραγωγούς, **υποχρεούστε σύμφωνα με τη σχετική Υ.Α.** να τους ενημερώνετε για τις αλλαγές και για την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν τα σκευάσματα σύμφωνα με τους νέους όρους χρήσης.

Σχετικά με τα σκευάσματα που ήδη έχετε διαθέσει και βρίσκονται στην κατοχή των επαγγελματιών χρηστών, παρακαλείσθε να τους ενημερώσετε κατά το δυνατό για τις αλλαγές και την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν τα σκευάσματα σύμφωνα με τη νέα Υ.Α.

Σας επισυνάπτουμε τα σημεία της Υ.Α. όπως διαμορφώνονται μετά την τροποποίηση και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά στην εφαρμογή και στη χρήση των σκευασμάτων μας.

Με εκτίμηση,

Κώστας Δήμιζας
Υπεύθυνος Τμήματος Εγκρίσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A. Τροποποιούμε το φάσμα δράσης των σκευασμάτων περιεκτικότητας 48% β/ο και μορφής EC όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ΥΑ, ως προς τους χρόνους εφαρμογής και το μεσοδιάστημα εφαρμογών ώστε το σημείο 5 του κάθε σκευάσματος να περιοριστεί εντός του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο Εφαρμογής (για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα		
Εσπεριδοειδή Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	200-500	Με την εμφάνιση των προσβολών	1-2 (μεσοδιάστημα 60 ημέρες)
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά Κυδωνιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100 -250	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες)
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά Κερασιά	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	150 -312,5	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 10-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Τομάτα Πιπεριά, Μελιτζάνα υπαίθρου	>>	100-250	Εφαρμογές πριν την άνθηση (BBCH 11-59)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Βαμβάκι	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100-200	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)
Πατάτα	(για κάθε ΥΑ διάθεσης στην αγορά ισχύουν τα υφιστάμενα προ της παρούσης)	100-250	Ψεκασμός με την εμφάνιση των εντόμων και πριν το σχηματισμό των κονδύλων (BBCH 10-39)	1-2 (μεσοδιάστημα 15 ημέρες)

Παρατηρήσεις:

- 1.Στα εσπεριδοειδή να μη χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της άνθισης
- 2.Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιείται για ζωοτροφή

Γ. Τροποποιούμε το σημείο 5 της με αριθμό 1888 άδειας διάθεσης στην αγορά του Dursban 750 WG σύμφωνα με τα παρακάτω:

Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ. σκευάσματος /στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστ. υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού : λίτρα/στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ : Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	Έντομα φυλλώματος, καρπών και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	320	-	200-400	Εφαρμογές με την εμφάνιση των εντόμων. (BBCH 11-89) Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί διενεργούνται από Ιούνιο-Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 60 ημέρες.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ : Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	Έντομα φυλλώματος, και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).	160	-	100-200	Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών. Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59)	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-15 ημέρες.

<p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά</p>	<p>Έντομα φυλλώματος και ξύλου (μασητικά, μυζητικά).</p>	<p>200</p>	<p>-</p>	<p>150-250</p>	<p>Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες.</p> <p>Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών.</p> <p>Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).</p>	<p>2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.</p>
<p>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηινιά</p>	<p>Έντομα φυλλώματος, ανθέων, καρπού και ξύλου (μασητικά, μυζητικά)</p>	<p>200</p>	<p>-</p>	<p>150-250</p>	<p>Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες. (BBCH 11-89)</p> <p>Για τις ψώρες ψεκάζουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες.</p> <p>Για καρπόκαψα και ανάρσια ψεκασμοί με δόση 96 γρ./100 λίτρα νερό.</p> <p>Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).</p>	<p>2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.</p>
<p>ΛΑΧΑΝΙΚΑ : Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνα (υπαίθρου)</p>	<p>Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)</p>	<p>160</p>	<p>-</p>	<p>50-100</p>	<p>Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες.</p> <p>Πριν την άνθηση. (BBCH 10-59).</p>	<p>2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες.</p>

Βαμβάκι	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	128	-	50-80	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες.	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες
Πατάτα	Έντομα φυλλώματος, (μασητικά, μυζητικά)	160	-	50-100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες. Εφαρμογές μέχρι το σχηματισμό των κονδύλων. (BBCH10-39)	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 15 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Στα εσπεριδοειδή να μη χρησιμοποιείται την περίοδο της άνθησης (BBCH-60-69).
2. Βαμβάκι: Το ψεκασμένο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιηθεί για ζωτροφή.

Γ.	Το σημείο 13.2 των σκευασμάτων που περιέχουν δραστική ουσία chlorpyrifos όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ΥΑ (μορφής EC, CS ή WG) διαμορφώνεται εντός του παρακάτω πίνακα :	
13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή	Φυτικά προϊόντα (για τους ψεκασμούς φυλλώματος)	Ημέρες
	Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά	21
	Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πατάτα	Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής
	Κυδωνιά	30 (μόνο για το Pyrinex 25 CS)
	Βαμβάκι	90
	Για τις εφαρμογές εδάφους	Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής