



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Πλύνετε τα ακάλυπτα μέρη του σώματος μετά το χειρισμό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα, ώστε να σιγουρευτεί η σωστή πλύση. Καλέστε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, απομακρύνοντας τα λερωμένα ρούχα και παπούτσια. Πλένετε άμεσα τα ρούχα και τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίησή τους. Καλέστε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα. Αν ο πάσχοντας δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή, προτιμήστε την τακτική στόμα με στόμα. Αν εμφανίζει δυσκολία κατά την αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο. Καλέστε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αραιώστε το περιεχόμενο του στομάχου χορηγώντας νερό. Αν ο εμετός προκαλεί αυθάρμητα, κρατήστε το κεφάλι προς τους γοφούς για αποτροπή αναρρόφησης, ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. Καλέστε επείγοντως γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Να ακολουθείται συμπληρωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

To Millerplex 3-3-3:

- Περιέχει φυτικά εκχυλίσματα θαλάσσιων φυκών (Ascorphyllum nodosum).
- Χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες, κυρίως σαν πηγή φυσικών φυτορρυθμιστικών και βιοδιεγερτικών ουσιών, θρεπτικών στοιχείων και ικνιστοκεϊνών.
- Ενισχύει το μεταβολισμό του φυτού για τη σύνθεση των σακχάρων, πρωτεϊνών και όλων των συστατικών που θα μετασυσσέψουν στους καρπούς και γενικά στα εδάφιμα μέρη βελτιώνοντας και αυξάνοντας την παραγωγή.
- Υποκινεί τον σχημασμό ανθοφόρων οφθαλμών.
- Παρεμπόδιζει τη γήρανση των φύλλων και έτσι το φύλλο παραμένει ενεργό και φωτοσυνθέτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας στην καλύτερη θρέψη του φυτού.
- Επηρεάζει τη βιοσύνθεση άλλων φυσικών φυτορρυθμιστικών ουσιών με άμεσες θετικές επιπτώσεις στην παραγωγή.
- Ενεργοποιεί το αμυντικό σύστημα του φυτού (Σύστημα Επίκτητης Ανθεκτικότητας) για την αντιμετώπιση των διαφόρων καταπονήσεων που προέρχονται από περιβαλλοντικά ή παθογόνα αίτια.
- Παρατείνει τη μετασυλλεκτική ζωή των διαφόρων φρούτων και λαχανικών.
- Αυξάνει την αναπνευστική δραστηριότητα των σπόρων και συνεπώς το ποσοστό βλάστησής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Δείκτης αλατότητας: 4,99

Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 100 ppm διαλύματος λιπάσματος (μS/cm @ 20-22°C): 18,9 pH: 5-7 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσματα. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** Αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε σκοτεινό χώρο σε κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος. Κατά τον χειρισμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ με φυτικά εκχυλίσματα θαλάσσιων φυκών (Ascorphyllum nodosum)

Εγγυημένη σύνθεση:

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)	3%
Ουρία	3%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅)	3%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (K ₂ O)	3%

Αρ. Κυκλοφορίας: 106

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ με θαλάσσια φύκη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό

Περιεχόμενο: 1LT



ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Miller Chemical & Fertilizer Corporation P.O. Box 333, Radio Road, Hanover, Pennsylvania 17331, ΗΠΑ.

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Γ' Σεπτεμβρίου 144, Τ.Κ. 11251, Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 55 78 797. **Διανομέας:** ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λ. Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ. 2130 065 000



Τρόπος εφαρμογής - Δοσολογία:

Διαφυλλική εφαρμογή: 40-100 ml ανά στρέμμα.

Υδρολίπανση: 100-200 ml ανά στρέμμα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αμπέλι	30-50 ml/στρ.	Γενικά με όλες τις διαφυλλικές εφαρμογές προϊόντων θρέψης ή φυτοφαρμάκων. Εφαρμογή με όλα τα ψεκαστικά μίγματα γιββερελλίνης.
Βαμβάκι	20 ml/στρ. 30-50 ml/στρ. 40-60 ml/στρ.	Γραμμική εφαρμογή στο στάδιο 1-3 φύλλα. Σχηματισμός πτενιών. Στην αρχή και στο τέλος της ανθοφορίας.
Δενδροκομία	50-120 ml/στρ.	1. Στην εμφάνιση οφθαλμών για αύξηση της επικονίασης. (Το MILLERPLEX δεν είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες ή άλλους επικονιαστές). 2. 1 εβδομάδα μετά την πτώση των πετάλων για προώθηση της κυπαρικής διάτρησης. 3. 1-2 εβδομάδες πριν την καρπόπτωση για μείωση του φυσιολογικού στρες και της καρπόπτωσης. 4. 20-30 ημέρες μετά την πτώση των πετάλων για αύξηση του μεγέθους του καρπού. 5. Ανά μήνα κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του καρπού για προώθηση της κατανομής των θρεπτικών στοιχείων για μεγαλύτερους και ποιοτικούς καρπούς.
Σπαράγγι	90 ml/στρ. 50 ml/στρ.	Ψεκασμός στη βλάστηση 2 εβδομάδες μετά την τελευταία συγκομιδή. Ψεκασμός ανά μήνα κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.
Πατάτα	40 ml/στρ. 50 ml/στρ.	Έναρξη του σχημασμού των κονδύλων. 4-6 εβδομάδες αργότερα.
Πιπερά, Μελιτζάνα	20-40 ml/στρ. 30-60 ml/στρ.	3-5 φύλλα. Ανά 7-14 ημέρες για συνολικά 4-6 εφαρμογές.
Τομάτα	20-30 ml/στρ. 30-40 ml/στρ. 40-60 ml/στρ.	1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση ή 6-8 φύλλα. 3 εβδομάδες αργότερα. Ανά 14 ημέρες μαζί με σφέβεο ή διαφυλλικό λίπασμα.
Βιομηχ. τομάτα	20 ml/στρ. 40-50 ml/στρ.	1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση ή 6-8 φύλλα. Έναρξη ανθοφορίας και επανάληψη 2 εβδομάδες αργότερα.
Φρούλα	40-60 ml/στρ.	2-3 εβδομάδες πριν τη διακοπή λίθαρσου. Έναρξη ανθοφορίας και επανάληψη ανά 14 ημέρες.

Στις καλλιέργειες: Δημητριακά, καλαμπόκι, καρότα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι, σκόρδο, μπρόκολο, μπρόκολο, κουνουπίδι, σέλινο, ρύζι, σόγια, σπανάκι, μαρούλι, φασόλια: δόση 30-60 ml/στρέμμα.

Καλλωπιστικά-Ανθοκομία: δόση 50-100 ml/στρέμμα.

287x150mm