

ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάβαστε του περιεχόμενου / περιεχόμενου με τους εθνικούς κανονισμούς. Εφαρμόστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/αδιάβροχα ατομικά προστατευτικά για τα μάτια/προστασία. Σε περίπτωση επικίνδυνης αέρας μετά τον ψεκασμό να φοράτε βαμβακερό μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΑ: Σε περίπτωση ατυχήματος ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο, το Δελτίο Δοσολογιών Αναφοράς ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.Εάν δεν υπάρχουν ο οφθαλμικοί ερεθισμοί: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση έκθεσης: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα σε καθαρό αέρα και αφήστε το να προξέψει. Εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν παρουσιάζει δυσκολία κατά την αναπνοή και καλύψτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άθρονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΗΛΗΤΗΡΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να απορριβείτε ή ρυπαίνετε μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. Για την προστασία των υδροβίων οργανισμών, να αφήνετε φεκοσώδη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** σε καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για τις χρήσεις στα αναδομικά φυτά σε περίπτωση παλαιών ελαιώδη διαδεδομένων ή πρόσφατα εισαγμένων στη χώρα, να κάνετε δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρείο κλίμακα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φαλάδια, φιάλες) ξεπλύνονται από πίστη με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενα με τριπλάμα και τα κοπιά με οικισμό για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίνονται όλα σε σημεία αλλαγής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΟΜΗ (σε ημέρες):
Μηλιά, Αχλαδιά, Κιούβια, Βερκοκιά, Ροδάκια, Νεκταρίνια, Αγκινάρα, Αμπέλι επιτραπέζιο, Καπνός 14.
Αμπέλι αναποτίνουμε: 21, φράουλες, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι, Τομάτα, Μελτζόνα, Πιπεριά, Σμέουρα, Βατόμουρα, 3. Ανθοκομικά: Δ.Ο.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερά για δύο (2) χρόνια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΤΡΕΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΕΙΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΟΙΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

- Στο αμπέλι και στα μηλοειδή η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιερητική περίοδο, στις υπολοίπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φρούλα, αγκινάρα, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα και καλαμπακίτσια) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιερητική περίοδο.

- Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα DMIs το 50% των συνολικών επεμβάσεων.

- Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγής μυκητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μεγίστα μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΕΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΘΑΦΟΜΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Η διάρκεια επιπρότερη όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.



Εγγυημένη σύνθεση:
Penconazole: 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 89.36% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Γαλακτοματοποίηση υγρό (EC) ΠΡΟΣΟΧΗ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδιού σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, αναδομικά και άλλες καλλιέργειες.



- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιεχόμενο: **400cc**
A.A.D.A.: 60624/29.05.2017
Κάτοχος της άδειας/ Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ.Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13

Διανομή:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.,
Λεωφ. Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 213 00 65 070

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδιού σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, αναδομικά και άλλες καλλιέργειες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κιούβια: Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-140 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από το στάδιο σχηματισμού καρπών διαμέτρου 10mm έως ότου να λάβουν το 80% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 71-76). ** Δόση σκευασμάτων 0.25 κt/HA LWA. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 3/12-14. **Ροδάκιο, Νεκταρίνι, Βερκοκιά:** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 75 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την καρποσέρα έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 71-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/12-14. **Αμπέλι:** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 30 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την εμφάνιση των τριώντων έως το κλείσιμο της σταφυλής (BBCH 53-79). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 3/10-14. **Αγκινάρα:** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη επιμήκυνσης του κεντρικού βλαστού και την εμφάνιση των κύριων ανθοφόρων οφθαλμών έως το κτερίνωμα του ανώτερου τμήματος του 10-20% των κεφαλών (BBCH 51-81). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-12. **Φρούλα (Α/Θ):** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη σχηματισμού σπολίων (μήκος 2 cm) έως τη δεύτερη συγκομιδή (οι περισσότεροι καρποί έχουν χρωματιστεί (BBCH 41-89)). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-14. **Αγγούρι, Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα (Α/Θ):** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την εμφάνιση των θηλιών ανθέων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-14. **Κολοκυθάκι (Α/Θ):** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την εμφάνιση των θηλιών ανθέων στον κύριο βλαστό έως ότου 9 ή περισσότεροι καρποί να λάβουν το τελικό μέγεθος και σχήμα στον κύριο βλαστό (BBCH 51-79). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-14. **Πιπεριά (Α/Θ):** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την εμφάνιση των καρπών (BBCH 55-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-12. **Μελτζόνα (Α/Θ):** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την εμφάνιση του πρώτου ανθοφόρου οφθαλμού στην πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-12. **Τομάτα (Α/Θ):** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 35-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη του πρώτου βλαστού κορυφαίου πλευρικού βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 21-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-14. **Καννά:** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 50 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την ανάπτυξη πλάγιων βλαστών έως τη συγκομιδή του σου κλειστό άνθος έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 55-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/10-14. **Σμέουρα, Βατόμουρα:** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 40 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Έως την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1. **Ανθοκομικά (Α/Θ):** Τριαντάφυλλο, Καλεντζάκι, **Japanese spindle tree, Αίβη:** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού** και της **Σκωρίδας, Μπιγκνόνια, Ντάλια, Αγγελική:** Για την καταπολέμηση του **Οιδιού:** Χρυσάνθεμο, Πελαργόνο, Γαρνιούρα, Ποτινία: Για την καταπολέμηση της **Σκωρίδας.** Δόση: 30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 50 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την έκπτυξη του σου πραγματικού φύλλου έως την έναρξη της υπερωρίμανσης των καρπών (BBCH 13-89). **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/7-12. **Παιτσινάριες:** ** HA LWA: 10.000 εκ/στρ. επιφανείας κόμης. **Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προσοχίζονται με μεταλλοπή (τομάτα, φρούλα).**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανισμού με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμένου αναδόματος και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναμειγνύοντας την ανάδευση. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΗΑΝΙΣΜΟΥ:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βύτιο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευασματος με νερό και απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά, 2-3 φορές με καθαρό νερό.



Τίτλος / Title:	Topel 100 EC - 400 CC (Κωδικός: 11.411044)
Ημερ. αρχείου / File date:	2021 January 11
Διαστάσεις / Dimensions:	225 x 120 mm
Χρώματα / Colours:	Black • Cyan • Magenta • Yellow