

Διαχείριση μείωσης της πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

Συστάσεις

1. Εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
2. Χρησιμοποίηση μόνο των εγκεκριμένων δόσεων εφαρμογής.
3. Παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων.
Στόχευση αρχικών σταδίων ανάπτυξης εντόμων και προσβολής.
4. Ακολουθείτε τις οδηγίες ετικέτας.
(Μην εφαρμόζετε περισσότερες φορές από τον συνιστώμενο αριθμό)
5. Ακολουθείστε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM).

Τα οφέλη της χρήσης του **Closer® 120SC**

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού σημαντικών μυζητικών εντόμων.
- Ταχεία δράση κατά των εντόμων στόχων με μεγάλη διάρκεια δράσης.
- Διελασματική και διασυστηματική κίνηση.
- Νέα χημική ομάδα (Σουλφοξιμίνες) με μοναδικό τρόπο δράσης.
- Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων όπως π.χ. τα Νεονικοτινοειδή.
- Κατάλληλο σε προγράμματα διαχείρισης της ανθεκτικότητας.

06/2018



with **ISOCLAST** ACTIVE

“κλείνει τα στόματα”...
ανεπιθύμητων εντόμων



ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14632/18.12.17



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 0065000 ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289100
E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World



Τι είναι ISOCLASTTM ACTIVE

Το ISOCLASTTM ACTIVE (εμπορικό όνομα της δραστικής ουσίας **Sulfoxaflor**) είναι το νέο εντομοκτόνο της Dow Agrosiences, για την καταπολέμηση επιβλαβών και επιζήμιων για τις καλλιέργειες, μυζητικών εντόμων. Ανήκει στη νέα χημική ομάδα των sulfoxamines (σουλφοξιμίνες) που έχει διαφορετικό τρόπο δράσης από τα μέχρι τώρα γνωστά εντομοκτόνα.

Το ISOCLASTTM ACTIVE καταπολεμά αποτελεσματικά πολλούς σοβαρούς εχθρούς σε πολλές καλλιέργειες, όπως είναι: Αφίδες, Αλευρώδεις, Ψευδόκοκκοι, Κοκκοειδή, κ.ά μυζητικά έντομα. Στη καλλιέργεια των εσπεριδοειδών έχει εγκριθεί το σκεύασμα με εμπορικό όνομα **Closer[®] 120 SC (Sulfoxaflor 12% β/ο)**.



Planococcus citri



Aphis spiraecola




Toxoptera aurantii



with ISOCLASTTM ACTIVE

Τρόπος δράσης

Το **Closer[®] 120SC (IsoclastTM Active 12% β/ο)** είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με ανοδική κίνηση μέσω των ξυλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών. Στα έντομα δρα κυρίως δια της επαφής και δια της κατάποσης. Δρα σε αποκλειστικό υποδοχέα της ακετυλοχολίνης [nicotinic acetylcholine (nAChRs)] του νευρικού συστήματος των εντόμων.



Φάσμα δράσης του **Closer[®] 120SC**

Καλλιέργειες	Εχθρός - Στόχος	Δόση εφ/γής κ.εκ./στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αρ. εφ/γών ανά καλ/κή περίοδο
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ	Αφίδες <i>Aphis spiraecola</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis citricidus</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>	20	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες.	1-2
	Κοκκοειδή <i>Aonidiella aurantii</i>	20	Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/έρπουσων μορφών (όταν έχουν εκκολαφθεί τα περισσότερα αυγά) ή δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.	1-2
	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus citri</i>	40		1

Στάδια εφαρμογής

Προ-ανθικά: από την αρχή ανάπτυξης των βλαστών έως πριν την άνθηση.

Μετά την άνθηση: από το τέλος της άνθησης έως τη συμπλήρωση ωρίμανσης του χρώματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή για τα εσπεριδοειδή: 7 ημέρες

