

# AMALGEROL



## ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / αμύδων / εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Σε περίπτωση αναπνευστικού αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε / Επισκευθείτε αμέσως γιατρό.

**Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:** Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**Πρώτες Βοήθειες:** Αν πέσει στα μάτια, πλύνετε τα με καθαρό νερό. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέτε εμετό, πιείτε νερό, συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  
210 77 93 777

"Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης"

**Τρόπος Χρήσης:** Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα AMALGEROL με συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όσον για το χωράφι και καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Καθαρίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού μετά την εφαρμογή.

**Συνδυαστικότητα:** Το AMALGEROL συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα γεωργικά σκευάσματα. Να ελέγχεται πάντα η επικετα του σκευάσματος που πρόκειται να συνδυασθεί για πιθανούς περιορισμούς. Το AMALGEROL δεν συνδυάζεται με λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε Άζωτο (N), με ζιανιοκτόνα επαφής και μικροκτόνα επαφής που έχουν όξινη αντίδραση.

**Πάντα να γίνεται μια δοκιμή συνδυαστικότητας πριν την εφαρμογή.**

**Αποθήκευση και Διάθεση:** Διατηρήστε το προϊόν στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ασφαλή χώρο. Φυλάξτε το μακριά από απ' ευθείας ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 25°C. Ξεπλύνετε καλά τη συσκευασία, ριχνοντας τα νερά του ξεπλυσίματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συγκεντρώστε τα κενά δοχεία/ φιάλες συσκευασίας και καταστρέψτε τα με ασφαλή τρόπο. Μην τα χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό.

**Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση.**

**Ενισχυτικό της φυτικής ανάπτυξης.**

**Βελτιωτικό της ποιότητας και της παραγωγής τόσο σε εκτατικές καλλιέργειες όσο και σε οπωροκηπευτικά.**

**Επιτάχυνση της αποσύνθεσης φυτικών υπολειμμάτων.**

**Βελτιωτικό της δομής και ποιότητας του εδάφους.**

**Σύνθεση:** Αιθέρια έλαια, Εκχυλίσματα φυτών, Εκχυλίσματα φυκιών. Συνολικός οργανικός άνθρακας ελαχ. 20%

**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.**

**Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.**

**Το AMALGEROL είναι 100% βιο-αποικοδομούμενο**

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 21271/08.01.2004, ΦΕΚ 35/Β/16.01.2004)

**Περιεχόμενο: 1 Λίτρο**

**Παρασκευάζεται από:** Hechenbichler GmbH, Αυστρία  
**Διανομή στην Ελλάδα από:**



**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Μεσογείων 335,  
15231 Χαλάνδρι,  
Τηλ. 2130065000

## Δόσεις και Χρόνος εφαρμογής

**Λαχανικά:** 300 κ.εκ./στρ./εφαρμογή, 1η εφαρμογή 14 ημέρες μετά τη φύτευση/ φύτευμα, επανάληψη 3-5 φορές ανά 10 ημέρες. Τελευταία εφαρμογή, 3 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

**Θερμοκλίμα:** Με στάγδην άρδευση: 0,02%-0,05% (200 κ.εκ.-500 κ.εκ. σε 1000 λίτρα νερό), εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες. Διαφυλλικά: 0,3%-0,5% (300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό), εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες.

**Πατάτα:** 300-500 κ.εκ./στρ. και εφαρμογές από το στάδιο της διάγκωσης των σπολίων μέχρι το στάδιο κονδυλίων σε μέγεθος πιτζίλιου. Γίνονται 3 εφαρμογές ανά 10-14 ημέρες.

**Αμπέλια:** 300 κ.εκ./στρ./εφαρμογή, 4-5 εφαρμογές μεταξύ της εμφάνισης της ανθοστράζας και το κλείσιμο της σταφυλής.

**Οπωροφόρα δένδρα:** 300-500 κ.εκ./στρ./εφαρμογή, 4-5 εφαρμογές μεταξύ ρόδινης κορυφής και έναρξης αλλαγής χρώματος των καρπών.

**Στηρά-Αραβόσιτος:** Αποσύνθεση της καλαμιάς: Ψεκάστε με 300-500 κ.εκ./στρέμμα μαζί με 1 κιλό Ουρία πάνω στην καλαμιά. Να ακολουθεί αμέσως όργωμα του εδάφους.

**Ζαχαρότευτλα (min. 2 εφαρμογές):** 300-500 κ.εκ./στρ. στα 8-10 φύλλα, 1-2 εφαρμογές σε συνδυασμό με τις εφαρμογές εντομοκτόνων/μυκητοκτόνων.

**Μπιζέλια, φασόλια:** 300-500 κ.εκ./στρ. και εφαρμογές πριν την άνθηση (min. 2 εφαρμογές)

**Ηλιανθοί:** 500 κ.εκ./στρ. πριν τη φύτευση (στο έδαφος) και επανάληψη πριν το κλείσιμο των σειρών.

**Γκαζόν:** Ψεκάστε με 1-2 λίτρα και min. 100 λίτρα νερό ανά 1000 m<sup>2</sup>. Συνιστάται να ακολουθεί πότισμα μετά την εφαρμογή για να διασπύσει το προϊόν στο ριζικό σύστημα. Χρόνος: 2-3 ημέρες μετά το κούρεμα, επανάληψη κάθε 4-6 εβδομάδες.

**Περιορισμοί κατά τη χρήση**  
Εφαρμόστε το AMALGEROL κατά τις πρωινές ή απογευματινές ώρες. Μην εφαρμόσετε το προϊόν αμέσως μετά τη βροχή ή όταν αναμένεται πατάγος.



1222