

BAIA Cu EVO[®] 4/25WG

ΜΙΓΜΑ ΔΥΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)



manica[®]

BAIA Cu EVO 4/25 WG

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση.

A.A.Δ.A.: 60642/16.08.2017

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Μεταλλικός χαλκός (Cu): 25%
(43,86% β/β σε μορφή copper
oxychloride)

Cymoxanil: 4% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 52,14 % (β/β)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

-Προκαλεί σοβαρά ορθολογικά βλάβη.

-Υποπίο για πρόκληση βλάβης στα γονιμότητα ή στο έμβρυο.

-Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

-Περιέχει cymoxanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (copper oxychloride) με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 300 γρ./στρ. (250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος & χρόνος εφαρμογής: Από την πώση του 60% των πτελών μέχρι την αποσκόληση του καρπού. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 3. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 240 γρ./στρ. (300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σε όλα τα στάδια. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 6 / 8-10 (Υ), 2 / 7-12 (Θ). **ΠΑΤΑΤΑ:** Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 300 γρ./στρ. (300-375 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σε όλα τα στάδια. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 2/7-12.

Παρατηρήσεις: 1. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που ηλιαάζουν προς την άνοιξη. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Στις καλλιέργειες αμπέλι και πατάτα, να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προεπιδοτήσεων. 4. Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητά του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής. 5. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες, λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφιστικών ή άλλων παραγόντων, οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας. 6. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιέργεια περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση εισόδου των εργαζομένων, αυτοί θα πρέπει να φορούν γάντια, μακριά παντελόνια και μακριάμυακά ποικύματα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος μέχρις απορρόφησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκαστικού αναδευτήρα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μην ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφανείες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σασούλες, σάκκι) μαζί με τα κομμάτια σφραγισμένων προηγούμενης με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναπομένοντα όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα σταφύλια): 20 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα: 10 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεχόμενο του προϊόντος ή την ετικέτα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα σωματικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Καθαρίστε καλά με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Εάν δεν υποκαταστεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση και να το φέρετε σε καθαρό αέρα αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Ιατρικές συμβουλές - Αντίδοτα: Πίλλες στομάχου. Χρησιμοποιήστε BAL, EDTA, ή πενικιλίνη. Συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

MANICA SpA
Via all' Adige, 4, 38068 ROVERETO (Trento)

T.K. 38068, Italy

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δαβράκη 65, 17672, Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.: 6948608599

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική

Τηλ.: 2130065000

Περιεχόμενο:
1,5Kg



«ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

MA6334



066ς Μακεδονίας • Συνακία Παπακώστα • Μάνδρα Αττικής, 17600
210.55.50.031 • E-mail: design@qualityprint.gr



Τίτλος / Title:	BAIA CU EVO 4/25 WG 1,5 KG
Ημερ. αρχείου / File date:	26 Φεβρουαρίου 2021
Διαστάσεις / Dimensions:	180 x 180 mm
Χρώματα / Colours:	Black • Cyan • Magenta • Yellow • Pantone 252C • Pantone 520C • Pantone 032C

BAIA Cu EVO® 4/25WG

ΜΙΓΜΑ ΔΥΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)



manica®

BAIA Cu EVO 4/25 WG

ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με
προληπτική και θεραπευτική δράση.

A.A.Δ.A.: 60642/16.08.2017

ΕΓΧΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Μεταλλικός χαλκός (Cu): 25%
(43,86% β/β σε μορφή copper oxychloride)
Cymoxanil: 4% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 52,14 % (β/β)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Υποπίπτει για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει cymoxanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

MANICA SpA
Via all' Adige, 4, 38068 ROVERETO (Trento)
T.K. 38068, Italy

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δαβλάκη 65, 17672, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 6948608599

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιεχόμενο:

6 Kg



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (copper oxychloride) με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 300 γρ./στρ. (250-300 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος & χρόνος εφαρμογής: Από την πτώση του 60% των πετάλων μέχρι την αποσπλήρυνση του καρπού. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 3. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ)**: Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 240 γρ./στρ. (300 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σε όλα τα στάδια. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 6 /8-10 (Υ), 2 / 7-12 (Θ). **ΠΑΤΑΤΑ**: Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 300 γρ./στρ. (300-375 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σε όλα τα στάδια. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 2/7-12.

Παρατηρήσεις: 1. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Στις καλλιέργειες αμπέλι και πατάτα, να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 4. Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής. 5. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες, λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφωπενιών ή άλλων παραγόντων, οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας. 6. Η συνολική εφαρμόζομενη ποσότητα χαλκού των σκευασμάτων ανά καλλιερηγική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση εισόδου των εργατιών, αυτοί θα πρέπει να φορούν γάντια, μακριά παντελόνια και μακρυμάνικα πουκάμισα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος μέχρις απορροής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκαστικού αναδευτήρα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μην ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

ΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκoi) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται καλά κλειστά στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα σταφύλια): 20 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα: 10 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικέτα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Καθαρίστε καλά με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιαιτρό.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την επικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση και να το φέρει σε καθαρό αέρα αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Ιατρικές συμβουλές – Αντίδοτα: Πλύση στομάχου. Χρησιμοποιήστε BAL, EDTA, ή πενικιλλαμίνη. Συμπωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

«ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Μη ρυπαίνετε το νερό με το πρόϊόν ή τη συσκευασία του.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

MA6334

 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 210 55 50 031 • E-mail: design@qualityprint.gr	Τίτλος / Title:	BAIA CU EVO 4/25 WG 6 KG
	Ημερ. αρχείου / File date:	26 Φεβρουαρίου 2021
	Διαστάσεις / Dimensions:	275 x 210 mm
	Χρώματα / Colours:	Black • Cyan • Magenta • Yellow • Pantone 252C • Pantone 520C • Pantone 032C

BAIA Cu EVO® 4/25WG

ΜΙΓΜΑ ΔΥΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ
ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ



ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)



BAIA Cu EVO 4/25 WG ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με
προληπτική και θεραπευτική δράση.

A.A.A.A.: 60642/16.08.2017

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Μεταλλικός χαλκός (Cu): 25%
(43,86% β/β σε μορφή copper
oxychloride)

Cymoxanil: 4% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 52,14 % (β/β)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ

ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει cymoxanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

MANICA SpA
Via all' Adige, 4, 38068 ROVERETO (Trento)
T.K. 38068, Italy

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δαβάκη 65, 17672, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 6948608599

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιεχόμενο:

3Kg



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής (copper oxychloride) με προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 300 γρ./στρ. (250-300 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος & χρόνος εφαρμογής: Από την πτώση του 60% των πετάλων μέχρι την αποσκόληση του καρπού. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 3. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 240 γρ./στρ. (300 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σε όλα τα στάδια. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 6 / 8-10 (Υ), 2 / 7-12 (Θ). **ΠΑΤΑΤΑ:** Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Δόση: 300 γρ./στρ. (300-375 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 60-80 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σε όλα τα στάδια. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο: 2/7-12.

Παρατηρήσεις: 1. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. | 2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. | 3. Στις καλλιέργειες αμπέλι και πατάτα, να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. | 4. Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητά του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής. | 5. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες, λόγω έλλειψης ή περισσίας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφωπενιών ή άλλων παραγόντων, οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας. | 6. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιερηπτική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση εισόδου των εργατών, αυτοί θα πρέπει να φορούν γάντια, μακριά παντελόνια και μακρυμάνικα πουκάμισα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιμα-τολογικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος μέχρις απορροής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκαστικού αναδευτήρα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυθί και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μην ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ-

ΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκoi) μαζί με τα κουπά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίαση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα σταφύλια): 20 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα: 10 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικέτα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Καθαρίστε καλά με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης:

Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την επικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση και να το φέρει σε καθαρό αέρα αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Ιατρικές συμβουλές – Αντιδοτο:

Πλύση στομάχου. Χρησιμοποιήστε BAL, EDTA, ή πενικιλλαμίνη.

Συμπωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

«ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ».

Μη ρυπαίνετε το νερό με το
προϊόν ή τη συσκευασία του.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε
επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των
συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους
υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψεκαστή ζώνη
προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα.

MA6334



Τίτλος / Title: BAIA CU EVO 4/25 WG 3 KG

Ημερ. αρχείου / File date: 26 Φεβρουαρίου 2021

Διαστάσεις / Dimensions: 260 x 180 mm

Χρώματα / Colours: Black • Cyan • Magenta • Yellow • Pantone 252C • Pantone 520C • Pantone 032C