

BELEM[®] PRO

0,8 MG

Cypermethrin (συπερμεθρίνη) 0.8%
Μικροκοκκώδες (MG)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το BELEM PRO 0,8MG είναι πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΑΥΚΟΣ: Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας Κοφτοσκούληκα και Diabrotica. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος σποράς: 4cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΣΟΡΓΟ, ΗΛΙΑΘΟΣ: Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας και Κοφτοσκούληκα. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος σποράς: 4cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΚΑΡΟΤΑ & ΑΛΛΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Χρένο, Σελινόριζα, Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού, Ραπάνια: Για την καταπολέμηση των Σιδηροσκώληκων. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 2cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΛΑΧΑΝΟ: Για την καταπολέμηση των Σιδηροσκώληκων. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος μεταφύτευσης: 8cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΤΟΜΑΤΑ (βρώσιμη & βιομηχανική), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ: Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας και Κοφτοσκούληκα. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος μεταφύτευσης: 8cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση των Σιδηροσκώληκων. **Δόση:** 2.400γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 8cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΣΚΟΡΔΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΑΣΚΑΛΩΝΙΑ: Για την καταπολέμηση των Σιδηροσκώληκων. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος μεταφύτευσης: 8 cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Για την καταπολέμηση των Σιδηροσκώληκων. **Δόση:** 1.200 γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 2cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας και Κοφτοσκούληκα. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος σποράς: 4cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας και Κοφτοσκούληκα. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος μεταφύτευσης: 8cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ: Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας και Κοφτοσκούληκα. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος σποράς: 8cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΚΑΠΝΟΣ: Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας και Κοφτοσκούληκα. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη μεταφύτευση, στις γραμμές με ενσωμάτωση, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα, FISHTAIL DXP[®]. Βάθος μεταφύτευσης: 8cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

ΓΡΑΣΙΔΙ (Χλοοτάπητας): Για την καταπολέμηση των εντόμων Σιδηροσκώληκας και Κοφτοσκούληκα. **Δόση:** 1.200γρ/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Κατά τη σπορά, σε όλη την επιφάνεια με ενσωμάτωση. Βάθος σποράς: 2cm. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** 1.

•••••

Περιεχόμενο:

750 γραμ.

•••••



ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΟΚΚΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

BELEM[®] PRO

0,8 MG

Cypermethrin (συπερμεθρίνη) 0.8%
Μικροκοκκώδες (MG)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η εφαρμογή του προϊόντος γίνεται με ενσωμάτωση σε κατάλληλο βάθος με κοκκοδιανομείς που εξασφαλίζουν την τοποθέτηση του στην γραμμή σποράς, ταυτόχρονα με την σπορά της καλλιέργειας. Ρυθμίστε προσεκτικά την ροή στους κοκκοδιανομείς πριν από την έναρξη της εφαρμογής και ελέγξτε ώστε να σκορπίζεται κανονικά κατά τον χρόνο εφαρμογής. Να σπέρνετε με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με 6χλμ/ώρα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συστίσιμνες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Μετά τη εφαρμογή καθαρίστε τα μηχανήματα επί τόπου, εκεί όπου εργάζεστε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σασκούλες) ξεπλένονται με πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως: α) 1:2 (θλασθή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος τα τεύλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά ή β) 1:3 (θλασθή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβόσιτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου α).

Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωθηθεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αραβόσιτος, Αραβόσιτος γλυκός, Σόργο, Ηλιάνθος, Καρότο, Ριζώματώδη και Κονδυλώδη Λαχανικά: Χρένο, Σελινόριζα, Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού, Ραπάνια, Τομάτα (βρώσιμη & βιομηχανική), Μελιτζάνα, Πατάτα, Σκόρδο, Κρεμμύδι, Ασκαλώνια, Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκύθα, Καπνός, Γρασιδί (Χλοοτάπητας): Δεν ορίζεται (καλύπτεται από την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής).

BELEM[®] PRO

0,8 MG

Cypermethrin (συπερμεθρίνη) 0.8%
Μικροκοκκώδες (MG)

Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin 0.86% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99.14% β/β

Πυρεθρινοειδές

εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση

εντόμων εδάφους



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 14619/20.03.2018

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας:

SBM DEVELOPPEMENT, 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Δαβάρη 65, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 72, Τηλ. 2108623144



Διανομή:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι,
Τ.Κ. 152 31, Τηλ.: 210 6726381

•••••

Περιεχόμενο:

750 γραμ.

•••••



ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΟΚΚΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

BELEM[®] PRO

0,8 MG

Cypermethrin (συπερμεθρίνη) 0.8%
Μικροκοκκώδες (MG)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθετε σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές Πληροφορίες: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να εμφανιστούν μετά από πολλές ώρες. Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή χορηγήστε οξυγόνο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εδάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε το μολυσμένο ρούχο και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε εμετό και μην δώσετε υγρά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό προσεκτικά για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυττίναινε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε στη συσκευασία

