

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση κατάποσης τοποθετήστε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο και προστατεύστε τον από υποθερμία.

- Χορηγήστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα με μεγάλη ποσότητα νερού.

- Προσοχή μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην του προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.

- Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αμέσως γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»


ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μια αβέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αβέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα καλαμπόκι και **5 μέτρων** για τις υπόλοιπες καλλιέργειες ως μη γεωργική γη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση/καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του σκευάσματος.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία, καλά κλειστό, σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ήλιο και υγρασία.



Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
S-metolachlor

Εγγυημένη σύνθεση:
s-metolachlor 96 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 9,9 % (β/β)

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιεχόμενο: 1 LT

A.A.D.A.: 70379/30.01.2020

Κάτοχος της άδειας:
Syngenta Hellas AEBE
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα, Αττική
Τηλ.: 2106666612-13



Διανομέας:
ΕΙΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογειών 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβότομο, στα ζαχαρότευπλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολοέπιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διάσπαση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΡΑΒΟΣΤΙΠΟΣ: Για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων*. **Δόση:** 100-160 κ.εκ/στρ. προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά) ή 80-100 κ.εκ/στρ. νωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας) **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΠΛΑ: Για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων*. **Δόση:** 80-130 κ.εκ/στρ. προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά) **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων*. **Δόση:** 100-130 κ.εκ/στρ. προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά) ή 100 κ.εκ/στρ. προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3 - 5 εκ.)** **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1

ΤΟΜΑΤΑ: Για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων*. **Δόση:** 100-130 κ.εκ/στρ. πριν από τη μεταφύτευση της τομάτας **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1

ΠΑΤΑΤΑ: Για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων*. **Δόση:** 100-130 κ.εκ/στρ. προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1

ΚΑΠΝΟΣ: Για την αντιμετώπιση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων*. **Δόση:** 100-130 κ.εκ/στρ. πριν από τη μεταφύτευση του καπνού **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-60 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1

* **Ευαίσθητα ζιζάνια:** Echinochloa crus-galli (μουχρίσι), Digitaria spp. (ματάγορτο), Setaria spp. (αστάρι), Amaranthus spp. (βλίτη), Solanum nigrum (νιγρονοματίδα), Portulaca oleracea (γλυστριδα), Lolium spp. (ήρα), Capsella bursa-pastoris (καφέλα), Matricaria spp. (χαιμαμήλι), Fumaria spp. (καπνόχορτο).

- **Μερίσιμα ευαίσθητα ζιζάνια:** Chenopodium album (λουβουδιά), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Cyperus esculentus (κίτρινη κύπερη), Stellaria media (στελλάρια).

Παρατηρήσεις:

-** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το σκεύασμα συνιστάται να συνδυάζεται με COTORAN 90 WG

- Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη.

- Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφυτευμένες.

- Στον αραβότομο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή αν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Αν δεν βρέξει σε μία εβδομάδα από την εφαρμογή να επακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή. Η εφαρμογή του σκευάσματος δεν θα πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκπλυση της δραστικής ουσίας και των μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση) αλλά και για την αποφυγή φυτοτοξικότητας. **Διαχείριση Ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία s-metolachlor, ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα K3 κατά HRAC.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Στον ίδιο αγρό, να μη σπέρνεται ή φυτεύεται άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις συνιστάμενες, πριν περάσουν 5 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Αραβότομος, Ζαχαρότευπλα, Βαμβάκι, Τομάτα, Πατάτα, Καπνός:-

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 30-60 λίτρα ανά στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάζουμε υπό συνεχή ανάδευση, εντός ολίγων ωρών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Στην πατάτα (προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια), το σκεύασμα μπορεί να συνδυαστεί με το SENDOR 70 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Στο βαμβάκι προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ.) το σκεύασμα μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 90 WG στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις. Επίσης προφυτρωτικά στο βαμβάκι το σκεύασμα μπορεί να συνδυαστεί με το COTORAN 50 SC στις χαμηλότερες εγκεκριμένες δόσεις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Πλύνετε καλά το ψεκαστικό μετά τη χρήση. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βυτίου με καθαρό νερό χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 της χωρητικότητάς του. Βάλτε το ψεκαστικό σε λειτουργία. Αφού το αδειάσετε επαναλάβετε την διαδικασία. Ψεκάστε το νερό του καθαρισμού σε ακαλιέργητο έδαφος μακριά από πηγές νερού. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 066ς Μακροβόνιας • Έναρκια Παπακόστα • Μέγισθα Αττικής, 19600 210.55.50.031 • E-mail: design@qualityprint.gr	Τίτλος / Title:	Benon 96 EC 1 LT (version 2)
	Ημερ. αρχείου / File date:	2020 March 09
	Διαστάσεις / Dimensions:	266 x 150 mm
	Χρώματα / Colours:	Black • Cyan • Magenta • Yellow