



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργαστής θα πρέπει να φορέει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Να αποφευχθεί η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξπλύνετε αμέσως με άφρονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφρονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης: Καλέστε αμέσως γιατρό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφυγείτε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το CORDALENE SC είναι βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια της κατάποσης, με την οποία οι προνυμφές σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παράθεσης ψεκαστικού υγρού: Ανεκτικότερο καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βύτιο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βύτιο αναδίδοντας συνεχώς. Ξπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βύτιο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προστασία του.

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Τριπλό ξέλυμμα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή αποσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γάλα τριπλό ξέλυμμα (τα νερά του ξέλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τριμπύρα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογυγίες ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί: Αποφεύγετε τη χρήση νερού με pH>8, εκτός κι αν χρησιμοποιούνται παραγοντα αζίνωσης. Σε περίπτωση μίγματος με άλλο φ.π. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες (περιορισμοί κλπ) που ισχύουν και περιγράφονται στην ετικέτα του άλλου φ.π.

Στοιχεία φυτοεξοικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Προσοχή να δίνεται όταν αναμειγνύεται το προϊόν με άλλα προϊόντα προερχόμενα από έλαια ή επιφανειοδραστικά αφού τέτοιου συνδυασμού μπορεί να προκαλέσει φυτοεξοικότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε το σε μια μικρή περιοχή.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως βορφογλυκοί πολτός, κ.ά.

Προφυλάξεις για τους εργαστές:

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να φυλάσσεται ψυγασμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Σε θερμοκρασία 20 °C, παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σε όλες τις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.

Ημερομηνία παραγωγής / Αρ. Παρτίδας: Βλέπε συσκευασία



Bacillus thuringiensis subsp. *kurstaki* strain EG2348 (Βάκυλλος Θουριγγίας)
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:

Bacillus thuringiensis subsp. *kurstaki* strain EG 2348: 18,8% β/ο
ισοδύναμο με 24.000 I.U. *Zn*/mg σκευάσματος
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β

**Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση
κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων**

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Περιέχει τον μικροοργανισμό *Bacillus Thuringiensis* var. *Kurstaki* strain EG2348. Οι μικροοργανισμοί ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14576 / 02.08.2016

Κάτοχος της έγκρισης: CBC (Europe)
Via Majorana n. 2, Nova Milanese (MB)
Ιταλία



Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.



Υπεύθυνος για
τη διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΚΟ ΕΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335

Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: 210 6726381

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κουδονιά): Κατά των φυλλοδέτων και των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκανιά, Κερασιά): Κατά των: καρποκόφα, θλαστοράκτη, φυλλοδέτων, φυλλοφάγων καμπιών και υπονομιών. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ**: Κατά της Εστιάς. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ** (Γκρέιπ φρουτ, Λεμόνι, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά): Κατά του Ανθοτρήτη. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 200-400 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ**: Κατά των φυλλοδέτων, των φυλλοφάγων καμπιών και των υπονομιών. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ**: Κατά των φυλλοδέτων. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΕΛΙΑ**: Κατά του Πυρηνότρητη. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΑΜΠΕΛΙ** (Οπωπολήριο & επιτραπέζιο): Κατά της Ευδεμίδας και της Καγκυλίας. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό (75-100 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 10-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Υ/Θ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα): Κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΦΥΛΛΩΔΗ ΚΑΙ ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Υ/Θ (Κουνουπίδι, Λάχανο, Αγκινάρα, Μαρούλι, Μπάμπη, Πράσα): Κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΒΑΜΒΑΚΙ**: Κατά του πρόσνου σκουληκιού και του ρόβινου σκουληκιού. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ**: Κατά της Πυραλίδας, του πρόσνου σκουληκιού και της σεξάνας. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΚΑΠΝΟΣ**: Κατά του πρόσνου σκουληκιού. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΚΑΛΑΠΙΣΤΙΚΙΑ** (Υ/Θ): Κατά των φυλλοφάγων και ανθοφάγων προνυμφών. Δόση: 40-66,7 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 200-300 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΔΑΣΙΚΑ ΕΛΙΑ**: Κατά των φυλλοφάγων προνυμφών (Πτυνοκάμπη, Λυμνιτριά, Υφάντρη, Μαλακόμοι). Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-200 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.