



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργαστής θα πρέπει να φορέσει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Να αποφευχθεί η επαφή με το δέρμα και τα ματιά.

ΠΡΑΤΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφρονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφρονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση δηλητηρίασης: Καλέστε αμέσως γιατρό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αντιδοτό: Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το CORDALENE SC είναι βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια της κατάποσης, μετά την οποία οι προνυμφές σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλυψόμενων φυλλωμάτων.

Τρόπος παράδοσης ψεκαστικού υγρού: Ανακινείται καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τα μάτια: προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδίδοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προστασία του.

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Τριπλό Ξέπλυμα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή αποποχή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό Ξέπλυμα (τα νερά του Ξέπλυντος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριψύμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλύνει: Αποφευχθεί η χρήση νερού με pH > 8, εκτός κι αν χρησιμοποιήσετε παραγόντα οξίνισης. Σε περίπτωση μίγματος με άλλο φ.π. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες (περιορισμοί κλπ) που ισχύουν και περιγράφονται στην ετικέτα του άλλου φ.π.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Προσοχή να δίνεται όταν αναμειγνύεται το προϊόν με άλλα προϊόντα προερχόμενα από έλαια ή επιφανειοδραστικά αφού τέτοιου συνδυασμού μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε το σε μια μικρή περιοχή.

Ανθεκτικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκληρά σκευάσματα όπως βορβογαίες πολτός, κ.ά.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

Συνθήκες αποθήκευσης: Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να φυλάσσεται ψυφραγμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Σε θερμοκρασία 20 °C, παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σε όλες τις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.

Ημερομηνία παραγωγής / Αρ. Παρτίδας: Βλέπε συσκευασία

CORDALENE SC

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG2348 (Βάκκιλος Θουριγγιάς)
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Έγγραφο σύνθεσης:

Bacillus thuringiensis subsp. *kurstaki* strain EG 2348: 18,8% β/ο
ισοδύναμο με 24.000 I.U. *Zn*/mg σκευάσματος
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Περιέχει τον μικροοργανισμό *Bacillus Thuringiensis*
var. *Kurstaki* strain EG2348. Οι μικροοργανισμοί ενδέχεται
να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14576 / 02.08.2016

Κάτοχος της έγκρισης:

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica 25

24050 Grassobio (BG), Ιταλία



Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.



Υπεύθυνος για

τη διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335

Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλ.: 210 6726381

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- **ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κουδιά):** Κατά των φυλλοδέτων και των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά):** Κατά των: καρποφάγα, Βλαστοράκτη, φυλλοδέτων, φυλλοφάγων καμπιών και υπονομιζώντων. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ:** Κατά της Ευλιάς. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΕΣΠΕΡΙΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρουτ, Λεμόνι, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κίτρινα):** Κατά του Ανθοτρήτη. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 200-400 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ:** Κατά των φυλλοδέτων, των φυλλοφάγων καμπιών και των υπονομιζώντων. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ:** Κατά των φυλλοδέτων. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΕΛΙΑ:** Κατά του Πυρηνότρητη. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΑΜΠΕΛΙ (Οπωλοπέλαο & επιτραπέζιο):** Κατά της Ευδιάσας και της Καγγυλιάς. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό (75-100 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 10-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΣΙΔΑΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Υ/Θ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα):** Κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΦΥΛΑΔΗ ΚΑΙ ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Υ/Θ (Κουνουπίδι, Λάχανο, Αγκινάρα, Μαρρούλι, Μπάμπια, Πράσο):** Κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Κατά των πρώτων σκυληκιάς και του ρόβινου σκυληκιάς. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** Κατά της Πυραλίδας, του πρώτου σκυληκιάς και της οξείας. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΚΑΠΝΟΣ:** Κατά του πρώτου σκυληκιάς. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΚΑΛΑΠΟΤΙΣΚΙΑ (Υ/Θ):** Κατά των φυλλοφάγων και ανθοφάγων προνυμφών. Δόση: 40-66,7 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 200-300 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.
- **ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ:** Κατά των φυλλοφάγων προνυμφών (Πιτυοκάμψη, Λυγαντήρα, Υοάνθη, Μολακόμυα). Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-200 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκάσμος με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδο: 3.

