

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία». **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρό και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι ανασταθμένος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκάστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. **Αντιδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 77 93 777. Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): 210 5714417.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λθόσρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους: Στα εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και δέντρα άνω των 2 μέτρων, να αφήσετε μια αφέαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκάστικού νέφους κατά 50% ή να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκάστικού νέφους κατά 80%. Στην καλλιέργεια της αμπέλου, να αφήσετε μια αφέαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήστε μια αφέαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων, από επιφανειακά ύδατα. Επικινδύνιο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικίνδυνες μην εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Στις προανθικές εφαρμογές, σταματήστε τις εφαρμογές 5 μέρες πριν την έναρξη της άνθησης. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να φροντίζουν να απομακρύνουν ή να καλύπτουν τις κυψέλες κατά την διάρκεια και 5 ημέρες μετά την εφαρμογή από την περιοχή.

Θερμοκλιπτική εφαρμογές: μπορεί να επηρεάσει τα ωφέλιμα και τους επικονιαστές. Αποφύγετε την άσκοπη χρήση του προϊόντος. Προστατέψτε ή μετακινήστε τις αποικίες των επικονιαστών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής καθώς και 5 μέρες μετά την εφαρμογή. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται παρουσία των ωφέλιμων οργανισμών *Aleochara bilineata*, *Geocoris punctipes*, *Coccinella septempunctata*, *Chrysoperla carnea* και *C. rufilabris* και αρκτικών της οικογένειας *Phytoseidae*. Μην εξαπολύετε ωφέλιμα έντομα πριν περάσουν: • 7 ημέρες από την εφαρμογή του προϊόντος για τα *Orius laevigatus*, *O. insidiosus*, *Hippodamia convergens* και *Macrolophus caliginosus*. • 21 ημέρες από την εφαρμογή του προϊόντος για τα *Adalia bipunctata*, *Macrolophus basicornis*, *Nesidiocoris tenuis* και για τα μμενόπτερα παρασιτοειδή *Eretmocerus mundus* (παρασιτοειδές των αλευρωδών *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*), *Aphidius rhopalosiphii* (παρασιτοειδές αφιδών των σιτηρών), *Cales noacki* (παρασιτοειδές του εριώδη αλευρωδών των σπτεριδοειδών *Aleurothrix flaccosus*).



Closer™ 120 SC
Isoclast™ active

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Εγγυημένη σύνθεση: Sulfoxaflor 12% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 88.1% β/β

Πυκνό Εναιώρημα (SC)

**Διασυστηματικό εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**



ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κάτοχος της άδειας: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι

Τηλ.: +30 2106889700

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΛΑΝΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, Τ.Κ.15231 Χαλάνδρι, Τηλ: 2130065070

™/® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Κάτοχοι κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης (ισχύει από 20.05.2023 έως 16.09.2023): ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΚΣΟΠ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ, ΑΟΣΦ Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ, ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ "Η ΕΝΩΣΗ"

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Διαχείριση της ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική sulfoxaflor, η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά IRAC.

Για να μειωθεί η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Η συνεχής χρήση ενός εντομοκτόνου, μπορεί να το καταστήσει λιγότερο αποτελεσματικό με την πάροδο του χρόνου ή να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στον τρόπο δράσης του. Η σωστή εφαρμογή του, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες βοηθά στη σωστή διαχείριση του σκευάσματος. • Η συνεχής χρήση της ίδιας δ.ο. θα επιταχύνει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας: Η δραστική Sulfoxaflor που έχει διαφορετικό τρόπο δράσης και δεν έχει αναπτύξει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλα εντομοκτόνα, μπορεί να εφαρμόζεται σε προγράμματα με άλλα εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. • Ως γενική αρχή η συνεχής χρήση της ίδιας δ.ο. ή δ.ο. με τον ίδιο τρόπο δράσης επιφέρει μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και πρέπει να αποφεύγεται. Γι' αυτό προτείνεται το σκεύασμα να χρησιμοποιείται είτε 1 φορά (max 40 κ. εκ. σκευάσματος /στρέμμα) ανά καλλιεργητική περίοδο, είτε 2 φορές (max 2x20 κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα), με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες ανά γενιά εντόμων. Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών του σκευάσματος είναι 1-2, ανάλογα το έντομο-εχθρό και την καλλιέργεια έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα εφόσον το σκεύασμα εναλλάσσεται με σκευάσματα άλλου τρόπου δράσης. • Αποφύγετε τη μείωση των προτεινόμενων δόσεων του σκευάσματος. • Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων στόχων σε χαμηλά επίπεδα.

**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΛΕΙΔΑ**

Α.Α.Δ.Α.: 14632 / 18.12.2017

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. Σε περίπτωση γνωστών ευαίσθητων ποικιλιών (ευαίσθητα ανθοκομικά φυτά κ.α.) συστήνεται αρχικά η εφαρμογή του σκευάσματος σε μικρό αριθμό φυτών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες):

Σολανώδη, Κολοκυνθοειδή, Βολβώδη, Καλλωπιστικά: 1. Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Αγκινάρα Σταυρανθή: 7.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των ψεκαστήρων με βέργα χειροκίνητων ή μηχανοκίνητων) πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και απορρυπαντικό. Το νερό του ξεπλύματος να μην ρίχνεται σε ευαίσθητα τμήματα της καλλιέργειας ή σε έδαφος που προορίζεται για κάποια ευαίσθητη καλλιέργεια. Επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το CLOSER® 120 SC είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο με κίνηση μέσω των φυλλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των φυτικών ιστών. Στα έντομα δρα κυρίως δια της επαφής και δια της κατάποσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΧΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ) (Τομάτα, Πιπεριά, Πιπεριά chili, Μελιτζάνα, περιλαμβανεται η ποικιλία peripos): Όγκος ψεκ. υγρού: 50 -150 λίτρα/στρέμμα. Για την καταπολέμηση των Αφίδων: Δόση: 20 κ.εκ./ στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. Επανάληψη αν χρειάζεται

7 ημέρες μετά. Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1-2. *Για την καταπολέμηση των Αλευρωδών: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. (Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1-2) ή 40 κ.εκ./στρ. (Μέγ. Αρ. εφαρμογών / καλ. περίοδο: 1). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.). Εφαρμογές Θερμοκηπίου: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ) (Αγγούρια, Αγγουράκια gherkins, Κολοκυθάκια, Κολοκύθες, Καρπούζια, Πεπόνια): Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα.

Για την καταπολέμηση των Αφίδων: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων. Επανάληψη αν χρειάζεται 7 ημέρες μετά. Εφαρμογές Θερμοκηπίου: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως το 70% της ωρίμανσης των καρπών. Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1-2. *Για την καταπολέμηση των Αλευρωδών: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. (Μέγ.αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1-2) ή 40 κ.εκ./στρ. (Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1). Εφαρμογή (20 κ.εκ./στρ.) με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.). Εφαρμογές Θερμοκηπίου: από το στάδιο του 1ου σταυρού έως το 70% της ωρίμανσης των καρπών.

ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ & ΘΑΜΝΟΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ) (Τριαντάφυλλο, Γαρίφαλλο, Χρυσάνθεμο, Ζέρμπερα, Καλέντουλα, Γλαδιόλα, Νάρκισσος, Δάφνη, Κρίνος, Τουλίπα, Αζαλέα, Γεράνι, Μπικκόνια, Φίκος Μπέντζαμιν, Αγριοπανσές): Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 200 λίτρα/στρέμμα. Για την καταπολέμηση των Αφίδων: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Από την αρχή της βλάστησης και έως πριν την άνθηση. Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1-2. *Για την καταπολέμηση των Αλευρωδών: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. (Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1-2) ή 40 κ.εκ./στρ. (Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1). Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./ στρ.) Από την αρχή της βλάστησης και έως πριν την άνθηση.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ & ΘΑΜΝΟΙ (Τριαντάφυλλα) (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του Μαύρου Αλευρώδη (χρήση ήσσονος σημασίας)**: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. (Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1-2) ή 40 κ.εκ./στρ. (Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1). Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 200 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή (20 κ.εκ./στρ.) με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40κ.εκ./στρ.)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (βάσει της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης με περίοδο ισχύος από 20.05.2023 έως 16.09.2023)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. *Για την καταπολέμηση των Αφίδων και του Μαύρου Αλευρώδη: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./στρ.). **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1-2.** *Για την καταπολέμηση της αψίδας Eriosoma lanigerum στη μηλιά: Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (40 κ.εκ./στρ.). Από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.** *Για την καταπολέμηση των Κόκκοειδών και της Ψώρας του Σαν Ζοζέ: Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ ερπυστών μορφών (όταν έχουν εκκολληθεί τα περισσότερα αυγά). Από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.**

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Κερασιά): Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. *Για την καταπολέμηση των Αφίδων και του Μαύρου Αλευρώδη: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Σε περιπτώσεις μεγάλης προσβολής προτείνεται μία εφαρμογή με το μέγιστο της δόσης (40 κ.εκ./στρ.). **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1-2.** *Για την καταπολέμηση των Αφίδων Myzus persicae και Myzus cerasi: Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.** *Για την καταπολέμηση των Κόκκοειδών και της Ψώρας του Σαν Ζοζέ: Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ ερπυστών μορφών (όταν έχουν εκκολληθεί τα περισσότερα αυγά). Από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.**

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά): Όγκος ψεκ. υγρού: 100-250 λίτρα/στρέμμα. *Για την καταπολέμηση των Αφίδων: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1-2.** *Για την καταπολέμηση των Κόκκοειδών του Ψευδόκοκκου και του Μαύρου Αλευρώδη: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. (**Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1-2**) ή 40 κ.εκ./στρ. (**Μέγ. Αρ. εφαρμογών/ καλ. περίοδο: 1**). Εφαρμογή στο στάδιο των κινητών/ ερπυστών μορφών (όταν έχουν

εκκολληθεί τα περισσότερα αυγά) ή δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες. Από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως τη συμπλήρωση του 50% της ωρίμανσης του καρπού.

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ (Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι): Όγκος ψεκ. υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. *Για την καταπολέμηση των Αφίδων: Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων από τέλη Μαΐου ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών έως το σχηματισμό της κεφαλής. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.**

ΑΜΠΕΛΙ: Όγκος ψεκ. υγρού: 80-150 λίτρα/στρέμμα. *Για την καταπολέμηση των εντόμων: Ψευδόκοκκος, Κόκκοειδή, Τζιτζικάκι, Scarphoideus titanus, Μαύρος αλευρώδης. Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή από την καρπώδεση (τέλη Μαΐου ανάλογα με την ποικιλία) έως την ολοκλήρωση της ωρίμανσης των σταφυλιών. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.**

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Όγκος ψεκ. υγρού: 30-150 λίτρα/στρέμμα. *Για την καταπολέμηση των Αφίδων. Δόση: 20 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων (20 κ.εκ./στρ.) και επανάληψη αν χρειαστεί μετά από 14 ημέρες, από τέλη Μαΐου ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των φυτών έως την έναρξη της επιμήκυνσης του κύριου βλαστού. **Μέγ. Αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1-2.**
ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (BBCH 60-69)

Παρατηρήσεις:

1. **Η μέγιστη δόση/στρέμμα/καλλιεργητική περίοδο είναι: 40 κ.εκ.,** για τα Σολανώδη, Κολοκυνθοειδή, Βολβώδη, Καλχωπιστικά φυτά και λουλούδια, Καλχωπιστικά δένδρα και θάμνοι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Αμπέλι.
2. **Η μέγιστη δόση/ στρέμμα/ καλ. περίοδο είναι: 20 κ.εκ.,** για τα σταυρανθή (brassicas).
3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχόπτωση μέσα στην επόμενη 1 ώρα.
4. Αμπελόφυλλα στα οποία έγινε χρήση του σκευάσματος, να μη χρησιμοποιηθούν με σκοπό την βρώση. ** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη χρήση ήσσονος σημασίας στην καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινάστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.