

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ φλόγες/ θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Απορρύψτε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα απομική προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο. «Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια. «Οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και οσπονύ. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι έγκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Σε περίπτωση κατάσπονσης: Καλέστε αμέσως το KΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαβεσία. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ.

Πληροφορίες για το γιατρό: Θεραπευτική μέτρα: Επιπλός χειρισμός: συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία. Μετά από επαφή με τα μάτια, εντατάλαξη τοπικά αναισθητικών σταγόνων π.χ. 1% amethocaine hydrochloride. Χορηγήστε αναλγητικά αν χρειάζεται. Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Αντιμετώπιση σπασμών: Χορηγήστε διαζεραπ: για ενηλίκες 5-10 mg ενδοφλεβίως. Χορηγήστε όσο χρειάζεται ώστε να ηρεμήσει πλήρως ο παθών. Η παιδιά 2.5mg ενδοφλεβίως.

Αντενδείξεις αστρονή και παράγωγα αδρεναλίνης:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακλούσθητε τις οδηγίες χρήσης.»

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά, αποφύγετε τη ρύπανση μέσω αγροτικών δρόμων ή αυλακών). Μετά την εφαρμογή οι μελισσές πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρύνθουν οι κυψέλες. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά: -5 μέτρων για τις υπαίθριες καλλιέργειες εκτός από τις δενδρύδες και τα αμπέλια ή καθόλου αφέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. -15 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες με μειωμένης διασποράς 90%. Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά νερά για τα αμπέλια με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Για να προστατέψετε μη στοχευόμενο αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για τις υπαίθριες καλλιέργειες κ.α. καλλιέργειες με μόνιμο μικρότερο από 50 cm (ή καθόλου αφέκαστη ζώνη προστασίας με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%) από τη μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται αφέκαστη ζώνη προστασίας από τη μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, το αμπέλι κ.α. καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 εκ. με τη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Επικίνδυνο για τις μελισσές. Για να προστατέψετε τις μελισσές και άλλα έντομα επικονίασής μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζανία πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μελισσές συλλέγουν.

DELTAPRO

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 2,5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,19 % β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υγρό και στομάχι εύφλεκτα.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρή οιφθαλμική βλάβη.
- Μπορεί να προκαλέσει υπηνία ή ζάλη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

A.A.D.A.: 14834/20.06.2023

Περιεχόμενο: 1 Λίτρο

Κάτοχος της άδειας:

Gowan Crop Protection Limited
Rothamsted Research, West Common,
Harpenden, Hertfordshire,
AL5 2JQ, Ηνωμένο Βασίλειο



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065070

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή η καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψηλαμένους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υψηλά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό έξπλιμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νέρα του έξπλιματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρόπουμένως στη διασφάλιση της μη περατέωρα χρήσης εναποτίθενται σε ομηρία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία στο χώρο έργου, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΤΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. deltamethrin η οποία ανήκει στην ομάδα 3A κατά IARC. Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αμπέλι και άλλες υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος μεγαλύτερο από 50 cm απαιτείται χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%. Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας: • Χρήση καλλιέργεικων τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνο σταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά ωριματικά ζημιάς. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με άλλα σκεύασμα που περιέχουν τη δ.ο. deltamethrin. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλογή με εντομοκτόνο από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. • Να διενεργεται ουσιαστικός έλεγχος των πληθυσμών των εγκριθέντων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας ειδικό σύστημα μικροδοκινής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. • Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκεύασμα διαφορετικής ομάδας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΩΣΗ

Βαμβάκι, Ζαχαρόπετρα, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινά, Γκρέιπ-φρούτ, Νεραντζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αραβόσιτος, Σπάρι, Κριθάρι, Βρύμων, Σικάλη: 30 ημέρες.

Μηδική: 14 ημέρες.

Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μπιζέλια, Καπνός, Μηλά, Αγλαδιά, Κυδώνια, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βισσινιά, Φύλλα Σελύνου, Μαΐντανος, Φασόλια, Φακή, Ρεβίζια: 7 ημέρες. Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτάνια, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθη, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα, Αγκινάρα: 3 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρύστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευτήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστικό με κοινό απορρυπαντικό αφαριώντας όλα τα ορατά πολεύματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λαβέτε όλες τις απαραίτητες προφύλαξης όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήματος. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νέρα του καθαρισμού κοντά σε υδατίνους πόρους.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοίδες εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μιζητικών και μαστητικών εντόμων. Το δελταμεθίνη δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαιλούσις των ιόντων Να στις προσιναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΣΙΔΑ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερατζιά): Για την αντιμετώπιση των αιφίδων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. (30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για την αντιμετώπιση του λεκάνου και της μύγας της μεσογείου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1.

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά): Για την αντιμετώπιση των αιφίδων. **Δόση:** 42-50 κ.εκ./στρ. (30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για την αντιμετώπιση του λεκάνου και της μύγας της μεσογείου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών:** **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Ψεκασμός με την εμφάνιση των πτήσεων των αικμαίων:** **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσουμούλιά): Για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας, των αιφίδων και της ψύλλας της μηλιάς. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. (30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας της καρυδιάς και της καστανιάς. **Δόση:** 42-50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Για την αντιμετώπιση του ευρύτουμοι. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την ενάρξη των πτήσεων των αικμαίων. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά¹, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά): Για την αντιμετώπιση φυλλοδετών και της ανάρασις. **Δόση:** 35-49 κ.εκ./στρ. (35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για την αντιμετώπιση της ραγολείδας. **Δόση:** 40-70 κ.εκ./στρ. (40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για την αντιμετώπιση της μύγας της μεσογείου. **Δόση:** 50-70 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για την αντιμετώπιση των αιφίδων και της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς. **Δόση:** 30-70 κ.εκ./στρ. (30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1.

ΑΜΠΕΛΙ²: Για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. **Δόση:** 50-70 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) για την 1η γενεά και 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού για την 2η και 3η γενεά. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Για την αντιμετώπιση της κοκχιλίδας. **Δόση:** 50-70 κ.εκ./στρ. (50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για την αντιμετώπιση των τατζικάκια. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΦΡΑΟΥΓΑ (Υπαίθριος και Θερμοκηπιόνι): Για την αντιμετώπιση των αιφίδων. **Δόση:** 25-50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΕΛΙΑ: Για την αντιμετώπιση του δάκου. **Δόση:** 50-70 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Εφαρμογή σύμφωνα με τις συλλήψεις των αικμαίων στις παγίδες. Για την αντιμετώπιση του λεκάνου. **Δόση:** 50-70 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. Για την αντιμετώπιση της βαμβακάδας. **Δόση:** 30-70 κ.εκ./στρ. (30-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Εφαρμογή με την εμφάνιση των προσβολών. Για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρύπα. **Δόση:** 30-70 κ.εκ./στρ. (30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) για την ανθήσηα γενεά και 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού για την καρπόβια γενεά). Εφαρμογή στην ενάρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά) μεταξύ ωθεσθών και εκκλωπών των αιφών και σύμφωνα με τις συλλήψεις των αικμαίων στις φερμονικές παγίδες. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-140 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΠΡΑΣΟ, ΣΚΟΡΔΟ: Για την αντιμετώπιση θριπών και κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-50 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτα Υπαίθρου ή Πιπεριά Υπαίθρου και Θερμοκηπίου, Μελιτζάνα Υπαίθρου): Για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκού, της σποντόπτερας, του δουρφύρου και των αιφίδων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. (Y) και 30-70 κ.εκ./στρ. (O) (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (Y) και 60-140 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση της βρωμούσας. **Δόση:** 18-30 κ.εκ./στρ. (Y) και 18-42 κ.εκ./στρ. (O) (30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 42-70 κ.εκ./στρ. (70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού) (O). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. (Y) (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (Y) και 60-140 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση της βρωμούσας. **Δόση:** 18-42 κ.εκ./στρ. (O) (30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (Y) και 60-140 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Τομάτα, Μελιτζάνα Θερμοκηπίου): Για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκού, της σποντόπτερας, του δουρφύρου και των αιφίδων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. (Y) (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (Y) και 60-140 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση της βρωμούσας. **Δόση:** 18-42 κ.εκ./στρ. (O) (30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Αγγούρακι, Κολοκύθη, Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)): Για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκού, της σποντόπτερας και των αιφίδων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. (Y) και 30-70 κ.εκ./στρ. (O) (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. (Y) και 60-140 λίτρα/στρ. (O). Για την αντιμετώπιση των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. (Y). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

ΛΑΧΑΝΟ (εκτός από το κινέζικο), ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Για την αντιμετώπιση της πειρίδας, της πλούσιας, του πράσινου σκουληκού, της σποντόπτερας, των αιφίδων και των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

ΜΑΡΟΥΛΗ (Υπαίθρου): Για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκού, της σποντόπτερας, του αλτή και των αιφίδων. **Δόση:** 25-50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για την αντιμετώπιση των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΜΑΙΤΑΝΟΣ, ΦΥΛΑ ΣΕΛΙΝΟΥ, ΡΟΚΑ: Για την αντιμετώπιση αιφίδων, της σποντόπτερας, της κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΜΑΙΤΑΝΟΣ ΦΡΕΖΑΚΙ (Αράκα): Για την αντιμετώπιση της αιφίδων των μπιζελών και της σιτάνων. **Δόση:** 25 κ.εκ./στρ. Για την αντιμετώπιση των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΨΥΧΑΝΟΗ (Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια (Οσπρια)): Για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκού, των κοφτοσκούληκων. **Δόση: 30-50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.**

ΠΑΤΑΤΑ: Για την αντιμετώπιση του δούρωφου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. Για την αντιμετώπιση της σποντόπτερας. **Δόση:** 25 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΒΑΜΒΑΚΙ³: Για την αντιμετώπιση της πούριδας, του πράσινου σκουληκού, της σποντόπτερας, των αιφίδων και των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ⁴: Για την αντιμετώπιση της πυράλιδας, της σποντόπτερας, των αιφίδων της σιτάνης, του πράσινου σκουληκού, της σποντόπτερας, των αιφίδων και των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημερών. Για την αντιμετώπιση της διαβρώτικα. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 7-14 ημερών.

ΣΙΤΗΡΑ (Στάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σικαλή): Για την αντιμετώπιση των αιφίδων και των κοφτοσκούληκων. **Δόση:** 30-50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-60 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 1.

ΜΗΔΙΚΗ: Για την αντιμετώπιση της αιφίδων, του σκαθαρίου των μπιζελών, του φυτονόμου. **Δόση:** 25 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με μεσοδιάστημα 14 ημερών.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για την αντιμετώπιση των αιφίδων και των θριπών. **Δόση:** 25-50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Για την αντιμετώπιση φυλλοδέτων. **Δόση:** 17,5-35 κ.εκ./στρ. (35 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. Για την αντιμετώπιση του αλευρώδη. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 70 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερών.

Παραπότηρα:
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 lt ψεκ. νερού πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο Φεκαστικού υγρού (100 lt στρέμμα) έπειτα η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. **Εν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία γίνεται χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. ***Η εφαρμογή της DELTAPRO στα καλαμότικα οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξίνων, ως αποτέλεσμα της επιτυχός αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia sp. και Sesamia sp. Η χρήση στην καλλιέργεια της ροδακινιάς περιλαμβάνει και τις νεκταριές. 4Η χρήση στην καλλιέργεια των μαρούλιού περιλαμβάνει και τις ακόλουθες δυστερέουσες χρήσεις Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια.