

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση ατυχήματος ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Εισπνοή: Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής, απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα και αφήστε το να νημεύσει. Εφαρμόστε τεχνική ανανηο εάν παρουσιαστεί δυσκολία κατά την ανανηο και καλέστε αμέσως γιατρό.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα άμεσα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Μην προκαλείτε εμετό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε την εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μια αφέεστη ζώνη:

- 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της ελιάς
- 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού
- 15 μέτρων για τις καλλιέργειες των μπλοσιδίων (όψιμες εφαρμογές)
- 25 μέτρων για τις καλλιέργειες των μπλοσιδίων (πρώιμες εφαρμογές), της κερασιάς και της δαμασκηνιάς
- 30 μέτρων για τις καλλιέργειες της βερικοκιάς και της ροδακινιάς
- 12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για τις καλλιέργειες των ζαχαροτεύλων, του παντζαριού, των ξερών φασολιών, της φακής, των ρεβιθιών και των λούπινων
- 10-12 μέτρων από τα επιφανειακά νερά σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τις καλλιέργειες της μελιτζάνας, της πιπεριάς, του αγγουριού, του κολοκυθιού, του πεπονιού, του καρπουζιού, της τομάτας, της φρούλας, της πατάτας, της γλυκοπατάτας, του κρεμμυδιού, του σκόρδου, του πράσου, του μαϊντανού, της αγκινάρας, του λάχανου, του κουνουριού, του μπρόκολου, των λαχανακίων Βρυξελλών, του σέλερου και του σπαρραγγιού.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να χρησιμοποιείτε ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50% για τα σμέουρα και τα βατόμουρα.



Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: difenocoazole 25 % B/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,92 % B/ο

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Κάτοχος της άδειας:

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα, Αττική
Τηλ.: 210666612-13

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000

Περιεχόμενο: **1000 κ.εκ.**

Α.Α.Δ.Α.: 61103/19.01.2023



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει τη δραστική ουσία Difenocoazole (τριζόλη) που κινείται διελασματικά και έχει προληπτική δράση. Καταπολεμά διάφορες μυκητολογικές ασθένειες σε μπλοσιδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, λαχανικά, φρούλα, πατάτα, ζαχαροτεύλα, κρεμμύδι κ.ά.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ: Για την αντιμετώπιση του Φουζικλάδιου. **Δόση:** 30 κ.εκ./στρ. (15-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη της άνθησης έως την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 61-84). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ: Για την αντιμετώπιση της Φαϊάς σήψης, του Ιδιού, και του Εξωασκού. **Δόση:** 45 κ.εκ./στρ. (20-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη της άνθησης (BBCH 60) μέχρι 7 ημέρες από τη συγκομιδή. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ: Για την αντιμετώπιση της Φαϊάς σήψης, του Ιδιού, και του Εξωασκού. **Δόση:** 30 κ.εκ./στρ. (20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη συγκομιδή (BBCH 60-87). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100-150 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΕΛΙΑ: Για την αντιμετώπιση του Κυκλοκόνιου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από το στάδιο στο οποίο οι καρποί έχουν αποκτήσει το 50% του μεγέθους τους έως την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 75-85). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 80 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΑΜΠΕΛΙ: Για την αντιμετώπιση του Ιδιού και της Μαύρης σήψης. **Δόση:** 20 κ.εκ./στρ. (12-20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έκπτυξη του δεύτερου φύλλου έως το μαλάκωμα των ραγών (BBCH 12-85). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 4 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΦΡΑΥΛΑ (Υπαίθρου): Για την αντιμετώπιση του Ιδιού. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έκπτυξη των ανθοταξιών έως τη συγκομιδή (BBCH 51-89). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΦΡΑΥΛΑ (Θερμοκηπίου): Για την αντιμετώπιση του Ιδιού. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την εμφάνιση των ανθοταξιών έως τη συγκομιδή (BBCH 51-89). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΣΜΕΟΥΡΑ, ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ: Για την αντιμετώπιση του Ιδιού, της Δρεπανοπέζης, της Μαύρης σήψης και της Σκωρίασης. **Δόση:** 40 κ.εκ./στρ. (30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη της επιμήκυνσης των βλαστών έως την εμφάνιση των ταξιανθιών (BBCH 31-49). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου-Θερμοκηπίου): Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης, του Ιδιού και της Κλαδοσπορίωσης. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη έκπτυξης των πλάγων βλαστών έως τη συγκομιδή (BBCH 20-87). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΛΔ
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΕΝΕΣ ΔΑΨΕΙΣ



ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υγναίθρου-Θερμοκλήπυ): Για την αντιμετώπιση του Ωιδίου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για καλλιέργειες υπαίθρου από την εμφάνιση των πρώτων ανθών έως πριν τη συγκομιδή (BBCH 51-86) και για καλλιέργειες θερμοκλήπυ από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη συγκομιδή (BBCH 21-89). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 8 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης, του Έλκου, της Μυκοσφαίρελλας και του Ωιδίου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη ανάπτυξης της ανθοκεφαλής έως ότου αποκτήσει το 60% του μεγέθους της (BBCH 40-46). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΛΑΧΑΝΟ: Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης, και της Μυκοσφαίρελλας. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη ανάπτυξης της κεφαλής έως ότου αποκτήσει το 60% του μεγέθους της (BBCH 40-46). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης, του Έλκου, της Μυκοσφαίρελλας και του Ωιδίου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη ανάπτυξης της κεφαλής έως ότου αποκτήσει το 60% του μεγέθους της (BBCH 40-46). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (Υγναίθρου): Για την αντιμετώπιση της Σεπτόρια, Αλτερναρίωσης και του Ωιδίου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Στην έναρξη ανάπτυξης του συγκομιζόμενου μέρους του φυτού (BBCH 40). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (Θερμοκλήπυ): Για την αντιμετώπιση της Σεπτόρια, Αλτερναρίωσης και του Ωιδίου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Στην έναρξη ανάπτυξης του συγκομιζόμενου μέρους του φυτού (BBCH 40). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΣΕΛΕΡΥ (Υγναίθρου-Θερμοκλήπυ): Για την αντιμετώπιση της Σεπτόρια. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη έως το τέλος της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου μέρους του φυτού (BBCH 40-49). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 14 ημέρες μεσοδιάστημα για την υπαίθρο.

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ: Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης και της Σκωρίασης. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη έως το τέλος της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου μέρους του φυτού (BBCH 40-49). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 12 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΠΡΑΣΟ: Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης και της Σκωρίασης. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη έως το τέλος της ανάπτυξης του συγκομιζόμενου μέρους του φυτού (BBCH 40-49). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 12 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Για την αντιμετώπιση του Στεμφύλλου και της Σκωρίασης. **Δόση:** 50

κ.εκ./στρ. Από την ολοκλήρωση της επιμήκυνσης του στελέχους έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 41-89). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΠΑΤΑΤΑ, ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ: Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης. **Δόση:** 60 κ.εκ./στρ. Από την έναρξη του σχηματισμού των κονδύλων έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 40-85). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΛΙΑ, ΠΑΝΤΖΑΡΙ: Για την αντιμετώπιση της Κερκοσπορίωσης, της Ραμουλάρια, του Ωιδίου και της Σκωρίασης. **Δόση:** 40-50 κ.εκ./στρ. Από όταν το φύλλωμα καλύπτει το 10% του εδάφους έως όταν το υπόγειο τμήμα φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος για συγκομιδή (BBCH 31-49). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 21 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΣΗΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ, ΦΑΚΕΣ, ΡΕΒΙΘΙΑ, ΛΟΥΠΙΝΑ: Για την αντιμετώπιση της Ασχοκύτωσης και της Μυκοσφαίρελλας. **Δόση:** 40 κ.εκ./στρ. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθών έως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των λοβών (BBCH 51-79). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-50 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 21 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (Υγναίθρου-Θερμοκλήπυ): Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης και του Ωιδίου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη έκπτυξης των πλάγων βλαστών έως τη συγκομιδή (BBCH 20-87). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΣΕΛΛΩΝ: Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης, του Έλκου, της Μυκοσφαίρελλας και του Ωιδίου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη ανάπτυξης της κεφαλής έως ότου αποκτήσει το 70% του μεγέθους της (BBCH 40-47). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 2 με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΚΑΛΛΟΠΙΣΤΙΚΑ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ, ΓΛΑΔΙΟΛΑ, ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ, ΝΤΑΛΙΑ, ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΜΠΙΓΚΟΝΙΑ, ΠΟΤΕΝΤΙΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΥΩΝΥΜΟ, ΑΛΘΑΙΑ (Υγναίθρου-Θερμοκλήπυ): Για την αντιμετώπιση της Αλτερναρίωσης, της Κερκοσπορίωσης, της Ανθράκωσης, του Ωιδίου, της Σκωρίασης, της Ραμουλάρια, της Σεπτόρια και του Στεμφύλλου. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Από την έναρξη έκπτυξης των βλαστών έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 40-89). **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50-100 λίτρα/στρ. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με 14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζετε την χαμηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι χαμηλή και την υψηλότερη δόση όταν η πίεση του μολύσματος είναι μεγάλη (συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας).

2. Στα καλλοπιστικά, συνιστάται μια δοκιμαστική εφαρμογή πριν την καθολική εφαρμογή του σκευάσματος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Το σκεύασμα είναι συμβατό σε προγράμματα IPM.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία difenoconazole που ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC. Το Difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζόλων (DIMs) και στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης. Μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DIMs. Να μην γίνονται πάνω από το 50% των συνολικών εφαρμογών με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν στις τριαζόλες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Φράουλα (Α+Θ), Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Α+Θ), Κολοκύθι (Α+Θ), Πεπόνι (Α+Θ), Καρπούζι (Α+Θ), Πατάτα, Γλυκοπατάτα, Μελιτζάνα (Α+Θ), Πιπεριά (Α+Θ): 3 ημέρες Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Σμέουρα, Βατόμουρα, Τομάτα (Α), Βερικοκιά: 7

ημέρες Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσαμουλιά, Κυδωνιά, Αγκινάρα (Α), Μπρόκολο (Α), Κουνουπίδι (Α), Μαϊντανός(Α+Θ), Σέλερυ (Α+Θ), Κρεμμύδι (Α), Σκόρδο (Α): 14 ημέρες Αμύγλι, Πράσο (Α), Λάχανο (Α), Ζαχαρότευλο, Παντζάρι, Λαχανάκια Βρυξελλών: 21

ημέρες Όσπρια (Ενρά φασόλια, Φακές, Ρεβίθι, Λούπινα): 28 ημέρες.

Ελιά: 30 ημέρες

Σπαράγγι, Καλλωπιστικά: -.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος και ανακινήστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν / ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Στεγνύετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού κατασφραγούν προηγουμένως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

Αρ. Παρτίδας:	Επί της συσκευασίας
Ημερομηνία παρασκευής:	