

**Κατηγορία και τρόπος δράσης.**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων. Το chlorpyrifos ανήκει στην ομάδα των οργανοφωσφορικών και δρα αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλ-χολινεστεράσης (acetylcholinesterase).

**Φάσμα δράσης:**

**ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά): Για την αντιμετώπιση εντόμων φυλλώματος, καρπών και ξύλου (μασητικά, μυζητικά). **Δόση:** 320 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 200 - 400 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Εφαρμογές με την εμφάνιση των εντόμων. Για τα κοκκοειδή οι ψεκασμοί διενεργούνται από Ιούνιο-Σεπτέμβριο, πριν τα νέα άτομα εγκατασταθούν στον καρπό. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/60.

**ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Για την αντιμετώπιση εντόμων φυλλώματος και ξύλου (μασητικά, μυζητικά). **Δόση:** 160 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 100 - 200 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάσουμε κατά το φούσκωμα των ματιών. **Εφαρμογές πριν την άνθηση.** **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/10 - 15.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): Για την αντιμετώπιση εντόμων φυλλώματος και ξύλου (μασητικά, μυζητικά). **Δόση:** 200 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 150 - 250 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάσουμε κατά το φούσκωμα των ματιών. **Εφαρμογές πριν την άνθηση.** **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/15.

**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Δαμασκηνιά): Για την αντιμετώπιση εντόμων φυλλώματος, ανθέων, καρπού και ξύλου (μασητικά, μυζητικά). **Δόση:** 200 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 150 - 250 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Με την εμφάνιση των εντόμων και επανάληψη ανά 15 ημέρες. Για τις ψώρες ψεκάσουμε κατά το φούσκωμα των ματιών, στα μέσα Μαΐου και μετά από 10 ημέρες. Για καρπόκασια και ανάρσια ψεκασμοί με δόση 96 γρ./100 λίτρα νερό. **Εφαρμογές πριν την άνθηση.** **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/15.

**ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ** (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα): Για την αντιμετώπιση εντόμων φυλλώματος (μασητικά, μυζητικά). **Δόση:** 160 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 50 - 100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη μετά από 15 ημέρες. **Εφαρμογές πριν την άνθηση.** **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/15.

**Βαμβάκι:** Για την αντιμετώπιση εντόμων φυλλώματος (μασητικά, μυζητικά). **Δόση:** 128 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 50 - 80 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/15.

**Πατάτα:** Για την αντιμετώπιση εντόμων φυλλώματος (μασητικά, μυζητικά). **Δόση:** 160 γρ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ.υγρού:** 50 - 100 λίτρα/στρέμμα. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασμός με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων. Επόμενος ψεκασμός με την επανεμφάνιση των εντόμων ή μετά από 15 ημέρες. Εφαρμογές μέχρι το σχηματισμό των κονδύλων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/15.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

1. Στα εσπεριδοειδή: Να μη χρησιμοποιείται την περίοδο της άνθησης.
2. Βαμβάκι: Το ψεκάσμενο φυτικό υλικό να μη χρησιμοποιηθεί για ζωτροφή.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το δ.σ. θα είναι αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στο πλαίσιο προγραμμάτων με άλλα εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Ως γενική αρχή η αποκλειστική ή συνεχόμενη χρήση του ίδιου δ.σ. ή δ.σ. με όμοιο τρόπο δράσης σε συνεχόμενες γενεές εντόμων πρέπει να αποφεύγεται. Το Chlorpyrifos μπορεί να χρησιμοποιείται εφόσον εναλλάσσεται με άλλα εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Περιορίστε τον αριθμό των εφαρμογών του chlorpyrifos στις 1-2 ανά καλλιεργητική περίοδο.

Μη μειώνετε τις δόσεις όπως προτείνονται στην επίστα του προϊόντος όταν εφαρμόζεται μόνο του ή σε μίγματα βιτίου. Ακολουθήστε όσο είναι δυνατό εναλλακτικές μεθόδους (π.χ. καλλιεργητικές ή βιολογικές) στο πλαίσιο προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (IPM).

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. Μην χορηγείτε υγρά στον ασθενή. Μη χορηγείτε τίποτα από στόματος σε άτομα που δεν διατηρούν τις αισθήσεις τους.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο σφραλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα. Εάν ο πάσχων δεν αναπνέει καλέστε ασθενοφόρο, και έπειτα εκτελέστε τεχνητή αναπνοή. Στην περίπτωση αυτή πάρτε μέτρα προστασίας (μάσκα). Καλέστε το κεντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό. Εάν ο πάσχων δυσκολεύεται να αναπνεύσει τότε πρέπει να του χορηγηθεί οξυγόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Το προτεινόμενο αντίδοτο είναι η ατροπίνη, μόνο σε ενέσιμη μορφή. Οι οξίμες (Oximes) π.χ. 2-PAM/protopam, μπορεί να είναι θεραπευτικές εάν χρησιμοποιηθούν νωρίς αλλά πάντα σε συνδυασμό με ατροπίνη. Σε περίπτωση μόλυνσης οι εξετάσεις χολινεστεράσης πλάσματος και ερυθρών αιμοσφαιρίων θα δείξουν το επίπεδο της μόλυνσης. Σε περίπτωση οξείας δηλητηρίασης χρησιμοποιήστε αμέσως το αντίδοτο μετά τη διασφάλιση της αναπνοής. Το προϊόν περιέχει ένα διαλύτη και έναν αναστολέα της χολινεστεράσης. Θεραπεία συμπτωματική. Εάν πραγματοποιηθεί πλήρη στομάχου συνιστάται έλεγχος ενδοτραχείου και/ή οισοφαγίου. Ο κίνδυνος αναρρόφησης από τους πνεύμονες πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με την τοξικότητα, στο ενδεχόμενο κένωσης του στομάχου. Ο γιατρός μόνο μπορεί να αποφασίσει επ' αυτού. Διατηρήστε επαρκή οξυγόνο. Η θεραπεία στοχεύει στον έλεγχο των συμπτωμάτων και την κλινική κατάσταση του ασθενούς.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Μην ψεκάσετε τα ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.

**Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα:** Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Καλλιεργειών.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς γιατί μπορεί να εμφανιστεί φυτοτοξικότητα. Επίσης είναι φυτοτοξικό στην ποικιλία αχλαδιών κρυστάλλια.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

**Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά:** 21 ημέρες.  
**Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πατάτα:** Δεν ορίζεται βάση του χρόνου εφαρμογής.

**Βαμβάκι:** 90 ημέρες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμογές με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:-**

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ, αναδέστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε τη διαδικασία. Φίλτρα και μπεκάκια αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης ενισπίνονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Αποθηκεύστε το σε μέρος ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία. Προστατείτε το από την υπερβολική ζέση και το ψύχος. Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, φάρμακα, καλλυντικά ή λιπάσματα. Φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Στις παραπάνω συνθήκες αποθήκευσης το προϊόν διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.



# Dursban™ 750 WG

## ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Chlorpyrifos Εγγυημένη σύνθεση: chlorpyrifos 75 % β/β  
βοηθ. ουσίες: 22.68 % β/β  
(χλωρπυριφός)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

# Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.



ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αριθμός παρτίδας: Βλέπε στην επιφάνεια  
Ημερομηνία Παρασκευής: της συσκευασίας

**Κάτοχος έγκρισης:**  
**Dow AgroSciences Export SAS,**  
371, rue Ludwig Van Beethoven-06560  
Valbonne, Γαλλία

Αρ.Εγκ.Κυκλ.: 1888/7.3.2001

Περιεχόμενο: **500 γραμ.**

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**  
**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Λ. Μεσογείων 335,  
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2106726381

