

EMINENT 125EW[®] (Tetraconazole) Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση:

Tetraconazole 12,5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 87,8% β/β

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60931/06.02.2020

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο ευρέως φάσματος
με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση**

Κάτοχος της άδειας:

GOWAN Crop Protection Limited

Rothamsted Research, West Common,

Hapenden, Hertfordshire, AL5 2JQ, UK

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι,

Τηλ.: 2130065070



Περιεχόμενο: 400 κ.εκ.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Φυλάσσεται
κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. *Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν. Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/
φόρτωση. Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα
εργασίας κατά την εφαρμογή. Φοράτε γάντια
κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια και κατά
τη συγκομιδή. Διάθεση του περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη
συσκευασία του.* (Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά
σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
**ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



EMINENT 125EW[®]



Gowan[®]
CROP PROTECTION LIMITED

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΛΑΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ



Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο ευρέως φάσματος με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Περιέχει την δραστική ουσία tetraconazole της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) που παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινάστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ψεκάστε εντός δυο ωρών από την παρασκευή του διαλύματος.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία, βαρέλια) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: **Μηλιά:** *Oïdïo (Podosphaera leucotricha):* Δόσεις: 24 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 24 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί μόλις οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για πρωτογενείς μολύνσεις, από τη ρόδινη κορυφή έως την έναρξη της άνθησης ή/και όταν οι καρποί έχουν μέγεθος καρυδιού. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2-3/12-14. **Μηλιά, Αχλαδιά:** *Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, Venturia pirina):* Δόσεις: 24 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 24 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί μόλις οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για πρωτογενείς μολύνσεις, από τη ρόδινη κορυφή έως την έναρξη της άνθησης ή/και όταν οι καρποί έχουν μέγεθος καρυδιού. Θεραπευτικοί ψεκασμοί εντός 72-96 ωρών, από μολυσματική βροχή. Για παρεμπόδιση εξάπλωσης της ασθένειας με τα πρώτα συμπτώματα προσβολής. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα αρχικά και 10 ημέρες αργότερα για προληπτικούς ψεκασμούς και 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5-7 ημέρες. **Ροδακινιά, Βερικοκιά:** *Oïdïo (Sphaerotheca pannosa):* Δόσεις: 30 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 30 κ.εκ. σκ./σπρέι.

Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων και μέχρι να αποκτήσουν οι καρποί το μισό μέγεθος, ανάλογα με τον κίνδυνο προσβολής και την ευαισθησία της ποικιλίας.

Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 3 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα σε υψηλό κίνδυνο και 14-21 ημέρες σε χαμηλό κίνδυνο. **Αμπέλι (επιτραπέζιες & οινολογικές ποικιλίες σταφυλιών):** *Oïdïo (Uncinula necator). Μαύρη σήψη (Guignardia bidwellii):* Δόσεις: 20-25 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 24 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 80-100 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί πριν και μετά την άνθηση μέχρι την αλλαγή χρώματος των ραγών.

Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2-3/12-14. **Φράουλα (Θ):** *Oïdïo (Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae):* Δόσεις: 40 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 40 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, από την άνθηση και μέχρι να αποκτήσουν οι καρποί το τελικό χρώμα.

Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 3/7. **Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ):** *Oïdïo (Leveillula taurica, Erysiphe cichoraceum):* Δόσεις: 20-36 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 20-36 κ.εκ. σκ./σπρέι. *Κλαδοσπορίων (Cladosporium fulvum):* Δόσεις: 40-60 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 40-60 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./σπρέι. Προληπτικοί και θεραπευτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, από την έναρξη της άνθησης και μέχρι την ωρίμανση.

Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8-12 ημέρες προληπτικά 8-10 ημέρες θεραπευτικά. **Αγγούρι (Υ,Θ), Αγγουράκι (Υ,Θ), Κολοκύθι (Υ,Θ), Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ):** *Oïdïo (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoraceum):* Δόσεις: 50 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 40 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 80 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας, από την άνθηση και μέχρι να αποκτήσουν οι καρποί το τελικό χρώμα.

Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2-3/10-15. **Αγκινάρα (Υ):** *Oïdïo (Leveillula taurica, Erysiphe cichoraceum):* Δόσεις: 20-30 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 20-30 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας και μέχρι την έναρξη ωρίμανσης, αν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 2-3/10-15. **Σιτάρι μαλακό, Σιτάρι σκληρό:** *Σκωρίαση κίτρινη, καφέ, μούρη (Puccinia sp.). Σειπορίωση (Septoria sp.):* Δόσεις: 90-100 κ.εκ. σκ./σπρέι. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20-60 λτ./σπρέι. Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες ευνοούν την προσβολή, από το στάδιο επιμήκυνσης του στέλεχους (1-2 κόμβων) έως την ολοκλήρωση της ανθοφορίας.

Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 1. **Ζαχαρότευτλα:** Κερκοσπορίωση (*Cercospora beticola*) Πίδιο (*Erysiphe betae*): **Δόσεις:** 80 κ.εκ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-60 λτ./στρέμμα. Προληπτικός ψεκασμός με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας κατά την πλήρη κάλυψη του αγρού από την καλλιέργεια. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 1. **ΚΑΛΛΗΠΙΣΤΙΚΑ:** Τριανταφυλλιά: Πίδιο (*Sphaerotheca pannosa*) Σκωριάσεις (*Puccinia* sp., *Cronantium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Uromyces* sp.): **Δόσεις:** 20-40 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 20-40 κ.εκ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./στρέμμα. Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/7. Χρυσάνθεμο, Γαρυφαλλιά: Σκωριάσεις (*Puccinia* sp., *Cronantium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Uromyces* sp.): **Δόσεις:** 60-75 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 60-75 κ.εκ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./στρέμμα. Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/7. **Γεράνι, Γλαδίολος: Σκωριάσεις (*Puccinia* sp., *Cronantium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Uromyces* sp.): **Δόσεις:** 75 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού με 75 κ.εκ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λτ./στρέμμα. Προληπτικοί ψεκασμοί με τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας. **Μέγ. αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 3/7. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της αναμενόμενης πίεσης προσβολής και των περιβαλλοντικών συνθηκών. 2) Ρυθμίστε τη δόση ανά εκατόλιτρο ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκέυασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκέυασμα περιέχει tetraconazole, ένα μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα G κατά FRAC. Τα μην χρησιμοποιούνται τα φύλλα και οι κορυφές των ζαχαρότευτλων για ζωοτροφή. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με μυκητοκτόνα που έχουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης από αυτόν του tetraconazole και δεν εμφανίζουν ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκέυασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Φυτοτοξικότητα: Το σκέυασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στα καλλωπιστικά φυτά υπάρχουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας, συνιστάται πριν από τη χρήση να διεξαχθούν δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρό αριθμό φυτών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Σταφύλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): **30**. Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Βερίκοκα, Ζαχαρότευτλα: **14**. Καρπούζι (Υ), Πεπόνι (Υ), Αγκινάρα (Υ): **7**. Αγγούρι (Υ, Θ), Αγγουράκι (Υ, Θ), Κολοκύθι (Υ,Θ) Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ): **3**. Φράουλα (Θ): **1**. Σπάρτι (σκληρό & μαλακό): **42**. Καλλωπιστικά: -.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλειστή συσκευασία του σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγή θερμότητας, σπίθα ή φλόγα. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση έκθεσης από ατύχημα ή αδιαθεσίας: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε καλά τα μάτια με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε το θύμα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. **Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.**
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρ. Παρτίδας:	Επί της συσκευασίας
Ημερομηνία παρασκευής:	