



ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Όταν έχει στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό διάλυμα.

#### ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση. Δρα δι επαφής στα βλαστάριοντα σπάρια των μυκήτων και έχει ενδοθεραπευτική δράση στο μυκήλιο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των μυκήτων. Η προληπτική δράση του σκευάσματος οφείλεται στο famoxadone, ενώ η θεραπευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηματική δράση, στο cymoxanil.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Το Equation® Pro διαλύεται εύκολα σε νερό. Γεμίστε το δοχείο έως τα 2/3 της χωρητικότητάς του με νερό. Προσθέστε το Equation® Pro με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Ολοκληρώσατε την πλήρωση του δοχείου με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό υγρό το συντομότερο δυνατόν.

#### ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

**Αμπέλ:** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 40 γρ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 150 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο μέχρι την έναρξη αλλαγής χρώματος. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Τομάτα (υπαίθρου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερνάριας. **Δόση:** 40 γρ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερες.

**Τομάτα (θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερνάριας. **Δόση:** 40 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Μέγιστη δόση** 40 γρ./στρ. ανεξαρτήτως όγκου ψεκαστικού διαλύματος. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 150 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 4 με ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

**Πεπόνι (υπαίθρου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 50 γρ./στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερες.

**Πεπόνι (θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 50 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερες.

**Αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι (θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 50 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερες.

**Μελτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου):** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου. **Δόση:** 40 γρ./ στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 20 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από το 5ο φύλλο ως τη συγκομιδή. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 3 με μεσοδιάστημα 7 ημερες.

**Πατάτα:** Για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερνάριας. **Δόση:** 40 γρ./ στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 50 - 100 λίτρα/στρ. **Χρόνος εφαρμογής:** Από την έκπτυξη του 1ου πλευρικού βλαστού ως το καφέ-τσιασμα του 50% των φύλλων. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο:** 4 με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Πεπόνι, Θερμοκηπίου και κολοκυνθοειδή Θερμοκηπίου με βρώσιμο φλοιό (αγγούρι, αγγουράκι και κολοκυθάκι): Μη χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 40 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα.
- Τομάτα Θερμοκηπίου: Μη χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 30 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα.
- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του κινδύνου προσβολής. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΤΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΥΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ**

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το Equation Pro περιέχει famoxadone, δραστική ουσία που αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή και που ανήκει στην οικογένεια των μυκητοκτόνων αναστολέων της κινολής (Qo-I). Σε αυτή την οικογένεια ανήκουν και άλλα προϊόντα για την καταπολέμηση του περονόσπορου των εξής χημικών ομάδων: στομπιλουρίνες, οξαζολιδινιδίνες, ιμιδαζολινόνες κ.α.

Προκειμένου να αποτραπούν συμπτώματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται ανάλογα με την καλλιέργεια και τον εχθρό, να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 3 εφαρμογές με Equation® Pro ανά καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας τις εφαρμογές με άλλα αποτελεσματικά μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερνάριας.

#### Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων

- Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται με νημερία, όταν δε φυσάει άνεμος.
- Να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά σταγονιδίων ψεκασμού προς γειτονικές καλλιέργειες.
- Αποφύγετε τη διασπορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε υδάντιες επιφάνειες (λίμνες, ποτάμια, αυλάκια).

**Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει 1 ώρα μετά τον ψεκασμό.**

#### ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

**Αμπέλ:** 28 ημέρες

**Πατάτα:** 14 ημέρες

**Λοιπές καλλιέργειες:** 3 ημέρες

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μη-

χάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάντινες επιφάνειες.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις αντιστοιχμένες δόσεις, καλλιέργειες και τρόπους εφαρμογής, κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός καλύψεως με τα συνθή ψεκαστικά μέσα.

#### Προστασία χειριστή:

Για κανονικό ψεκασμό με χρήση τρακτέρ σε υπαίθριες καλλιέργειες να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας και μάσκα τύπου FFP2SL ή P2 κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN-14605:2005 + A1:2009) και κατάλληλα υποδήματα.

Για χειροκίνητο ψεκασμό σε υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, πατάτας και πεπονιού να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN-14605:2005 + A1:2009) και κατάλληλα υποδήματα.

Για χειροκίνητο ψεκασμό σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (καλλιέργειες > 1 m) να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας και μάσκα τύπου FFP3 κατά την ανάμειξη / πλήρωση, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (που αντιστοιχεί σε εξοπλισμό τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN-14605:2005 + A1:2009) και μάσκα τύπου FFP3.

Για χειροκίνητο ψεκασμό σε καλλιέργειες θερμοκηπίου (καλλιέργειες < 1 m) να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας, ενώ κατά την εφαρμογή να χρησιμοποιείτε γάντια και ενδυμασία χημικής προστασίας (τύπου 6, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN 13034:2005 + A1:2009).

Για ψεκασμό με χρήση εκτοξευτήρα σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, συνιστάται η χρήση γαντιών χημικής προστασίας τόσο κατά την ανάμειξη / πλήρωση όσο και κατά την εφαρμογή, ως ελάχιστο μέτρο ατομικής προστασίας. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής με χρήση τρακτέρ που διαθέτει κουβούκλιο και συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα, μπορείτε να παραλείψετε τον προστατευτικό εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα παράθυρα θα είναι κλειστά.

#### Προστασία εργαζομένων:

Να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας για εργασίες που διαρκούν πάνω από 2 ώρες σε καλλιέργειες τομάτας, πεπονιού και κολοκυνθοειδών με βρώσιμο φλοιό.

Μην ψεκάζετε το προϊόν, εάν έχετε προγραμματίσει μηχανικές εργασίες, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα γάντια χημικής προστασίας.


Να αποφεύγετε την επαφή με υγρό φύλλωμα.

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποθηκεύεται σε χώρο που επιτρέπει η είσοδος μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οι σακούλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίασμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



Equation®  
PRO WG

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

#### Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

|                   |        |     |
|-------------------|--------|-----|
| famoxadone        | 22.5%  | β/β |
| cymoxanil         | 30%    | β/β |
| Βοηθητικές ουσίες | 45.63% | β/β |

**Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**  
Α.Α.Δ.Α.: 60522/05.04.2016

Κάτοχος της άδειας: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Υδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280,15232, Χαλάνδρι - Τηλ.: 210 688 9700  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΑΣ  
Α.Ε.Β.Ε. Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι - Τηλ.: 213 0065070

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:



®™ Σήματα κατατεθέντα των Dow AgroSciences, DuPont ή Pioneer και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών ή αντίστοιχων ιδιοκτητών

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ, ΣΤΟ ΘΥΜΟ ΑΔΕΝΑ ΚΑΙ  
ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΨΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Ή  
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ.  
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ  
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.  
ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Ή  
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ.

02-02-66 K-47152/2009 - GREECE

**Καθαρό βάρος: 400 g e**

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρωτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σταγονίδια. Πλύνετε το δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμίνη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περιεκτικ σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικινδύνα απόβλητα.

#### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Πρώτες βοήθειες:  
Απομακρύνετε το άτομο από τη μολυσμένη ζώνη. Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ή πιταλαμμένα ρούχα.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τους φακούς επαφής.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι, χωρίς τρίψιμο.  
Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε έμετο και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα.  
Διατηρήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Παρακολουθείτε την αναπνοή. Αν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.  
Εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα μολογισμένα. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία, αν είναι δυνατόν.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ.

#### Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει:

- Δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα, κεφαλαλγία, μυϊκή αδυναμία, αλλαγές στη συμπεριφορά, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, δυσκολία στην αναπνοή και καρδιακές διαταραχές.
- Συμβουλές προς τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό:
  - Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται καθαρισμός του πεπτικού συστήματος, ανάλογο με το στάδιο συνείδησης.
  - Ελέγξτε τους ηλεκτρολύτες και την αρτηριακή πίεση.
  - Συμπτωματική θεραπεία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Τηλέφωνο: 210 77 93 777. Σε κάθε περίπτωση πάρτε μαζί σας τη συσκευασία ή την ετικέτα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε της οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους). Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. Να αερίσατε τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκε μέχρι να στεγνώσει το προϊόν, πριν ξαναμπειτε.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μία αφεκαστή ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την πατάτα και 10 μέτρα ζώνη φωτικής ανάσχεσης για την τομάτα, και τα κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό.