

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Αποφύγετε να αναπνεύετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μη τρώτε, πινείτε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Διάθρονον περιχομένου/ περιεκτική σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία. Απευθυνθείτε στον παρασκευαστή ή προμηθευτή για την ανάκτηση ή την ανακύκλωση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. «Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισοδίου, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας».

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** (210) 7793777.

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας.

- **25 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδροώδεις καλλιέργειες και το ακτινίδιο, στις πρώιμες εφαρμογές.
- **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδροώδεις καλλιέργειες και το ακτινίδιο, στις όψιμες εφαρμογές.
- **5 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη, όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε δόση μεγαλύτερη των 300 κ.εκ./ στρέμμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Limocide



Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)
Orange oil (Οραντζέλαιο)

Εγγυημένη σύνθεση: Orange oil 6% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 94 % (β/β)

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής
με βάση εκχύλισμα του *Aurantii dulcis*

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.D.A. : 13025/26.03.2020

Κάτοχος της άδειας:

VIVAGRO
TECHNOPOLE MONTESPESOU
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
33650 MARTILLAC Γαλλία
Τηλ.: 33 (0)5 57 78 32 68
WWW.VIVAGRO.FR

Υπεύθυνος για την τελική διέθεση

στη αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231,
Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000



Περιεχόμενο: 1L



“Το LIMOCIDE είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν”

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το **Limocide** είναι εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής. Η δ.ο «orange oil» είναι εκχύλισμα του *Aurantii dulcis* με κύριο συστατικό το d-limonene (μονοτερπένιο). Επιδρά στη διαπερατότητα του εξωσκελετού των εντόμων και των ακάρεων και των εξωτερικών μεμβρανών των μυκήτων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΑΧΛΑΔΙΑ: Στόχος: Ψύλλα. Δόση: 250 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-70 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έκπτυξη των πρώτων φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:** Στόχος: Ωίδιο. Δόση: 600 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από το φύσκωμα των οφθαλμών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιφφρουτ):** Στόχος: Κόκκινη ψύρα των εσπεριδοειδών, Μετκάλφα, Κηροπλάστη, Τζιτζικάκι (Empoasca vitis), Θρίπες. Δόση: 800 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. Στόχος: Ακάρεα. Δόση: 200 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10-20 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 2/7. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ):** Στόχος: Θρίπες. Δόση: 400 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10-50 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έκπτυξη του 2ου φύλλου του κύριου βλαστού έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):** 6/7. **ΤΟΜΑΤΑ (Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ):** Στόχος: Αλευρώδεις. Δόση: 200 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10-50 λίτρα/στρ.

LAB-LIMO-BOT-GR-2

ΜΠΑΝΑΝΑ: Στόχος: Αλευρώδεις Ισάερα. Δόση: 200 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 10-25 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης έως την πλήρη ωρίμανση. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7. Στόχος: Θρίπες. Δόση: 200 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-25 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της ανάπτυξης των καρπών έως την πλήρη ωρίμανση. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ: Στόχος: Αλευρώδεις. Δόση: 800 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης έως την πλήρη ωρίμανση. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ (Θ): Στόχος: Λευκή σκωρίαση. Δόση: 100 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 3/7.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Θ): Στόχος: Ωίδιο. Δόση: 600 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7. Στόχος: Αλευρώδεις. Δόση: 400 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υ): Στόχος: Θρίπες. Δόση: 800 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ): Στόχος: Αλευρώδεις. Δόση: 400 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της βλάστησης έως την πλήρη ωρίμανση. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7. Στόχος: Τζιτζικάκι. Δόση: 800 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη έως το τέλος της βλάστησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ): Στόχος: Θρίπες. Δόση: 640 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη έως το τέλος της βλάστησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Θ): Στόχος: Αλευρώδεις. Δόση: 400 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη της βλάστησης έως την ολοκλήρωση της άνθησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7. Στόχος: Τζιτζικάκι. Δόση: 800 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη έως το τέλος της βλάστησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ): Στόχος: Θρίπες. Δόση: 640 κ.εκ/στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Από την έναρξη έως το τέλος της βλάστησης. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): 6/7.

Παρατηρήσεις:

- Κατά την εφαρμογή το σκεύασμα προτείνεται να συνδυάζεται με αντιαφριστικό.
- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλιπλιστικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
- Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα του εχθρού/παθούσμου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Όταν χρησιμοποιούνται βομβίνιοι για την επικονίαση οι κυψέλες θα πρέπει να παραμείνουν κλειστές μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: 1 ημέρα. **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός της φυλλικής επιφάνειας. **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανόμενων των ψεκαστήρων με βέργα χειροκίνητων ή μηχανοκίνητων) πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κούνο απορροπτικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και απορροπτικό. Το νερό του ξεπλύματος να μη ρίχνεται σε ευαίσθητα τμήματα της καλλιέργειας ή σε εδάφος που προορίζεται για κάποια ευαίσθητη καλλιέργεια. Ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό.



Limocide



Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)
Orange oil (Οραντζ έλ)

Εγγυημένη σύνθεση: Orange oil 6% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 94 % (β/β)

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και μυκητοκτόνο επαφής
με βάση εκχύλισμα του *Aurantii dulcis*

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Α.Α.Δ.Α.: 13025/26.03.2020



Περιεχόμενο: 1L

BIO

Κάτοχος της άδειας:

VIVAGRO
TECHNOPOLE MONTESQUIEU
5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
33650 MARTILLAC Γαλλία
Τηλ.: 33 (0)5 57 78 32 68
WWW.VIVAGRO.FR

“Το LIMOCIDE είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν”

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση

στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231,
Χαλάνδρι, Αττική
Τηλ.: 2130065000



ΠΡΟΣΟΧΗ

