

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην αναπνέετε ατμούς και εκνεφεύματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό, καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Η διάθεση του περιεχομένου / περίεκτη για γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να φοράτε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλέτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκαλέτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα προκαλέσει ή όχι εμετό θα ληφθεί από το γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε γιατρό.
Αντιδοτό: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αεραστή ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μια αεραστή ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο φεκαστικό τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρις ότου γεμίσει πλήρως το δοχείο του φεκαστικού. Συνεχίστε τις ανάδευση κατά τη διάρκεια του φεκασμού. Χρησιμοποιείστε αμέσως το φεκαστικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ Φ.Π. ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τόσο οι συσκευασίες όσο και νερά του ξηλωμάτος πρέπει να αναποτίθενται με ασφάλεια σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες. Στα κενά δοχεία συσκευασίας γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο φεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας ή σε εγκατεμένους αποτεφρωτές. Απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Μη ρυπαίνετε έλκους, ρυάκια, κανάλια και υδατοσυλλογές με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Αποτέφρωση (στούς 1200°C για 2" τουλάχιστον) μόνο σε εγκατεμένους αποτεφρωτές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Άλλα φυτά (κοιτινές και γειτονικές καλλιέργειες): "Προσοχή είναι επιβεβαίωση για τις γειτονικές καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε κοντά σε καλλιέργειες ευαίσθητες στα ζιζανιοκτόνα τύπου rhenoxyl δηλαδή αμπέλια, σπυροφόρα, ηλιάνθο, ελαιοκαρύβη, ψυχανθή, λαχανικά και καλλωπιστικά, καπνό, τεύτλα και πατάτες. Ψεκάζετε μόνο όταν ο καιρός είναι ήρεμος χωρίς ανέμους, και με θερμοκρασίες χαμηλότερες από 20°C υπό σκιάς. Μην εφαρμόζετε σε αμπέλια και σπυροφόρα. Αποφύγετε την εφαρμογή στη βάση των φύλλων των δέντρων." Μην χρησιμοποιείτε το χορτάρι των περιοχών που ψεκάστηκαν με GARLON DUO για τη δημιουργία λιπώματος (compost) ή για ζωοτροφή. "Μην χρησιμοποιείτε το χορτάρι που ψεκάστηκε με GARLON DUO για να ταΐσετε τα ζώα ή για να φτιάξετε λιπάσμα (compost)." Μην χρησιμοποιείτε κοπριά από ζώα που ταΐστηκαν με τροφές ψεκασμένες με GARLON DUO σε ευαίσθητες καλλιέργειες π.χ. μπέλιτζα, φασόλια και άλλα ψυχανθή, ζαχαρότευτλα, καρότα και σκιαδανθή (Umbelliferae) πατάτες και τομάτες, μαρούλια και άλλα στουρανθή (Compositae) ή σε χωράφια που προορίζονται για τέτοιες καλλιέργειες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Ψεκασμός φυλλώματος / Εφαρμογή επικεντρωμένη σε σημεία. Εφαρμογή φυλλώματος: Μην εφαρμόζετε.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από παγετό και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C και κάτω από 40°C σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μέσα στην αρχική και αεροδιασπαστή συσκευασία του. Όταν το προϊόν αποθηκεύεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

Αριθ.Παρίδας /
Ημ/νία Παρασκευής:
Βλέπε φιάλη



1121



Garlon™
DUO 270EW

ZIZANIOKTONO

Γαλακτωματοποιήσιμο, λάδι σε νερό (EW)

Εγγυημένη σύνθεση: **Aminopyralid** (ισοδύναμο οξύ): 30 γρ/λίτ
(σε μορφή aminopyralid potassium 35,5 γρ./λίτ)
Triclopyr (ισοδύναμο οξύ): 240 γρ/λίτ
(σε μορφή triclopyr BEE 333,8 γρ/λίτ)
Βοηθητικές ουσίες: 66,49 % β/β



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Α. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106889700
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070

™ Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

A.A.D.A.: 70088/07.07.2014



Περιεχόμενο:
1 λίτρο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το GARLON DUO είναι ένα ζιζανιοκτόνο που δρά από φυλλώματος για μακροχρόνιο έλεγχο ετησίων και πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων (herbaceous και ξυλωδών/ημι-ξυλωδών) σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις (επιφανειακές καλλιέργειες με βλάστηση οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες και υπόκεινται σε ελάχιστη, μη εντατική διαχείριση όπως για παράδειγμα αεροδρόμια, αναχωμάτα σιδηροδρόμων, άκρα δρόμων, βιομηχανικές περιοχές, περιοχές παραγωγής ενέργειας, διαχειρίσιμη αντιπυρικών ζωνών, χώροι αναψυχής κ.ά.) και τα δύο δραστικά συστατικά triclopyr & aminopyralid ανήκουν στην ομάδα ζιζανιοκτόνων του γρίπιδου carboxylic acid. Απορροφώνται γρήγορα από τα φυτά και μεταφέρονται, για να συσσωρευτούν στο μεριστωματικό ιστό. Στα ευαίσθητα είδη και τα δύο δραστικά συστατικά προκαλούν συμπτώματα αυτών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η επιμήκυνση του στελέχους, η πρόωρη γήρανση και τελικά η διακοπή της ανάπτυξης και γρήγορη νέκρωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόστε το σε αναπτυσσόμενα ζιζάνια (για τη θαμνώδη βλάστηση και τα ξυλώδη είδη από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Αυγούστου). Εφαρμόστε με μπтек μεσαίας διαμέτρου μέχρι αρχικής απορροής. Συνιστώνται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερες από 2 ατμόσφαιρες).

Εξοπλισμός εφαρμογής: Α) «Μάνικα ψεκασμού» με ένα ακροφύσιο προσαρμοσμένο σε μηχανοκίνητο όχημα. Β) Ψεκαστήρας πλάτης με «μάνικα ψεκασμού» και ένα ακροφύσιο. Εφαρμόστε το προϊόν με εφαρμογή σε στοχευόμενο σημείο (spot application) κατευθυνόμενη στους θάμνους-στόχους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μη καλλιεργούμενες εκτάσεις. Μέγ. αρ. εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.

Α) Καθολική εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών, πωδών πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 150-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα.

Β) Στοχευμένη εφαρμογή σε ενεργά αναπτυσσόμενους θάμνους και ξυλώδη είδη από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, για την καταπολέμηση θαμνωδούς βλάστησης, ξυλωδών και ημι-ξυλωδών ειδών. Δόση: 0,8-1 λίτρο/100 λίτ. ψεκ. υγρού.

ZIZANIA ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ: Α. Ετήσια και πολυετή πωδή πλατύφυλλα ζιζάνια: *Ευαίσθητα: Αμβρόσια, Περιττοκόδα μεγάλη, Κενταύριο, Κισσό, Περιττοκόδα, Κόνυζα, *Erigon annuus, Βελονάκι, Κολλισίδα μεγάλη, Τεράνι, Χοιροβάτονα, Πεντάνευρο, Λάπαδο μεγάλο, Άγριο τριφύλλι, Πολυετής τσουκνίδα. *Μετρίως ευαίσθητα: Αχίλλεια, Αγριοράδιδο. Β. Θαμνώδη βλάστηση και ξυλώδη είδη: *Ευαίσθητα: Ακακία μισρά, Αγράμπελη, Κράταγος, Κρανιά, Κύπρος, Φλαμουριά, Τσαπουρνιά, Αγριοκερασιά, Ακακία, Βάτος, Ούλες. *Μετρίως ευαίσθητα: Ρείκι, Ευκάλυπτος, Ποτενίλλα, Πουρνάρι. Γ. Τα στενόφυλλα φυτά είναι ανθεκτικά στο Garlon Duo.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Αποφύγετε την εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή μέσα στην επόμενη 1 ώρα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Αν μετά την εφαρμογή Garlon Duo το έδαφος πρόκειται να καλλιεργηθεί, συνιστάται να σταματήσει καλλιέργεια στενόφυλλων (π.χ. δημητριακά), μετά από 2 μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος, και αφού προηγηθεί βαθιά άρση. Αν πρέπει να σταματήσει άλλη καλλιέργεια, αφού προηγηθεί βαθιά άρση, πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω διαστήματα ασφαλείας: *6 μήνες για τεύτλα και αραβόσιτο, *12 μήνες για ηλιάνθο, μηδική και τριφύλλι, *18 μήνες για ψυχανθή (φασόλια, μπέλιτζα) και πατάτα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Συνιστάται η αποφυγή επανεξόδου ή χειρισμού γενικότερα, μέχρις ότου στεγνώσει πλήρως το φεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση εισόδου του εργάτη στον αγρό μετά τον ψεκασμό να φορά κατάλληλη ενδυμασία και γάντια.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές για 15 ημέρες τουλάχιστον ή μέχρις ότου το φύλλωμα ψεκασμένων ζιζανίων έχει ξεραθεί τελείως και έχει γίνει ακατάλληλο για βόσκηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Δεν χρειάζεται η χρήση ειδικής προστατευτικής ενδυμασίας για τον καθαρισμό του φεκαστικού εξοπλισμού. Καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του φεκαστικού με καθαρό νερό το οποίο θα περάσετε και από τους βραχίονες, τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10 της χωρητικότητας του φεκαστήρα σε νερό. Αδειάστε και πάλι το φεκαστήρα τελείως. Γεμίστε κατά το ήμισυ το φεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό και προσθέστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό στη συνιστώμενη δοσολογία. Αναδεύστε και ξεπλύνετε με το διάλυμα βραχίονες και σωλήνες για λίγο. Γεμίστε το δοχείο του φεκαστικού με νερό μέχρις επάνω και αφήστε το μίγμα νερού και απορρυπαντικού να σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τους βραχίονες και τους σωλήνες αδειάζοντας το δοχείο τελείως. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά με απορρυπαντικό και καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το δοχείο του φεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε το νερό με πίεση από βραχίονες και σωλήνες. Αδειάστε τελείως το δοχείο του φεκαστικού. Μην ψεκάζετε τα απόνερα σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε χωράφια που προορίζονται για τη σπορά ευαίσθητης καλλιέργειας.

305x120