



P33221



# Blue Shield

## HiBio® 25WG

**Βρέξμοι κόκκοι (WG)**  
Υδροξείδιο του χαλκού  
Copper Hydroxide

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός χαλκός 25% β / β**  
(σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)  
**Βοηθητικές ουσίες: 60,38% β / β**

## Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Περιεχόμενο: **750g**

### ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το BLUE SHIELD HIBIO 25 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει χορήγησης άδειας παράλληλου εμπορίου με αρ.πρώτ. 13660/326071/31.01.2020 από το ΥΠΑΑΤ. Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που παρασκευάζεται από την εταιρία AGRI-ESTRELLA Μεξικού και ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δυνάμει της υπ. αριθμ. 60812/28.12.2018 έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος CURACOP XT 25 WG.



Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος κυκλοφορίας:  
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335, Τ.Κ.15231, Χαλάνδρι,  
Αθήνα, Τηλ.: 2130 065000



**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφάστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** χορηγήστε γάλα ή νερό (για αρσίσση) και επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Πενικιλλαμίνη.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ  
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναθεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και όξινα σκευάσματα. Σε περίπτωση συνδυασμού του με προσκαλινητικά, λόδια, εντομοκτόνα και άλλα μυκητοκτόνα, διαλύεται το σκεύασμα σε ένα δοχείο και μπαίνει πρώτο στο βυτίο και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευάσματα

**Φυτοτοξικότητα:** Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμπελιού Delaware, Rosette, Niagara και Concord. Είναι φυτοτοξικό στα πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Επαναλαμβάνόμενες χρήσεις στα μηλοειδή μπορεί να προκαλέσουν καστανό χρωματισμό. Στην μηλιά οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή αποκτάσει μήκος 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται στις χαμηλές θερμοκρασίες (<5°C) και σε υγρές συνθήκες.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγούμενως με ακίσιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (Ε / Ο), Ελιά, Πατάτα, Αραχίδα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες. Ακρόδρυα (Ιαμυγδαλιά, Καρυδιά): 28 ημέρες. Λαχανικά (Υ+Θ), Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες. Τομάτα Υπαίθρου: 10 ημέρες. Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα. Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Τις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.



# Blue Shield

## HiBio® 25WG

**Βρέξμοι κόκκοι (WG)**  
Υδροξείδιο του χαλκού  
Copper Hydroxide

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός χαλκός 25% β / β**  
(σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)  
**Βοηθητικές ουσίες: 60,38% β / β**

## Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Περιεχόμενο: **750g**

### ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το BLUE SHIELD HIBIO 25 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει χορήγησης άδειας παράλληλου εμπορίου με αρ.πρώτ. 13660/326071/31.01.2020 από το ΥΠΑΑΤ. Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που παρασκευάζεται από την εταιρία AGRI-ESTRELLA Μεξικού και ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δυνάμει της υπ. αριθμ. 60812/28.12.2018 έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος CURACOP XT 25 WG.



Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος κυκλοφορίας:  
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335, Τ.Κ.15231, Χαλάνδρι,  
Αθήνα, Τηλ.: 2130 065000



**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.  
**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**  
**ΕΠΙΠΕΡΙΛΟΓΗ** (Κρήνη φρούτ, λεμονιά, μοναρηλιά, πορτοκαλιά): Για την καταπολέμηση των: Α. Κερματίσρα, Ανθράκων, Σαπτογών, Δόση 100-180 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (200-450 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 200-250 λίτ. / στρ. Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Β. Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών, Δόση 100-180 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (200-450 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 200-250 λίτ. / στρ. Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από καλό ή κακό ή παύση.  
**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ:** Για την καταπολέμηση των: Α. Κορύνεα, Δόση 260-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-480 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτ. / στρ. Στις περιόδους όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το καλοκαίρι λίγο πριν την έκπτυξη των βλαστών ασφαλών. Β. Εξέλιση κορυμιάς κλάδων, Δόση 260-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-480 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτ. / στρ. Εάν υπάρχουν ευνοϊκές για το βακτήριο συνθήκες συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής στις αρχές της άνοιξης.  
**ΚΑΡΥΔΙΑ:** Για την καταπολέμηση των: Ανθράκων, κηλίδωση των φύλλων και καρπών, Δόση 215-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-480 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτ. / στρ. Εφαρμογές που αρχίζουν πριν την εκκυσίωση των φύλλων και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες.  
**ΜΗΛΟΕΙΔΗ, Μελιά, Αχλαδιά:** Για την καταπολέμηση των: Α. Φουξήκλαδο, Σαπτογών, Φαειή στην, Δόση 215-475 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-475 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτ. / στρ. Εφαρμογή το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πρώτης κορύφωσης. Β. Βακτηρίωση, βακτηριακή κηλίδα, Δόση 215-500 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-500 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτ. / στρ. Στις περιόδους που ενδημούν οι ασθένειες, συνιστάται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  
**ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, Βερκοκιά:** Για την καταπολέμηση των: Α. Κορύνεα, Δόση 260-330 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-395 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / στρ. Στις περιόδους που ενδημεί η ασθένεια. Εφαρμογές α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του καλοκαιριού πριν τη διάλυση των αβυθών. Β. Φαειή στην, Δόση 260-330 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-395 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / στρ. Εφαρμογές στη διάλυση των αβυθών και στη ρόσση κορυφή.  
**Κορύνεα:** Για την καταπολέμηση των: Κορύνεα, προσβολή από Ραυδοσπόριες σπυρίγγα, Δόση 260-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-400 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / στρ. Στις περιόδους που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του καλοκαιριού πριν την διάλυση των αβυθών.  
**Ροκάνεα:** Για την καταπολέμηση των: Α. Εξορσικός Κορύνεα, κηλοσπορίωση, Δόση 215-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-400 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / στρ. Στις περιόδους που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του καλοκαιριού πριν τη διάλυση των αβυθών. Β. Φαειή στην, Δόση 215-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-400 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / στρ. Εφαρμογές στη διάλυση των αβυθών και στη ρόσση κορυφή. Γ. Βακτηριακή κηλίδα, Δόση 215-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-400 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / στρ. Στις περιόδους που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.  
**ΑΜΠΕΛΙ (Ε-Θ):** Για την καταπολέμηση των: Περονόσπορος, Ανθράκων, βακτηριακή νέκρωση, Δόση 170-430 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (85-430 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / στρ. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι διαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.  
**ΕΛΙΑ:** Για την καταπολέμηση των: Α. Κυκλάκινα, Δόση 210-475 (θρόνη), 210-420 (θρόνη) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (315-7125 (θρόνη), 315-630 (θρόνη) γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 150 λίτ. / στρ. Στις περιόδους όπου ενδημεί η ασθένεια εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. Β. Ραυδοσπόρι, Δόση 475 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (710-7125 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 150 λίτ. / στρ. Δύο εφαρμογές η πρώτη όταν αρχίζουν να κομίζονται οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Γ. Καρκίνωση, Δόση 210-475 (θρόνη), 210-420 (θρόνη) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (315-7125 (θρόνη), 315-630 (θρόνη) γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 150 λίτ. / στρ. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από καλό ή κακό ή παύση.  
**ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ):** Για την καταπολέμηση των: Α. Περονόσπορος, Δόση 215-500 (θρόνη προσβολή), 215-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-500 (θρόνη προσβολή), 105-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / στρ. Εφαρμογή από το στάδιο των νεαρών απορρυμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Β. Ανθράκων, σαπτογών, κηλοσπορίωση, Δόση 215-500 (θρόνη προσβολή), 215-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-500 (θρόνη προσβολή), 105-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Γ. Βακτηρίωση, Δόση 215-500 (θρόνη προσβολή), 215-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-500 (θρόνη προσβολή), 105-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / στρ. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών απορρυμάτων μέχρι την καρπόδεση.  
**ΚΟΛΟΚΥΘΟΕΙΔΗ (Υ+Θ):** Αγγούρι, καλαμάκι, πατάτα, καρπούζι. Για την καταπολέμηση των: Περονόσπορος, Ανθράκων, Κηλοσπορίωση, βακτηρίωση, Δόση 215-220 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-220 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  
**ΦΑΣΟΛΙ:** Για την καταπολέμηση των: Α. Κερματίσρα, Δόση 265-275 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (130-220 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτ. / στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. Β. Βακτηρίωση, Δόση 265-275 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (130-220 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτ. / στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  
**ΕΛΑΙΟ:** Για την καταπολέμηση των: Σαπτογών, Κηλοσπορίωση, Δόση 265-275 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (130-220 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτ. / στρ. Όταν τα φρούτα έχουν ύψος 15-20 εκ και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  
**ΠΑΤΑΤΑ:** Για την καταπολέμηση της Κηλοσπορίωσης, Δόση 360 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτ. / στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  
**ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** Για την καταπολέμηση της Κηλοσπορίωσης, Δόση 540 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215 γρ. / στρ.) Όγκος ψεκ. υγρού 40 λίτ. / στρ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.  
**ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:**  
Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Μηλοειδή, Βερκοκιά, Αμπέλι (Ε/Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Φασόλι, Έλαιο, Αραχίδα: 3  
Κορύνεα, Ροκάνεα, Πατάτα, Κολοκυθοειδή, Ζαχαρότευτλα: 4  
Ελιά: 2  
Παρατήρησης: 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που εκτελούνται προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα Μηλοειδή. 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καρποί συνήθως είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 3) Στο λαχανικό να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη θερμής ώρας της ημέρας. 4) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καρποί συνήθως ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 5) Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελά και λαχανικά να ακολουθείται η δόση της πρώτης που εφαρμόζεται το προγράμμα των γεωργικών προετοιμασιών. 6) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκού των σκευασμάτων ανά καλλιερητική περίοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).