



P34285

Blue Shield

HiBio® 25WG

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Υδροξείδιο του χαλκού
Copper Hydroxide

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός χαλκός 25% β / β**
(σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες: 60,38% β / β

Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Περιεχόμενο: **750g**

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το BLUE SHIELD HIBIO 25 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει χορήγησης άδειας παράλληλου εμπορίου με αρ.πρώτ. 7211/188833/16.07.21 από το ΥΠΑΑΤ. Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που παρασκευάζεται από την εταιρία ALBAUGH EUROPE SARL, Ελβετίας και ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δυνάμει της υπ. αριθμ. 60812/28.12.2018 έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος CURACOP XT 25 WG.



Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, Τ.Κ.15231, Χαλάνδρι,
Αθήνα, Τηλ.: 2130 065000



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου / περιεκτικ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφάστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αρσάωση) και επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Πενικιλιλμίνη.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ**

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναθεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και όξινα σκευάσματα. Σε περίπτωση συνδυασμού με το προσκαλπτικό, λόδια, εντομοκτόνα και άλλα μυκητοκτόνα, διαλύεται το σκεύασμα σε ένα δοχείο και μπαίνει πρώτο στο βυτίο και μετά προστίθενται τα υπόλοιπα σκευάσματα.

Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες αμπελιού Delaware, Rosette, Niagara και Concord. Είναι φυτοτοξικό στα πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Επαναλαμβάνόμενες χρήσεις στα μηλοειδή μπορεί να προκαλέσουν καστανό χρωματισμό. Στην μηλιά οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή είναι μήκους 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθιση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται στις χαμηλές θερμοκρασίες (<5°C) και σε υγρές συνθήκες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγούμενως με ακίσιο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (Ε / Ο), Ελιά, Πατάτα, Αραχίδα, Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες. Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά): 28 ημέρες. Λαχανικά (Υ+Θ), Τομάτα θερμοκηπίου: 7 ημέρες. Τομάτα Υπαίθρου: 10 ημέρες. Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα. Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Blue Shield

HiBio® 25WG

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Υδροξείδιο του χαλκού
Copper Hydroxide

Εγγυημένη σύνθεση: **Μεταλλικός χαλκός 25% β / β**
(σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες: 60,38% β / β

Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Περιεχόμενο: **750g**

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το BLUE SHIELD HIBIO 25 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει χορήγησης άδειας παράλληλου εμπορίου με αρ.πρώτ. 7211/188833/16.07.21 από το ΥΠΑΑΤ. Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που παρασκευάζεται από την εταιρία ALBAUGH EUROPE SARL, Ελβετίας και ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δυνάμει της υπ. αριθμ. 60812/28.12.2018 έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσματος CURACOP XT 25 WG.



Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, Τ.Κ.15231, Χαλάνδρι,
Αθήνα, Τηλ.: 2130 065000



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Κρήνη φρούτ, λεμονιά, πορτοκαλιά): Για την καταπολέμηση των: Α. Κερρασιόρα, Ανθράκωση, Σερποειδών, Δόση 100-180 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (200-450 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 200-250 λίτ. / σπ. Εφαρμογές με τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Β. Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών, Δόση 100-180 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (200-450 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 200-250 λίτ. / σπ. Εφαρμογές πριν την έναρξη των βροχών και μετά από καύση ή παγετό.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Για την καταπολέμηση των: Α. Κρόνιοα, Δόση 260-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-480 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτ. / σπ. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μέχρι πέσουν τα φύλλα και το καλοκαίρι λίγο πριν την έκπτυξη των βλαστών ανθών. Β. Εξέλιση κορυμιάς κλάδων, Δόση 260-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-480 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτ. / σπ. Εάν υπάρχουν εννοίες για το βακτήριο ενδημούν συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής στην αρχή της ανάπτυξης.
ΚΑΡΥΔΙΑ: Για την καταπολέμηση των: Ανθράκωση, κηλίωση των φύλλων και καρπών, Δόση 215-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-475 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτ. / σπ. Εφαρμογές που αρχίζουν πριν την εκκυσίωση τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ, Μελιά, Αχλαδιά: Για την καταπολέμηση των: Α. Φουξικλάδιο, Σερποειδών, Φαειά στην, Δόση 215-475 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-475 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτ. / σπ. Εφαρμογή το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πρόκλησης κηρίων. Β. Βακτηριόση, βακτηριακή κηρίωση, Δόση 260-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-395 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / σπ. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α) το φθινόπωρο μέχρι πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του καλοκαιριού πριν τη διάλυση των οφθαλμών. Β. Φαειά στην, Δόση 260-320 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-395 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / σπ. Εφαρμογές κατά τη διάρκεια των οφθαλμών και στη πρόκληση κηρίων.
Κεράσια: Για την καταπολέμηση των: Κρόνιοα, προσβολή από Pseudomonas syringae, Δόση 260-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (260-400 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / σπ. Στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μέχρι πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του καλοκαιριού πριν την διάλυση των οφθαλμών.
Ροδακινά: Για την καταπολέμηση των: Α. Εξοσώσεως, Κρόνιοα, Κλαδοσπορίωση, Δόση 215-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-400 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / σπ. Στις περιοχές όπου ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μέχρι πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του καλοκαιριού πριν τη διάλυση των οφθαλμών. Β. Φαειά στην, Δόση 215-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-400 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / σπ. Εφαρμογές κατά τη διάρκεια των οφθαλμών και στη πρόκληση κηρίων. Γ. Βακτηριακό έλκος, Δόση 215-340 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215-400 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 100-120 λίτ. / σπ. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων.
ΑΜΠΕΛΙ (Ε-Θ): Για την καταπολέμηση των: Περονόσπορος, Ανθράκωση, Βακτηριακή νέκρωση, Δόση 170-430 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (85-430 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / σπ. Εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι διαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., λίγο πριν την άνθιση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
ΕΛΙΑ: Για την καταπολέμηση των: Α. Κυκλόκιοα, Δόση 210-475 (θρόνη), 210-420 (θρόνη) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (315-712,5 (θρόνη), 315-430 (θρόνη) γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 150 λίτ. / σπ. Στις περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης. Β. Ραυδοσπορία, Δόση 475 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (710-712,5 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 150 λίτ. / σπ. Δύο εφαρμογές η πρώτη όταν αρχίζουν να καρπώνονται οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Γ. Καρκινώση, Δόση 210-475 (θρόνη), 210-420 (θρόνη) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (315-712,5 (θρόνη), 315-430 (θρόνη) γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 150 λίτ. / σπ. Εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από καύση ή παγετό.
ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των: Α. Περονόσπορος, Δόση 215-500 (θρόνη προσβολή), 215-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-500 (θρόνη προσβολή), 105-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / σπ. Εφαρμογή από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Β. Ανθράκωση, Σερποειδών, Κλαδοσπορίωση, Δόση 215-500 (θρόνη προσβολή), 215-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-500 (θρόνη προσβολή), 105-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / σπ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Γ. Βακτηριόση, Δόση 215-500 (θρόνη προσβολή), 215-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-500 (θρόνη προσβολή), 105-320 (ελαφρά προσβολή) γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / σπ. Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων μέχρι την καρπώση.
ΚΟΚΚΙΝΟΒΕΙΔΗ (Υ+Θ): Αγκούρι, καλαμπόκι, πατάτα, κηρύθι. Για την καταπολέμηση των: Περονόσπορος, Ανθράκωση, Κλαδοσπορίωση, Βακτηριόση, Δόση 215-220 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-220 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / σπ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΦΑΣΟΛΙ: Για την καταπολέμηση των: Α. Κερρασιόρα, Δόση 265-275 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (130-220 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτ. / σπ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες. Β. Βακτηριόση, Δόση 265-275 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (130-220 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτ. / σπ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΕΛΑΙΟ: Για την καταπολέμηση των: Σερποειδών, Κερρασιόρα, Δόση 265-275 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (130-220 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτ. / σπ. Εφαρμογές όταν τα φύλλα έχουν 15-20 εκ και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΑΡΑΧΙΔΑ: Για την καταπολέμηση της Κερρασιόρας, Δόση 360 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 60 λίτ. / σπ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση των: Περονόσπορος, Ανθράκωση, Δόση 215-340 (θρόνη προσβολή), 215-220 (ελαφρά προσβολή) γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (105-340 (θρόνη προσβολή), 105-220 (ελαφρά προσβολή) γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτ. / σπ. Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν υψος 15-20 εκ και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Για την καταπολέμηση της Κερρασιόρας, Δόση 540 γρ. / 100 λίτ. ψεκ. υγρού (215 γρ. / σπ.) Όγκος ψεκ. υγρού 40 λίτ. / σπ. Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Μηλοειδή, Βερκοκινά, Αμπέλι (Ε/Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Φασόλι, Έλινα, Μοσχαρά, 3
Κεράσια, Ροδακινά, Πατάτα, Κολοκυνθοειδή, Ζαχαρότευτλα, 4
Ελιά, 2
Παρατηρήσεις: 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθιση, ιδιαίτερα για τα Μηλοειδή. 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καρπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, οι ελάχιστες δόσεις είναι ανάλογα με την ένταση της προσβολής. 3) Στο λαχανικό να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 4) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 5) Στις καλλιέργειες αμπέλι, αραχίδα, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προετοιμασιών. 6) **Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκού των σκευασμάτων ανά καλλιερητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γρ/αμ. ανά στρέμμα (ποσότητα συγκριμένη σε μεταλλικό χαλκό).**