

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο όταν χειρίζεστε το σκεύασμα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη **16 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα (για τα Πυρηνόκαρπα) και **14 μέτρων** (για τα Μηλοειδή).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλυσμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν αναμειγνύεται με αλκαλικής αντίδρασης σκευάσματα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες):

Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά Nashi, Κυδωνιά, Μουσουλιά: 28.

Αμυγδαλιά, Φιστικιά: 120.

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηνιά: 3.

Κερασιά, Βυσσινιά: 5.

Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 28.

Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Y+Θ), Πεπόνι (Y), Καρπούζι (Y), Κολοκυθάκια (Y): 3.

Ελιά: Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημ/νία παρασκευής / Αριθμός παρτίδας:
Βλέπε άνω μέρος της φιάλης



0318

Dow Dow AgroSciences

Karamat™
2,5 EW

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Fenbuconazole
(Φενμπουκοναζόλ)

Εγγυημένη σύνθεση:
Fenbuconazole: 2,5 % β/ο
Βοηθ. ουσίες: 97,43 % β/β

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Περιέχει Propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester, (2S).
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Κάτοχος της άδειας: DOW AgroSciences Export S.A.S
371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne, ΓΑΛΛΙΑ

A.A.Δ.Α.:
60475/ 15-09-2015

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ.Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ: 210-6726381



Περιεχόμενο:
2 λίτρα

®™ Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά – Nashi, Κυδωνιά, Μουσουλιά (ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του Φουζικλάδιου: Δόση: 135 - 200κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 200 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή από το στάδιο της «ρόδινης κορυφής» και την ανάπτυξη των φύλλων ως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο-μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 4/7 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερκοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά): Για την καταπολέμηση της Φαιάς Σήψης, του Ωιδίου, του Κυλινδροσπορίου κερασιάς, της Σκωρίασης και της Ανθράκωσης: Δόση: 200 - 600κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 150 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Με το ξεδίπλωμα των φύλλων και την ανάπτυξη των βλαστών ως την ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο-μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 4/10 ημέρες.

Αμυγδαλιά: Για την καταπολέμηση της Φαιάς Σήψης: Δόση: 300 - 840κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 35 - 100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο-μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/7 ημέρες.

Φιστικιά (ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση της Σεπτόριας, της Σκωρίασης και της Βοτρυσοφαίριας: Δόση: 300 - 840κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (300 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 35 - 100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Με την έκπτυξη των οφθαλμών/αρχή της άνθησης έως το τέλος της άνθησης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο-μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 2/7 ημέρες.

Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για την καταπολέμηση του Ωιδίου: Δόση: 150κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 150 κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ., και μέχρι της αλλαγής του χρώματος των ραγών, και ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο-μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 4/10-14 ημέρες.

Ελιά: Για την καταπολέμηση του Κυκλοκονίου: Δόση: 300κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ. υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Από την εποχή που διαχωρίζονται τα πρώτα φύλλα μέχρι και πριν την άνθηση. Αλλαγή χρώματος της στεφάνης από πράσινο σε λευκό (πριν ανοίξουν τα πρώτα άνθη). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 1.

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Αγγούρι (Y+Θ), Κολοκυθάκια (Y), Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Y), Καρπούζι (Y): Για την καταπολέμηση του Ωιδίου: Δόση: 200-500κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 200κ.εκ./στρ.). Όγκος ψεκ.υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. Χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση 3 πραγματικών φύλλων στον κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο-μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες: 3/8 ημέρες.

Παρατηρήσεις:

1. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή.

2. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας μουσουλιάς και φιστικιάς δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΘΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.