

- **Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της Dow AgroSciences**
- **Εξαιρετική καταπολέμηση σημαντικών και δυσκολοεξόντωτων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι**
- **Ταυτόχρονη ύπαρξη δύο διαφορετικών δραστικών ουσιών - ισχυρό όπλο στη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας**
- **Αποτελεσματικότητα σε πλατύφυλλα ζιζάνια με ανθεκτικότητα σε ALS ζιζανιοκτόνα**
- **Μεγάλο εύρος εφαρμογής, με αποτέλεσμα ο ψεκασμός να γίνεται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας**
- **Μικρή δόση εφαρμογής ανά στρέμμα**



ΠΡΟΣΟΧΗ



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Αριθμός Αδείας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70245/8-9-2017



1/2020



**Δυναμική παρουσία
στη ζιζανιοκτονία των σιτηρών**



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι

Τηλ.: 213 0065000 ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289100

E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr



Dow AgroSciences


Solutions for the Growing World

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ






aminopyralid



florasulam



παπαρούνα




κολητσιίδα



σινάπι

Εφαρμογή στο Χωράφι:

Το **LANCELOT 450WG** εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στα στάδια της αρχής του αδελώματος έως και την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου. Στα ζιζάνια εφαρμόζεται μέχρι το στάδιο των 6-8 φύλλων.



Τρόπος Εφαρμογής:

Το **LANCELOT 450WG** εφαρμόζεται στη δόση των 2,5-3,3 γρ. σκ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού διαλύματος 10-40 λίτρα /στρέμμα.

- Πριν την εφαρμογή να γίνεται έλεγχος για την σωστή ρύθμιση του ψεκαστικού μηχανήματος και έλεγχος του εξοπλισμού (χρήση σωστού τύπου μπεκ, ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού).
- Κατά την εφαρμογή να γίνεται σωστός ψεκασμός και να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του χωραφιού.

Φάσμα Δράσης - Αποτελεσματικότητα:

Ο συνδυασμός των δύο δραστικών ουσιών του **LANCELOT 450WG** προσφέρει τη δυνατότητα στον παραγωγό να καταπολεμήσει μια σειρά από σημαντικά ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.

■ Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες από 5-25°C

■ Βροχόπτωση μία ώρα μετά την εφαρμογή δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του



Παρατηρήσεις: Η προσθήκη επιφανειοδραστικού παράγοντα αυξάνει την αποτελεσματικότητα εναντίον των ζιζανίων **πολυκόμμι** (*Polygonum aviculare*), **καπνόχορτο** (*Fumaria officinalis*) και **βερόνικα** (*Veronica haederifolia*).



στελλάρια



καψέλλα



κίρσιο

Χρονικά Διαστήματα Ασφάλειας:

Οι καλλιέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν την εφαρμογή του **LANCELOT 450WG** είναι:

- Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς (τουλάχιστον 3 μήνες μετά την εφαρμογή): Χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, Τριτικάλε, βρώμη), χειμερινή ελαιοκράμβη, λειμώνες.
- Τουλάχιστον 11 μήνες μετά τον ψεκασμό στενόφυλλες καλλιέργειες, ανοιξιότικα σιτηρά, ανοιξιότικη ελαιοκράμβη, ηλίανθος, πατάτα, ζαχαρότευτλα κρεμμύδι, καρότα, μηδική, λινάρι, ραδίκι κλπ.
- Τουλάχιστον 14 μήνες μετά τον ψεκασμό: Σόγια, Φασόλια, Αρακάς, Ψυχανθή, Ρεβίθια, Καπνός.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*)
- Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
- Κίρσιο (*Cirsium arvense*)
- Μεγαλόκαρπη Κολητσιίδα (*Gallium aparine*),
- Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)
- Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*),
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Στελλάρια (*Stellaria media*)

- Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*)
- Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)
- Πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*)

