

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μειώστε τη χυμώδη ποσότητα. Διόχευση του περιεχομένου/υπερπείεξη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

Γενικές πληροφορίες: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθόντας έχει στασιμότητα ή είναι αναισθητός.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν προκαλεί ή όχι εμετό θα ληφθεί από το γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Ζητήστε ιατρική συνδρομή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν έχει καθοριστεί. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Για να αποφευχete τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης:

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αερατική ζώνη προστασίας **20 μέτρων** για τις δορυφόρες καλλιέργειες και **15 μέτρων** για τις υποκείμενες καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήσετε μια αερατική ζώνη προστασίας **3 μέτρων** από μη γεωργική γη.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνων μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύπτετε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 1 μέτρα μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κρύο απορρυπαντικό σαπουνιόμας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λύξτε όλες τις σπασίματες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχανήμα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό με μη ριγμένο το νερό του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΞΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οι φίλδρες ξεπλύνονται υπο πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρίβονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακύκλωση ενέργειας. Η απόφαση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικρινή που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

ΠΡΟΒΛΑΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LASER 480 SC ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΛΗΠΗ

• Έκθεση των βοτάνων, παρασιτοειδών υμενόπτερων και αρθρακτικών εντόμων και ακάρεων σε απευθείας ψεκασμό με LASER 480 SC μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

• Να μη γίνεται εξάπλωση βοτάνων για 24 ώρες μετά την εφαρμογή καθώς επίσης παρασιτοειδών και αρθρακτικών εντόμων και ακάρεων για 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

• Μήλια, Ροδανία, Βερκοκία, Δαμασκηνία, Κερασιά, Βυσαννία, Πατάτα, Σμέουρο, Βατόμουρο, Μυρτιάλο, Φιστικιά, Γλυκοπατάτα: 7 ημέρες.

• Αχλαδιά: 7 ημέρες.

• Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της Ψύλλας): 14 ημέρες.

• Αμπέλι: 14 ημέρες.

• Φρούτα: 1 ημέρα.

• Τζαμιά, Αγγούρια, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σπανάκι, Ρόκα, Μαρούλι, Παντζάρι (Φύλλα): 3 ημέρες.

• Βαμβάκι: 21 ημέρες.

• Φοινικόκηλη: ---

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τυλάγγιστο, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέγρος θερμοκρασία και καλά αεριζόμενο.



Εγγυημένη σύνθεση: Spinosad 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 48.19% β/β

Πυκνό εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

"Το LASER 480 SC είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν."

- * 1. Να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τα παράσιτα και τα ωφέλιμα έντομα και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
- 2. Χρειάζεται αναγνώριση από τον φορέα ελέγχου ή πιστοποίησης.

**Περιέχει: 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-one.**
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2108898700

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσσηνίας 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070

Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της

Μηλοειδή (Μήλια, Αχλαδιά): Για την καταπολέμηση της Καρπόκαμψης των μήλων *Cydia pomonella*, και της Νάρκης των γιγροκαρπών *Lithocolletis blancardella*. Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

*** Αχλαδιά:** Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Αχλαδιάς *Cacopsylla pyra*. Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 30-35 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Πυρηνόκαρπα (Ροδανία, Βερκοκία): Για την καταπολέμηση του Βλαστορύκτη της ροδανίας *Anarsia lineatella*. Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Πυρηνόκαρπα (Ροδανία, Βερκοκία, Κερασιά, Βυσαννία, Δαμασκηνία (Χρήσιμες ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii*. Ψεκασμό φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Αμπέλι: Για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας *Lobesia botrana*. Η εφαρμογή στη 2η και στην 3η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου και επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Δόση:** 10-15 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-120 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 4.

Για την καταπολέμηση του θρίπα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τακτικά και επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 4.

Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii* (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας). Ψεκασμό φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Τομάτα (Υπαίθριος): Για την καταπολέμηση του Φυλλορύκτη *Liomyza* spp. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 50 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Για την καταπολέμηση της *Spodoptera* spp. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 25-30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Για την καταπολέμηση της *Tuta absoluta****. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού (max 25 κ.εκ./στρέμμα) και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Τομάτα (Θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του Φυλλορύκτη *Liomyza* spp. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Για την καταπολέμηση του θρίπα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θρίπων (κινητών μορφών)/έντομος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 5 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Για την καταπολέμηση της *Spodoptera* spp. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 25-30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Για την καταπολέμηση της *Tuta absoluta****. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι και Φρούσα (Θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του θρίπα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θρίπων (1-2 στη φρούσα) (κινητών μορφών) / έντομος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες (στο αγγούρι 7-10 ημέρες). **Δόση:** 20-25 κ.εκ./σκέυασμα/100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Φρούσα (Θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii* (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας). Ψεκασμό φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Βαμβάκι: Για την καταπολέμηση του πράσινου ακουκίου *Helioverpa armigera*. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 15-20 κ.εκ./στρέμμα και ψεκαστικό υγρό 50-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Πατάτα: Για την καταπολέμηση του δορυφόρου *Leptodactyla decemlineata*. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 5 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Φιστικιά (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Φιστικιάς *Acanthosoma* spp.: Ψεκασμό καλλύμης με την εμφάνιση ωών και νυμφών στο φύλλο. Μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες. Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. **Δόση:** 30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Σπανάκι (Υπαίθριος) (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του κοινού θρίπα *Thrips tabaci* και του θρίπα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενυλίων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Ρόκα (Υπαίθριος) (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του θρίπα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Φοινικόκηλη (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Paysandisia archon*. Εφαρμογή στο μέγιστο των πτήσεων του εντόμου και πριν την εγκατάσταση της προσβολής. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες εφ' όσον συνεχίζονται συλλήψεις του εντόμου. Ο ψεκασμός πρέπει να καταβυθίζεται στη στεφανόχρυσο ήμια του κορμού (0.5 έως 1 μέτρο από την κορυφαία επιφάνεια), που είναι η προτιμώμενη περιοχή αναπαραγωγής του θηλυκού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο. **Δόση:** 75 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Μικροί καρποί (Θερμοκηπίου) : Σμέουρο, Βατόμουρο, Μυρτιάλο (Χρήσιμες ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii*. Ψεκασμό φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Μαρούλι (Υπαίθριος) (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση Προνυμφών *Heliothis armigera*: Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Παντζάρι (Υπαίθριος) (Φύλλα): (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση Προνυμφών *Heliothis armigera*, *Spodoptera* spp.: Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Γλυκοπατάτα (Χρήσιμη ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Duroniella fovealis*. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 5 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Παρατηρήσεις:

- * Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.
- ** Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./λίτρη στη σχαλιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pyri*, για αύξηση της αποτελεσματικότητας.
- *** Στην τομάτα, αγρού και θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φυλλορύκτη, το LASER 480 SC μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./σκέυασμα/λίτρη σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./λίτρη.
- Επανάληψη εφαρμογής εφόσον βρεθεί μέσα σε 4 ώρες.
- **** Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι (20-25 κ.εκ./λίτρη LASER 480 SC + 250-300 κ.εκ./λίτρη παραφινικό λάδι).
- ***** Να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου.
- Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσιμες ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες του σκευάσματος στην αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
- † Η χρήση στην καλλιέργεια του μαρούλιού αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις: Κατσάρα μαρούλια, Μαρούλια σολές, Κεφαλάτι μαρούλια, Κανά μαρούλια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλλύμης φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ριγνείται με συνεχή ανάδραση στο βυτίο. Η φιάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ριγνούνται στο βυτίο. Απομεινόμενα με νερό και συνεχίζουμε την ανάδραση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το spinosad είναι δισυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στόμαχου με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση εντόμων των τάξεων *Lepidoptera*, *Diptera*, *Siphonaptera*, *Thysanoptera* και κάποια *Coleoptera* σε διάφορες καλλιέργειες. Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δευτερεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης και προκαλεί παρατεταμένη ενεργοποίησή τους, εξάντληση της οποίας τα έντομα παραλείπουν λόγω νευρομυϊκής κόπωσης. Η παράλυση είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων σε χαμηλά επίπεδα.
- Επτεταγμένες με LASER 480 SC κυλινδρικές, όταν ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
- Πλήρη κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) με το ψεκαστικό υγρό.
- Εφαρμογή των εντομοκτόνων δόσεων και όχι μικρότερων.
- Έως δύο (2) εφαρμογές ανά γενιά του κάθε εντόμου-στόχου και εναλλαγή για την επόμενη γενιά με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εντομοκτόνες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Η μ'νία παρασκευής/Αριθμός παρτίδας: (Βλέπε άνω μέρος φιάλης)

305x130

