

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
 *Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. *Διάθεση του περιεχομένου/περιερίκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλέσετε εμετό εάν ο παθόντας έχει επικρατική ή/και αναπνευστική διαταραχή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την συσκευασία. Η απόφαση για το εάν προκαλέσει ή όχι εμετό θα ληφθεί από το γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το μάτι: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν έχει καθοριστεί. Ακολουθείστε συστηματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΔΟΣ: (210) 7793777

Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε στην αέσκια ηλιο προστασία **20 μέτρων** για τις δενδροειδείς καλλιέργειες και **15 μέτρων** για τις υπόλοιπες καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε μη στοχευμένα αρθρόποδα να αφήσετε μια αέσκια ηλιο προστασία **3 μέτρων** από μη γεωργική γη.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
 Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδυνότητα μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυμέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί 1 ημέρα μετά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται σε συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Η φιάλη ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά ρίχνονται στο βυτίο. Απογειούμε με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθορισμός ψεκαστικής: Αμέσως μετά την εφαρμογή οδεύστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε ολοκληρωτικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό απορρυπαντικό όλα τα ορείς υπόλειμμα και αφήστε να καθίσει νερό. Αφήστε όλες τις απαιτήσεις προσβολής όταν καθαρίζετε τη ψεκαστική μηχανή. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε το νερό του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

Προσευδοί για ασφαλή χρήση του LASER 480 SC σε προγράμματα IPM στα θερμοκήπια:

- Έκδοση των βομβινών, χαλαρότητα υμενιόπτερων και αρσενικών εντόμων και ακάρεων σε απευθείας ψεκασμό με LASER 480 SC μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
- Να μη γίνεται εξάπλωση βομβινών για 24 ώρες μετά την εφαρμογή καθώς επίσης παρασιτοειδών και αρσενικών εντόμων και ακάρεων για 1-2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (να νερό του ξεπλύματος τα ριχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ανατίθενται στα οικιακά συλλέγμενα για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαυσήματα που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια υπολογισθέν, όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία σε σκοτεινό χώρο, σε μέρες πρόσθετο και καλά αεριζόμενο.

Μην'ια παρασκευής: (βλέπετε ως άνω μέρος φιάλης)
 Αριθμός παρτίδας:



spinosad (σπινουσάντ)
 Εγγυημένη σύνθεση
 spinosad: 48 % β/ο
 βοηθητικές ουσίες: 48,19 % β/β

Πυκνό εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά



ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

«Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία, βάσει του Καν. 404/2008 της Ε.Ε.»

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

*** 1. Να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για το παρόν και το ωφέλιμα έντομο και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.**
2. Χρειάζεται αναγνώριση από το φορέα ελέγχου ή πιστοποίησης.

Κάτοχος Έγκρισης: Dow AgroSciences Export SAS
 Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1,
 790, avenue du Docteur Donat, 06254 Mougins Cedex, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση / Διανομέας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
 Μεσογείων 335, Χαλάνδρι
 Αθήνα ΤΗΛ. 210 6276381



TM Trademark of the Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow

Αρ. εγκρ. Κυκλ.:
 ΠΕ 14025/ 13-5-2008

Περιεχόμενο
1 λίτρο

Θάσμα Δράσης:

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για την καταπολέμηση της Κασπιόκακος των μήλων *Cydia pomonella*, και της Νάρκης των γιγαροκάρπων *Lithocolletis blancardella*. Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανόληση μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20-30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

**** Αχλαδιά:** Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Αχλαδιάς *Caspariella pyg.* Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανόληση μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 30-35 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινά, Βερικοκιά): Για την καταπολέμηση του Βλαστορύχτη της ροδάκινας *Anarsia lineatella*. Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανόληση μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινά, Βερικοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Δαμασκηλιά (Χρήσιες ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii*. Ψεκάσιμο φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Αμπέλι: Για την καταπολέμηση της Ευδεμίδας *Lobesia botrana*. Η εφαρμογή στη 2η και στην 3η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου και επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. **Δόση:** 10-15 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-120 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 4.

Για την καταπολέμηση του θρίπτα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της αναφοράς και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπτες (κινήσεις μορφής από ταυσιμύ και επαναλαμβάνεται μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 4.

Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii* (Χρήσις ήσσονος σημασίας). Ψεκάσιμο φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Τομάτα (Υπαίθριου-Θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του Φυλλορύχτη *Liriomyza* spp. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα νερού (βερικοκιά) και 50 κ.εκ./100 λίτρα νερού (υπαίθριου). Ψεκαστικό υγρό 50-150 λίτρα/στρέμμα για τις τομάτες θερμικού και 50-60 λίτρα/στρέμμα για υπαίθριες τομάτες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Για την καταπολέμηση της *Sporobolera* spp. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 25-30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Για την καταπολέμηση της *Tuta absoluta****. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών προσβολής και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού (μάς 25 κ.εκ./στρέμμα) και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2 με μεσοστάθια εφαρμογών 10 ημερών.

Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι και Φρούδια (θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του θρίπτα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 1-2 θρίπτες (1-2 στη φρούδια) (κινήσεις μορφής / άδους και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες (στο αγγούρι 7-10 ημέρες). **Δόση:** 20-25 κ.εκ./σχεδιασμού 100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-150 λίτρα/στρέμμα για την Τομάτα και 50-100 λίτρα/στρέμμα για την Πιπεριά, την Μελιτζάνα, το Αγγούρι και τη Φρούδια. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Φρούδια (θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii* (Χρήσις ήσσονος σημασίας). Ψεκάσιμο φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Πιπεριά (θερμοκηπίου-Υπαίθριου): Για την καταπολέμηση του Φυλλορύχτη *Liriomyza* spp. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 50-75 κ.εκ./100 λίτρα νερού (βερικοκιά) και 50 κ.εκ./100 λίτρα νερού (υπαίθριου). Ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα για τις πιπεριές θερμικού και 50-60 λίτρα/στρέμμα για υπαίθριες πιπεριές. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Βαμβάκι: Για την καταπολέμηση του πράσινου ακαυλού *Heliothis virescens*. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες. **Δόση:** 15-20 κ.εκ./στρέμμα και ψεκαστικό υγρό 50-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Πατάτα: Για την καταπολέμηση του δορυφόρου *Leptotarsus decemlineatus*. Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 5 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Φιστικιά (Χρήσις ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Φιστικιάς *Agronosca* spp.: Ψεκάσιμο καλύψεως με την εμφάνιση των ψυφιών στα φύλλα και επανόληση 14-21 ημέρες μετά. **Δόση:** 30 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Σπανιά (Χρήσις ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του κοινού θρίπτα *Thrips tabaci* και του θρίπτα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Ψεκάσιμο καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων ενήλικων και επανόληση, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Ρόκα, Σαλάτα θερμικού γαλλική (Lactuca sativa var. Capitata) (Χρήσις ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του θρίπτα της Καλιφόρνιας *Frankliniella occidentalis*. Ψεκάσιμο καλύψεως με την εμφάνιση των πρώτων κινήτων μορφών. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

Φουνικοειδή (Χρήσις ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Paysandisia archon*. Εφαρμογή στο μέγιστο των πτήσεων του εντόμου και πριν την εγκατάσταση της προσβολής. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες ή όταν συνεχίζονται συλλήψεις του εντόμου. Ο ψεκασμός πρέπει να κατευθύνεται στη στεφάνοκαρπιαία τμήμα του κορμού (0,5 έως 1 μέτρο από την κορυφαία περιοχή), που είναι η προτιμώμενη περιοχή αναπαραγωγής του θηλυκού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο. **Δόση:** 75 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Σμέουρο (Θ), Βατόμουρο (Θ), Μούρταλο (Θ) (Χρήσις ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση του εντόμου *Drosophila suzukii*. Ψεκάσιμο φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες. **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 50-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Μαρούλι (ΥΘ) (Χρήσις ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση Προνυμφών Λεπιδόπτερων (*Heliothis virescens*). Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 2.

Αντιό (ΥΘ), Παντζήρα (Φυλλώμα) (ΥΘ) (Χρήσις ήσσονος σημασίας): Για την καταπολέμηση Προνυμφών Λεπιδόπτερων (*Heliothis virescens*). Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες. **Δόση:** 20-25 κ.εκ./100 λίτρα νερού και ψεκαστικό υγρό 40-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: 3.

- Παρατηρήσεις:**
- * Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.
 - ** Συνιστάται συνδυασμός με παραρνητικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./λίτρη στην αγκυλιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pyg.* για αύξηση της αποτελεσματικότητας.
 - *** Στην τομάτα, αγγούρι και θερμική τομάτα, για την αντιμετώπιση του φυλλορύχτη, το LASER 480 SC μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./σχεδιασμού/λίτρη σε συνδυασμό με παραρνητικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./λίτρη.
 - **** Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με παραρνητικό λάδι (20-25 κ.εκ./λίτρη LASER 480 SC + 250-300 κ.εκ./λίτρη παραρνητικό λάδι).
 - ***** Να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσιες ψυχρόφιλες σημασίες από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες είναι οι κάτοχοι της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

Τρόπος δράσης: Το spinosad είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με προληπτική και θεραπευτική δράση. Όταν αντιμετωπίζονται εντόμων των τριών *Leptotarsus*, *Drosophila*, *Sporobolera*, *Thysanoptera* και κάποια *Coleoptera* σε διάφορες καλλιέργειες. Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης και προκαλεί παραλυτική ανεπάρκειά τους, εξαιτίας της οποίας τα έντομα παύουν να κινηθούν και να τρέφονται. Η παραλυσία είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των εντόμων επιβεβαιώνεται μέσα σε 3 ημέρες.

- Διαχείριση ανθεκτικότητας:**
- Εφαρμογή μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων σε χαμηλά επίπεδα.
 - Επιβεβαιώστε με LASER 480 SC χωρίς, όσον ο πληθυσμός των εντόμων-στόχων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
 - Πλύνετε καλά την ψύλη (φύλλα, κάρπια) με το ψεκαστικό υγρό.
 - Εφαρμόστε την εγκεκριμένη δόση και όχι μικρότερη.
 - Έως δύο (2) εφαρμογές ανά γενιά του κάθε εντόμου-στόχου και εναλλαγή για την επόμενη γενιά με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες χρήσεις όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.

Τελευταία επέμβαση την τη συσκευασία:

- Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδάκινά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Πατάτα, Σμέουρο, Βατόμουρο, Μούρταλο, Φιστικιά: 7 ημέρες.
- Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της Ψύλλας), Αμπέλι: 14 ημέρες.
- Φρούδια: 1 ημέρα.
- Τομάτα, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σπανιά, Ρόκα, Σαλάτα θερμική, Μαρούλι, Αντιό, Παντζήρα (Φυλλώμα): 3 ημέρες.
- Βαμβάκι: 21 ημέρες.
- Φουνικοειδή:-