



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Γάσπαρη

Τηλέφωνο : 210 – 9287250

E-mail : mgaspari@minagric.gr

Αθήνα, 28-11-2022

Αριθ. Πρωτ.: 11834/348348

Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
(δια της εταιρείας
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι)
e-mail: kdimizas@elanco.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14025 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LASER (δ.ο. spinosad) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

γ) του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1406 της Επιτροπής της 3^{ης} Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες methoxyfenozide, proroxur, **spinosad** και thiram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).

5. Τη με αριθ. πρωτ. 118687/13-5-2008 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14025 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LASER 480 SC (δ.ο. spinosad), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τη με αριθ. πρωτ. 10826/320563/26-10-2022 αίτηση και τα από 11834/348348/18-11-2022 συμπληρωματικά στοιχεία (παράβολο) της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Τροποποιούμε τη με αριθ. 14025 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LASER 480 SC (δ.ο. spinosad), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 118687/13-5-2008 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την

τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων.
 Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος*		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ)		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά ΜΑΒSD Αχλαδιά ΡΥUCO	Καρπόκαφα των μήλων <i>Cydia pomonella</i> CARPPO Νάρκη των γιγαρτοκάρπων <i>Lithocolletis blancardella</i> LITHBL)	20-30	100-125	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.	3
Αχλαδιά** ΡΥUCO	Ψύλλα της αχλαδιάς <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPI	30-35	100-125		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά PRNPS Βερυκοκιά PRNAR	Βλαστορύκτης της ροδακινιάς <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	20	100	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.	3
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά PRNPS Βερυκοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσινιά PRNCE ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες	2

Αμπέλι VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	10-15	40-120	Η εφαρμογή , στην 2 ^η και στην 3 ^η γενιά, μπορεί να γίνει είτε στο μέγιστο των πτήσεων ή στην έναρξη των πτήσεων του εντόμου και επαναλαμβάνεται μετά 7-10 ημέρες και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.	4
	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται στην έναρξη (10-20%) της ανθοφορίας και όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά τσαμπί και επαναλαμβάνεται μετά 7-10 ημέρες.	
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	40-80	Ψεκασμοί φυλλώματος. Σε περίπτωση που υπάρχει, να ακολουθείται το σύστημα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Επανάληψη μετά από 7- 14 ημέρες.	3

Τομάτα (Υ)*** (LYPES)	<u>Φυλλορύκτης</u> <i>Liriomyza sp.</i> LIRISP	50	50-60	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	3
	<i>Tuta absoluta</i> GNORAB****	20-25	50-100		
	<i>Spodoptera sp.</i> SPODSP	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	
Τομάτα (Θ)*** (LYPES)	<u>Φυλλορύκτης</u> <i>Liriomyza sp.</i> LIRISP	50-75	50-150	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	3
	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-150	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	
	<i>Spodoptera sp.</i> SPODSP	25-30	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.	
	<i>Tuta absoluta</i> GNORAB****	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	2

Πιπεριά (Θ) CPSAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	3
Αγγούρι (Θ) CUMSA	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.	3
Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται με την παρουσία 2 θριπών (κινητών μορφών) / άνθος και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	3
Φράουλα (Θ) FRAAN	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	20-25	50-100	Η εφαρμογή γίνεται όταν υπάρχουν 1-2 θρίπες (κινητές μορφές) ανά άνθος και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	3
Φράουλα (Θ) FRAAN ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.	3
Βαμβάκι GOSHI	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	15-20 (κ.εκ/στρ)	50-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 10 ημέρες.	3
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	5	100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.	3

Φιστικιά PIAVE ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	Ψύλλα της φιστικιάς <i>Agonoscena</i> sp. AGONSP	30	100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα. Μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες. Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.	3
Σπανάκι (Υ) SPQOL ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων ενηλίκων και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.	3
Ρόκα (Υ) ERUVE ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	Θρίπας της Καλιφόρνιας <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> FRANOC	20-25	40-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών.	3
Φοινικοειδή PALF ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Paysandisia</i> <i>archon</i> PAYSAR	75	40-100	Εφαρμογή στο μέγιστο των πτήσεων του εντόμου και πριν την εγκατάσταση της προσβολής. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες εφ' όσον συνεχίζονται συλλήψεις του εντόμου. Ο ψεκασμός πρέπει να κατευθύνεται στη στεφάνη / κορυφαίο τμήμα του κορμού (0,50 έως 1 μέτρο από την κορυφαία περιοχή), που είναι η προτιμώμενη περιοχή αναπαραγωγής του θηλυκού και όχι σε ολόκληρο το δένδρο.	2
Μικροί καρποί (Θ) Βατόμουρο RUBG Σμέουρο RUBID Μύρτιλλο VACG ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	20	50-100	Ψεκασμοί φυλλώματος. Επανάληψη μετά από 7- 14 ημέρες.	2

Μαρούλι ² (Υ) LACSA ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	Προνύμφες Λεπιδόπτερων <i>Heliothis armigera</i> HELIAR	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες	2
Παντζάρι (Υ) (Φύλλωμα) BEAVX ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	Προνύμφες Λεπιδόπτερων <i>Heliothis armigera</i> HELIAR <i>Sprodoptera</i> sp. SPODSP	20-25	40-80	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.	3
Γλυκοπατάτα IPOBA ¹ Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Durponchelia</i> <i>fovealis</i> DUPOFO	5	100	Η εφαρμογή γίνεται με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών και επαναλαμβάνεται, αν χρειάζεται, μετά από 7-10 ημέρες.	3

Παρατηρήσεις:

* Η δόση είναι ανάλογη της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

** Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι στη δόση 250 κ.εκ./hl στην αχλαδιά για αντιμετώπιση της ψύλλας *Psylla pygi*, για αύξηση της αποτελεσματικότητας.

*** Στην τομάτα, αγγούρι και θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φυλλορύκτη, το LASER 480 SC μπορεί να εφαρμοστεί στη δόση 35-50 κ.εκ./ σκευάσματος/hl σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι στη δόση 300 κ.εκ./hl. Επανάληψη εφαρμογής εφόσον βρέξει μέσα σε 4 ώρες.

**** Μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με παραφινικό λάδι (20-25 κ.εκ./hl LASER 480 SC + 250- 300 κ.εκ./hl παραφινικό λάδι).

****Να γίνεται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόμου.

¹«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

²Η χρήση στην καλλιέργεια του μαρουλιού αναφέρεται στις ακόλουθες δευτερεύουσες χρήσεις: Κατσαρά μαρούλια, Μαρούλια σαλάτες, Κεφαλωτά μαρούλια, Κοινά μαρούλια.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες/ (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηλιά (0140040), Κερασιά (0140020), Βυσσιλιά (0140020), Πατάτα (0211000), Σμέουρο (0153030), Βατόμουρο (0153010), Μύρτιλλο (0154010), Φιστικιά (0120100) Γλυκοπατάτα (0212020)	7
Αχλαδιά (0130020),	7
Αχλαδιά (εφαρμογές για καταπολέμηση της Ψύλλας) (0130020)	14
Αμπέλι (0151010, 0151020)	14
Φράουλα (0152000)	1
Τομάτα (0231010), Αγγούρι (0232010), Μελιτζάνα (0231030), Πιπεριά (0231020), Σπανάκι (0252010), Ρόκα (0251060), Μαρούλι (0251020), Παντζάρι (Φύλλωμα) (0252030)	3
Βαμβάκι (0401090)	21
Φοινικοειδή	---

B Το σημείο II της με αριθ. 6095/172728/24-10-2022 απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως :

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίησης του φάσματος δράσης.

Γ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 118687/13-5-2008 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ