

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοιόμορφο ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων με 10-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, ανάλογα την καλλιέργεια και πίεση ψεκαστικού έως 2 ατμόσφαιρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση σκευάσματος αναδεδειγμένες συνήσεις. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναμειγνύοντας την ανασύσταση. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Μη μολύνετε λίμνες, κανάλια και γενικότερα υδάτινους πόρους, με το σκεύασμα ή τις χρησιμοποιούμενες συσκευασίες του. Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης αναπομπένται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάζετε το ψεκαστικό μηχανήμα τελείως. Καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος με καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του ψεκαστήρα με καθαρό νερό το οποίο θα περάσετε και από τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10 της χωρητικότητας του ψεκαστήρα σε νερό. Αδειάστε και πάλι το ψεκαστήρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία προσθέτοντας ένα κατάλληλο για το σκοπό αυτό απορρυπαντικό αφού γεμίσετε κατά το ήμισυ το δοχείο με νερό. Αναεüστε και περάστε το διάλυμα από τους σωλήνες και τα ακροφύσια. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού και αφήστε το μίγμα νερού και απορρυπαντικού να σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον αναδεδειγμένες συνήσεις. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται ξεχωριστά με απορρυπαντικό και καθαρό νερό. Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό περάστε το νερό με πίεση από σωλήνες και ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Μην ψεκάζετε τα απόβρα σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε χώματα που προορίζονται για τη σπορά ευαίσθητης καλλιέργειας.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε στην επιφάνεια της φιάλης

Περιεχόμενο: 75 γρ.

*™ Trademark of the Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow



**Clopyralid 72 % β/β
(κλοπυραλίντ)**

A.A.D.A.: 70018/ 28.1.2013

Εγγυημένη σύνθεση:

clopyralid monoethanolamine: 94,9% β/β

(clopyralid ισοδύναμο οξύ): 72 % (β/β)

Βοηθητικές ουσίες: 0.11 % β/β

Υδατοδιαλυτή κόκκινη (SG)

**Εκλεκτικό δισυστημικό μεταφωτρωτικό
ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων.**

ΦΥΛΑΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙΑΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΓΕΦΑΜΑΤΙΕΣ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

Γενικές πληροφορίες - Γενικές συμβουλές: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο πάθων είναι αναδεδειγμένος ή έχασε συνείδηση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το πάθων στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.33.777

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίες του.

Για να προστατέψετε τα επιγεια ύδατα να χρησιμοποιείται το σκεύασμα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια ζώνη 5 μέτρων μακριά από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια ανεκτή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλιέργρητη γη.

Κάτοχος της αδειάς: Dow AgroSciences Export S.A.S.,

371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne - Γαλλία

Υπεύθυνος τελικής διάθεσης στην αγορά

και επικουρινίας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Μεσογείων 335, 153 10 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 2106726381



ΠΡΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το LONTREL 720 SG είναι εκλεκτικό δισυστημικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων των οικογενειών Compositae & Leguminosae και οριζόντια επί των οικ. Solanaceae, Polygynaceae & Umbelliferae. Το δραστικό του συστατικό ανήκει στην Χημική Ομάδα των Pyridine Carboxylic Acids. Απορροάζεται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται δόξου μέσω των ηθμωδών στο και των ζυδικών αγγείων. Συγκεντρώνεται δε στους μερισματικούς ιστούς. Τα ζιζάνια μετά τον ψεκασμό δέχονται επιδράσεις επιδράσεις αυτών (ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ). Τα κύτταρα επιθημικών και οι αυξητικές αναπτύξεις οδηγεί στο θάνατο του ζιζανίου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

Ζαχαρότευτλα: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εκλείπηση των γαρνιτών. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη. **Εκκοφισάβη:** Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπούκιων. Εφαρμογές μόνο την Άνοιξη. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1.

Εκκοφισάβη: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των μπουμπούκιων. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Αροβόσχοι: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 2 κόμβων. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1.

Σόργο: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση 8 φύλλων. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Παντζήρα: Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Εφαρμογή το αργότερο ως την εμφάνιση των γαρνιτών. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη. **Δασικές εκτάσεις:** **Λινάρι για κλωστοϋφαντουργεία:** Δόση: 17,4 γρ./στρέμμα. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1 ανά 2 έτη.

Καλλιέργειες για αποστοματισμό: (κεράμυδι, πράσο, σπινόσατο, γογγύλη, ραπανάκι, λάχανο, παντζήρα, σέσκυλο, γαρίφαλο, κόκκινο λινάρι, σπανάκι και ρόκα): Δόση: 14 γρ./στρέμμα. Μέγ. αρ. εφαρμογών/ κάλ. περίοδο: 1.

ΖΙΖΑΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝΤΑΙ (Κιόνό όνομα/ Καταλληλότερο στάδιο καταπολέμησης):

Α. ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: **A1. ΠΟΛΥΕΤΗ:** Κίρσιος: Από 15 απ. ύψος και πριν την εμφάνιση ανθικών οργάνων. **Πικρί:** Πριν τα 6 φύλλα. **Λαβύρα:** Από 15 έως 20 cm. **Συκή:** Από 5 έως 8 φύλλα. **Μελιό:** (holcus): Ως την ανθοφορία. **Τριφύλλο:** Ως την ανθοφορία.

A2. ΕΤΗΣΙΑ: **Ανέμυδα:** Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. **Κενταύριος:** Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. **Χρυσάνθεμος:** Από 2 έως 6 φύλλα. **Ντατούρα:** Από 2 έως 6 φύλλα. **Κόνη:** Από 2 φύλλα. **Καλαμίντ:** Από 2 έως 6 φύλλα. **Συκή:** Από 1-2 φύλλα. **Συκή:** Από 2 έως 6 φύλλα. **Λυσιστά:** Πριν την άνθηση. **Χαμομήλι:** Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. **Σενέκιος:** Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας.

Ηλιάνθος: Από τα 2 φύλλα ως την εμφάνιση ροζέτας. **Αγριόβικος:** Πριν την άνθηση.

Β. ΖΙΖΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ: **Πολύγονο:** Στο 1-2 φύλλα. **Ασπρόκροκαλός:** Στο 1-2 φύλλα. **Αιθούσα:** Στο 2 έως 6 φύλλα. **Τοριλίδα:** Στο 2 έως 6 φύλλα. **Χυμολέικα:** Από το τέλος της εμφάνισής του.

ΠΑΡΑΡΤΗΣΕΙΣ:

1. Η αποτελεσματικότητα του LONTREL 720 SG δεν είναι ικανοποιητική εναντίον σε βότα, πολυήνο, οξάλιδα, μολόχα, Eriophorum spp, τσουκνίδα, κολλητόβια (Gallium spp), στέλαρια, γρηνοδόχο, και ζιζανίων των οικογενειών Cuscutaceae και Lamiales.

2. Ελαιοκράβη: Αφού οι εφαρμογές πραγματοποιούνται από το τέλος του χειμώνα ή την αρχή της άνοιξης δηλαδή 5 με 6 μήνες μετά τη σπορά της καλλιέργειας, τα ζιζάνια βρέσκονται συχνά σε στάδια ανάπτυξης πιο προχωρημένα από τα καταλληλότερα για την εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση αναπτύσσεται έντονη η προσήλωση λαδίου (με τη μορφή πρόσδετο στο ψεκαστικό μίγμα και στη δόση 0,174 kg του LONTREL 720 SG.

3. Αροβόσχοι: Μόνο το ύψος των 60-70 cm, πριν η καλλιέργεια καλύψει και νεκρώσει τα ζιζάνια.

4. Δασικές εκτάσεις: Να χρησιμοποιείται μετά τη φύτευση ή όταν τα νεοφύτα είναι πενήνη στην ηλικία του 1 έτους μετά τη σπορά. Σε κάθε περίπτωση το LONTREL 720 SG δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πριν περάσει ένας χρόνος από τη μεταφύτευση ή τη σπορά. Εκλεκτικότητα στα δασικά είδη: Το LONTREL 720 SG είναι εκλεκτικό για τα ακόλουθα δασικά είδη: Abies nordmanniana, Abies pectinata, Picea abies, Picea omorica, Pinus cembra, Pinus nigra, Pseudotsuga douglasii, Taxus baccata, Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastanum, Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus laevigata, Eucalyptus camaldulensis, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Sorbus aria, Syringa vulgaris. Για όλα τα άλλα είδη, είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε τους κατάλληλους οργανισμούς ή το τεχνικό τμήμα της Dow AgroSciences σχετικά με την εκλεκτικότητα του LONTREL 720 SG.

5. Παντζήρα: Χρησιμοποιείται σε διαδοχικές εφαρμογές με δόση 8,7 γρ/στρέμμα, με μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 7-10 ημέρες.

6. Στην περίπτωση των καλλιεργειών για αποστοματισμό: να μη χρησιμοποιείται το LONTREL 720 SG σε συνδυασμό με λαδι.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ IPM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Α.Π.: Το LONTREL 720 SG είναι πιο αποτελεσματικό όταν φεκορείται την περίοδο που τα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στα αρχικά ευαίσθητα στάδια. Στα πολυετή να εφαρμόζεται στην πλήρη άνθηση. Το LONTREL 720 SG συνιστάται να μην εφαρμόζεται σε ακαίες κλιματικές ή οργανισμικές συνθήκες (π.χ. Κρύος καιρός, ξηρασία, φυσιολογική έδραση, θερμοκρασία πάνω από 25°C, κ.λ.) Δεν ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών. Στην περίπτωση που εφαρμόσει το LONTREL 720 SG δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν αναμένεται βροχόπτωση σε μια ώρα από την ολοκλήρωση του ψεκασμού. Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν ο καιρός είναι βροχ. και επικρατούν άνεμοι. Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας σε γεωπονικές ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστάται η τήρηση απόστασης ζώνης 5 μέτρων. Για τον ενδομύ βίκο, τον αρσά και τις πατάτες δε χρειάζεται απόσταση ασφαλείας.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΥΕΤΟ- ΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Τα υποκείμενα των καλλιεργειών που έχουν ψεκαστεί με το LONTREL 720 SG να μην χρησιμοποιούνται ως λίπασμα γεωπονικών καλλιεργειών και λαχανικών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Για τις καλλιέργειες που δεν επιτρέπεται η χρήση του clopyralid, θα πρέπει να υπάρχει μια προβλεπόμενη 125 ημερών μεταξύ της εφαρμογής του σκευάσματος και της σποράς ή της φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας ή της καλλιέργειας ανακαταστάσης.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Συνιστάται να ηρηθεί μεσοδιάστημα 15 ημερών από τον ψεκασμό πριν τη βόσκηση ζώων σε καλλιέργεια φυτά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΗ (ΗΜΕΡΕΣ): Ζαχαρότευτλα: 42, Ελαιοκράβη: 56, Αροβόσχοι: 60 (για εναιώρητο), Σόργο: 42 (για εναιώρητο), Παντζήρα: Λινάρι: 42, Δασικές εκτάσεις: Καλλιέργειες για αποστοματισμό:-

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μέσα στην αρχική και απαραίτητη συσκευασία του, προστατευμένο από υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, το σκεύασμα, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.