



Lancelot™
450WG
ZIZANIOKTONO

**ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ**

Lancelot™

450WG

ZIZANIOKTONO




Περιγραφή προϊόντος

Το **Lancelot™ 450WG** είναι ένα διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατυφύλλων ζιζανίων σε χειμερινά και ανοιξιάτικα σιτηρά (σκληρό και μαλακό σιτάρι, κριθάρι). Το Lancelot™ 450WG έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων.


Ταυτότητα προϊόντος

Το **Lancelot™ 450WG** περιέχει δύο δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης: το Florasulam που ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών και το Aminopyralid που ανήκει στην ομάδα του πυριδινοκαρβοξυλικού οξέος. Χάρη στην ανοδική και καθοδική κίνησή του το Lancelot™ 450WG μεταφέρεται γρήγορα στα μεριστωματικά κύτταρα των ζιζανίων δια μέσου του ξυλώδους και ηθμώδους ιστού, καταστρέφοντας έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα τα ζιζάνια.

aminopyralid



florasulam



Τρόπος εφαρμογής



Το Lancelot™ 450WG εφαρμόζεται στη δόση των 2,5-3,3 γρ. σκ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού διαλύματος 10-40 λίτρα /στρέμμα.

- Πριν την εφαρμογή να γίνεται έλεγχος για την σωστή ρύθμιση του ψεκαστικού μηχανήματος και έλεγχος του εξοπλισμού (χρήση σωστού τύπου μπεκ, ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού).

- Κατά την εφαρμογή να γίνεται σωστός ψεκασμός και να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του χωραφιού.

Εφαρμογή στο χωράφι

Το Lancelot™ 450WG εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στα στάδια της αρχής του αδελφώματος έως και την εμφάνιση του δευτέρου κόμβου. Στα ζιζάνια εφαρμόζεται μέχρι το στάδιο των 6-8 φύλλων.



Φάσμα δράσης - Αποτελεσματικότητα

Ο συνδυασμός των δύο δραστικών ουσιών του Lancelot™ 450WG προσφέρει τη δυνατότητα στον παραγωγό να καταπολεμήσει μια σειρά από σημαντικά ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες από 5-25°C
- Βροχόπτωση μία ώρα μετά την εφαρμογή δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του

Παρατηρήσεις: Η προσθήκη επιφανειοδραστικού παράγοντα αυξάνει την αποτελεσματικότητα εναντίον των ζιζανίων πολυκόμμι (*Polygonum aviculare*), καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*) και βερόνικα (*Veronica haederifolia*).



παπαρούνα



στελλάρια



κολλητσίδα



καψέλλα



σινάπι



κίρσιο

Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Ανθεμίδα	<i>Anthemis arvensis</i>
Αναρριχώμενο πολύγωνο	<i>Bilderdykia convolvulus</i>
Καψέλλα	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Κίρσιο	<i>Cirsium arvense</i>
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα	<i>Gallium aparine</i>
Παπαρούνα	<i>Papaver rhoeas</i>
Ραπανίδα	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Άγριο σινάπι	<i>Sinapis arvensis</i>
Στελλάρια	<i>Stellaria media</i>
Άγριομαργαρίτα	<i>Chrysanthemum segetum</i>
Καπνόχορτο	<i>Fumaria officinalis</i>
Χαμομήλι	<i>Matricaria chamomilla</i>
Πολυκόμμι	<i>Polygonum aviculare</i>

Χρονικά Διαστήματα Ασφάλειας

Οι καλλιέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν την εφαρμογή του LANCELOT 450WG είναι:

- Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς (τουλάχιστον 3 μήνες μετά την εφαρμογή): Χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, Τριτικάλε, βρώμη), χειμερινή ελαιοκράμβη, λειμώνες.
- Τουλάχιστον 11 μήνες μετά τον ψεκασμό στενόφυλλες καλλιέργειες, ανοιξιάτικα σιτηρά, ανοιξιάτικη ελαιοκράμβη, ηλιανθος, πατάτα, ζαχαρότευτλα κρεμμύδι, καρότα, μηδική, λινάρι, ραδίκι κλπ.
- Τουλάχιστον 14 μήνες μετά τον ψεκασμό: Σόγια, Φασόλια, Αρακάς, Ψυχανθή, Ρεβίθια, Καπνός.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.



- Εξαιρετική καταπολέμηση σημαντικών και δυσκολοεξόντωτων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι
- Ταυτόχρονη ύπαρξη δύο διαφορετικών δραστικών ουσιών - ισχυρό όπλο στη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας
- Μεγάλο εύρος εφαρμογής, με αποτέλεσμα ο ψεκασμός να γίνεται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας
- Μικρή δόση εφαρμογής ανά στρέμμα



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 70245/8-9-2017

TM® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της. © 2022 Corteva



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 213 006 5000 | ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

