

SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID :

97031253 1903

Trade Name :

LOYANT 25 EC

Country :

GREECE

Size :

275X127MM

Artwork Type :

3 L LABEL - FLAT

Specification :

EU413 PAGO

Standardisation Level :

6

Printer :

EMEA - PAGO

Packing Location :

EMEA - DRUSENHEIM (F006/F469)

Ticket No :

102048751/401354913 0380

Date :

15-APR-19

Proof Cycle No :

3

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Cyan

Magenta

Yellow

Black

EU 413
PAGO

275mm

No other Barcode to
be placed on top of the
label Barcode

127mm

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μαζέψτε τη γυμνή ποσότητα διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπασε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. **Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
Για την προστασία των υδράβιων οργανισμών να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη **5 μέτρων**, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (90%), από τα επιφανειακά ύδατα. **10 μέτρων**, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (75%), από τα επιφανειακά ύδατα, **20 μέτρων**, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (50%), από τα επιφανειακά ύδατα.
Για την προστασία των φυτών μη-στόχων να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη **5 μέτρων**, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (75%), από μη γεωργική γη, **10 μέτρων**, με χρήση ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους (50%), από μη γεωργική γη.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το LOYANT 25 EC μπορεί να εφαρμοστεί προσπαρτικά και μεταφυτρωτικά στα ζιζάνια και στην καλλιέργεια του ρυζιού με τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού της όγκου. Αναδεύστε το νερό ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Γεμίστε τη δεξαμενή έως τη μέση με καθαρό νερό και προσθέστε απορρυπαντικό. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10-20 λεπτά και αδειάστε ξανά τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αφαιρέστε και καθαρίστε ξεχωριστά όλα τα μέρη του ψεκαστικού εξοπλισμού. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού όγκου της δεξαμενής. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαμενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή χρησιμοποιώντας τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Καθαρίστε σχολαστικά τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού εξοπλισμού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ρυζι: 60 ημέρες

Dow AgroSciences

Loyant® 25 EC

ZIZANIOK TONO

Rinskor™ active (Pivaskop)

Εγγυημένη σύνθεση: Floryprauxifen-benzyl: 2.5 % β/ο (Rinskor™ active)
Βοηθ. ουσίες: 97,1 % β/β

Γαλακτωματοποίησημο συμπύκνωμα (EC)

Διασυστηματικό προσπαρτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού

Περιέχει Floryprauxifen Benzyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση



ΠΡΟ



Περιεχόμενο:?

A.A.Δ.Α.: 70327/15.04.2019 έως 13.08.2019

Κάτοχος της άδειας:
DOW AGROSCIENCES EXPORT SAS
6 rue Jean-Pierre Timbaud, Building Le Campus,
78180 Montigny le Bretonneux, Παρίσι, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι
Τ.Κ.152 31 Τηλ.: 2130065070



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το LOYANT 25 EC είναι διασυστηματικό προσπαρτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών, κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού. Η δραστική ουσία του LOYANT 25 EC, Rinskor™ active, ανήκει στις συνθετικές Αυζίνες και κατατάσσεται στην ομάδα των Aryloisolinates (HRAC group O). Το Rinskor™ active, ως συνθετική αυζίνη, μιμείται την αυξητική ορμόνη των ζιζανίων, προκαλεί υπερβολική διέγερση και αυξημένο μεταβολισμό, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της φυσιολογικής ανάπτυξης των ζιζανίων. **Η διαφοροποίηση του σε σχέση με τις άλλες συνθετικές Αυζίνες είναι ότι «προσδένεται» κυρίως στον υποδοχέα AFB5.**

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΡΥΖΙ:

Α. ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΑ: Για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων*, κυπεροειδών** και μουχρίτσας. Από το στάδιο των 2 φύλλων έως και τη διάκλαση του κολεού του φύλλου σημείας: **Δόση:** 120 κ.εκ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 15-40 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2/9.

Β. ΠΡΟΣΠΑΡΤΙΚΑ: Για την αντιμετώπιση της μουχρίτσας και πλατύφυλλων ζιζανίων (ετερανθήρα) προσπαρτικά της καλλιέργειας στα ζιζάνια που έχουν φυτρώσει: **Δόση:** 120 κ.εκ. σκ./στρέμμα. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 15-40 λίτρα/στρέμμα. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2/9.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Πλατύφυλλα ζιζάνια*: Άλσισμα, Αμάνια, Είδη του γένους *Bidens* spp., Βούτομα, Ετερανθήρα, Λιντέρνια, Μουρντάνια, Κυπεροειδή**: Σκίρπος, Μοσχόκυπρη.

Παρατηρήσεις: *Σε προγράμματα ζιζανιοκτονίας, το LOYANT 25 EC μπορεί να χρησιμοποιηθεί δύο φορές ανά καλλιερητική περίοδο είτε ως μία εφαρμογή προσπαρτικά και μία μεταφυτρωτικά είτε ως δύο εφαρμογές μεταφυτρωτικά. *Στο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το LOYANT 25 EC ή άλλα προϊόντα που περιέχουν floryprauxifen-benzyl, με ελάχιστο μεσοδιάστημα εφαρμογών 9 ημέρες. *Μετά την πρώτη εφαρμογή το νερό πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για 7 μέρες μέσα στο τηγάνι. *Λόγω της παραλλακτικότητας των ειδών και βιοτύπων Μουχρίτσας, συστήνονται 2 εφαρμογές ανά έτος για την αντιμετώπιση τους. *Το σκεύασμα να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και σε στάδιο ανάπτυξης τους. *Σε περίπτωση βροχής, η αποτελεσματικότητά του σκευάσματος δεν επηρεάζεται αν περάσει 1 ώρα από την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Διαχείριση για τη μείωση πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το LOYANT 25 EC συστήνεται να εναλλάσσεται με ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ζιζανίων (όχι διαδοχικές εφαρμογές).

Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ημέρες με ανέμους, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Δεν απαιτείται εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται με την ορθή γεωργική πρακτική. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας να τηρηθεί χρονικό περιθώριο ασφαλείας 1 μηνός μέχρι την σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιέργειας. **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ:** Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το LOYANT 25 EC δεν είναι φυτοτοξικό για την καλλιέργεια του ρυζιού όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην επίστα. Όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό συνθήκες πίεσης (καιρικές συνθήκες, εντομολογικές ή άλλες προσβολές κλπ), μπορεί να παρατηρηθούν χλωρωτικά φαινόμενα ή συστροφή των φύλλων σε διάστημα από 1 έως 4 εβδομάδες από την εφαρμογή, τα οποία είναι προσωρινά, και δεν επηρεάζουν την τελική απόδοση. Αν και το σκεύασμα δεν είναι πτητικό συστήνεται να τηρούνται οι παρακάτω αποστάσεις από άλλες καλλιέργειες: **1 μέτρο** από καλλιέργεια μηλιάς, **3 μέτρα** από αραβόσπο και ροδακινιά, **5 μέτρα** από μηδική, ηλιάνθο και βαμβάκι, **15 μέτρα** από σόγια και πεπόνι, **>15μέτρα** για ταμάτα, αμπέλι.

