

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανισθεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. *Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια και κατάλληλες μπόιες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό*.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.



Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής: Βλέπε φυλλά
Ημ/ία λήξης:

9512108

Παρατηρήσεις: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MOST MICRO 365 CS. Προετοιμάστε καλή σποροκλήνη, επίπεδη, ψιλοχωματισμένη και αρκετά συμπαγή. Πότιστε εάν δεν βρέξει μέσα σε 7-10 ημέρες από την εφαρμογή ώστε να ενοσωματωθεί το φάρμακο στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους. Σπείρετε τις καλλιέργειες σε ομοιόμορφο βάθος σποράς τουλάχιστον 3 εκ. για τα καρώτα και τα κρεμμύδια και 4 εκ. για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, έτσι ώστε να μην ξεσκεπάζονται ή μένουν σπόροι στην επιφάνεια. Στις μεταφτευμένες καλλιέργειες (τομάτα, πιπεριά και καπνό) εφαρμόστε το MOST MICRO 365 CS σε καλά ψιλοχωματισμένο έδαφος τουλάχιστον 7-8 ημέρες πριν την μεταφύτευση. Ενωσωμάτωσε με ελαφρό πότισμα το οποίο πρέπει να επαναληφθεί μετά την μεταφύτευση. Σε καμιά περίπτωση μη κάνετε “γέμισμα” (τράβηγμα χώματος στην ρίζα) πριν περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες από την εφαρμογή. Στις μεταφυτευτικές εφαρμογές, τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα–κοτυληδόνες). Μετά την εφαρμογή, πλύνετε καλά το ψεκαστικό και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που επιβάλλεται επανασπορά σε ψεκασμένο έδαφος, αποφύγετε την επαφή του νέου σπόρου με το φάρμακο, σπέρνοντας σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς την μετακίνηση του επιφανειακού εδάφους ή οργώνοντας σε βάθος τουλάχιστον 20 εκ. το οποίο είναι απαραίτητο εάν η αρχική καλλιέργεια αντικατασταθεί με ζαχαρότευτλο. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφρά έδαφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και μικρούς πληθυσμούς ζιζανίων, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά έδαφη - μέσης έως υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερους πληθυσμούς ζιζανίων. Προτεινόμενα είδη καλλωπιστικών φυτών: Τούγια (*Thuja occidentalis*), είδη *Prunus* sp., Κουμπρεσκοκύταρις (*Cyprinoscypris leylandii*), Βιβούρνο (*Viburnum* sp.), Κράταγος (*Crataegus* sp.), Ήμερο πουνράρι (*Ilex* sp.), Πασχάλια (*Syringa vulgaris*), Μανόλια (*Magnolia grandiflora*), Δρυς (*Quercus* sp.), Φοίνικας (*Phoenix* sp.), Πεύκο (*Pinus* sp.), Λεύκα (*Populus alba*), Πλάτανος (*Platanus occidentalis*), Ιτιά κλαύουσα

(*Salix babylonica*), Καρυδιά (*Juglans nigra*), Ροδόδεντρο (*Rhododendron* sp.), Πυξός (*Buxus* sp.), Καμέλια (*Camellia japonica*), Γαρδένια (*Gardenia jasminoides*), Κυδωνίαστρο (*Cotoneaster* sp.), Κυπαρίσις (*Cupressus sempervirens*), Ευώνυμο (*Eunonymus japonicus*), Πυράκανθα (*Pyracantha coccinea*), Φορσύθια (*Forsythia intermedia*), Ίβικός (*Hibiscus syriacus*), Άρκευθος (*Juniperus* sp.), Λεβάντα (*Lavandula angustifolia*), Αγγελική (*Pittosporum tobira*), Μυρτιά (*Myrtus communis*), Πικροδάφνη (*Nerium oleander*), Χαμαίριπας (*Chamaerops* sp.), Φωτίνια (*Photinia* sp.), Λιγούστρο (*Ligustrum* sp.), Δάφνη Απόλωνος (*Laurus nobilis*), Γιούκα (*Yucca* sp.), Κισσός (*Hedera helix*), Πελαργόνιο (*Pelargonium* sp.), Γιασεμί (*Jasminum* sp.), Μυσόπορο (*Myororum parviflorum*), Σπαράγγι (*Asparagus officinalis*), Φρέζια (*Freesia* sp.), Λίλιουμ (*Lilium* sp.), Πασιάνια (*Paeonia* sp.), Γλυστίνια (*Wisteria* sp.), Αμμοφίλη sp.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μεθοδοί αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευμένης καλλιέργειας: 1) Σόγια, βαμβάκι, μπιζέλι, σκόρδο, ηλιάνθος και μεταφτευόμενες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν οποτεδήποτε μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS, αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ). 2) Πατάτα μπορεί να φυτευτεί 3 μήνες μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: 1) Άλλες καλλιέργειες μπορούν να σπαρθούν/φυτευτούν 6 μήνες μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ). 2) Ζαχαρότευτλα μπορούν να σπαρθούν 10 μήνες μετά την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS αφού προηγηθεί βαθιά άρση (15-20 εκ).

MOST MICRO 365 CS

Pendimethalin (πεντιμεθαλίν)
Εναώρημα μικροκαψυλίων (CS)

Εγγυημένη σύνθεση: Pendimethalin: 36,5% β/ο
βοηθητικές ουσίες: 64,02% β/β

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων



Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκίαση.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: **1 λίτρο**



Διανομή:
ΕΛΑΝΟΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 6726381

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της μίτωσης με παρεμπόδιση του σχηματισμού των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής αράκτου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Εποξηριόεδη (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων.

Ακρόδρυς (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Μηλεοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Πυρηνόκαρπα** (Ροβανιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά): Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης το χειμώνα (πριν την έναρξη της βλάστησης). **Αμπέλι:** Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης, το χειμώνα (κατά το λήθαργο, πριν την έναρξη της βλάστησης). **Καρτό:** Δόση 200-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Κρεμμύδι, Σκόρδο:** Δόση 100-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας (στο στάδιο των 2-3 φύλλων). **Τομάτα, Πιπεριά:** Δόση 125-220 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Μορούλι:** Δόση 150-200 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Αρακάς:** Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Φασολόκια νωπά:** Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Όσπρια** (Φασόλι): Δόση 170-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Ηλιάνθος:** Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Σόγια:** Δόση 200-250 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Βαμβάκι:** Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Πατάτα:** Δόση 170-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Στάρι:** Δόση 170-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Αραβόσπας:** Δόση 200-300 κ.εκ.σκ./στρ. Προφυτρωτικά της καλλιέργειας. **Καννός:** Δόση 125-300 κ.εκ.σκ./στρ. Πριν τη μεταφύτευση. **Καλλωπιστικά:** Δόση 250-300 κ.εκ.σκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης μετά τη μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστημένες φυτείες.

Στόχος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο στόχος είναι: **Ετήσια ζιζάνια*** (αγρωστώδη και πλατύφυλλα). **Όγκος ψεκαστικού δ/τος:** Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο όγκος του ψεκαστικού δ/τος είναι: 20-40 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος: Για όλες τις καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδος είναι: **1**

*** Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:** *Alopecurus myosuroides* (αλεπονούρα), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Panicum dichotomiflorum* (ιδνικό διχοτομικό), *Setaria viridis* (σετάρια πράσινη), *Setaria verticillata* (σετάρια σποιδωλιτή), *Poa annua* (κοινή πόα).

*** Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:** *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Amaranthus blitoides* (πλαγιστό βλήτο), *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Capsella bursa-pastoris* (καφέλλα), *Cardamine hirsuta* (καρδάκια), *Chenopodium album* (λουβουδιό), *Euphorbia* spp. (γαλατσίδες), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Polygonum aviculare* (πολυκύμψ), *Polygonum lapathifolium* (λαπάτσα), *Bilderdia convolvulus* (αναρχώμενο πολύονο), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), *Solanum nigrum* (αγριοντομάτι ή σύφωνος), *Sonchus oleraceus* (ωχός), *Stachys annua* (στάχυς), *Stellaria media* (στελλάριον), *Urtica urens* (μικρή τσουνίδα), *Veronica hederifolia*, *Veronica persica* (βερνίκια), *Viola arvensis* (κούνες αγριοπανώδε).

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός εδάφους προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά. Χρησιμοποιείτε μικτού τύπου σκούπας ή ψεκαστή με πίεση ψεκαστικού μικρότερη από 3 – 4 ατμόσφαιρες (45-60 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Παρατηρήσεις: Το MOST MICRO 365 CS είναι ασφαλές κατά την εφαρμογή του γύρω και κάτω από πολλά είδη καλλωπιστικών (φυτά, θάμνοι, δέντρα). Ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί η εκλεκτικότητα του σε όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια. Ανεπιθύμητες επιπτώσεις, όπως η φυτοτοξικότητα, μπορεί να προκύψει εξαιτίας διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών, συνθηκών ανάπτυξης ή από τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου. Επομένως, συστήνεται, πριν τη γενικευμένη χρήση του, η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών και η εξέτασή τους 1-2 μήνες μετά για πιθανή φυτοτοξικότητα. Μην κάνετε καθολικούς ψεκασμούς σε φυτώρια ή σε φυτά προς μεταφύτευση. Μην εφαρμόζετε το MOST MICRO 365 CS σε καλλωπιστικά φυτά που έχουν εμβολιαστεί ή είναι σε έντονη βλαστητική ανάπτυξη ή κατά την ανθοφορία. Μην εφαρμόζετε το MOST MICRO 365 CS σε φυτά κατά την έναρξη της ανθοφορίας ή την πρώτη βλαστητική ανάπτυξη. Μην επιτρέψετε τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού να πέσουν πάνω στο φύλλωμα, τους οφθαλμούς ή τα όψη. Φροντίστε ώστε το έδαφος να μην έχει ακαθαρσίες ή ρωγμές που ενδεχόμενα θα επιτρέψουν την επαφή του MOST MICRO 365 CS με το ριζικό σύστημα των καλλωπιστικών φυτών. Όταν το ριζικό σύστημα έχει εγκατασταθεί καλά, κάνετε την εφαρμογή του MOST MICRO 365 CS πριν τον εμβολιασμό ή την άνθιση των φυτών. Σε περίπτωση που κάποια είδη καλλωπιστικών παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα, μην τα φυτεύετε σε έδαφος στο οποίο έχει εφαρμοστεί MOST MICRO 365 CS κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Για φυτά που μεταφυτεύονται γυμνόριζα, μην εφαρμόζετε το MOST MICRO 365 CS πριν περάσουν 2-4 εβδομάδες από τη μεταφύτευση στην οριστική τους θέση.