

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθόντας είναι αναισθητός ή έχει σπασμούς. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να σπαρθούν άμεσα μόνο ανοιζάτικο κριθάρι, ανοιζάτικο σιτάρι, ανοιζάτικο βρώμη, αραβόσιτος ή σίκαλη.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 15 ημέρες

Ειδικές συνθήκες, γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Για την αποφυγή ζημιών σε γεπονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30°C.
- Προσοχή στο θεριζοαλωνισμό υπό συνθήκες αυξημένης υγρασίας.
- Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμυδρή εδάφη και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό πριν τον ψεκασμό. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Το ψεκαστικό να μη στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Puma Super 50 EW, Topik και Assert σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας τους.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, σε κανονικές θερμοκρασίες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Ημ/νία παρασκευής / Αρ. παρτίδας: βλέπε φιάλη



0219



Florasulam 0,625 % β/ο + 2,4 D ester 45,25 % β/ο
(φλορασουλάμ + 2,4 D εστέρας)

Εναιώρημα σε γαλάκτωμα

Εγγυημένη σύνθεση:
florasulam: 0,625% β/ο
2,4D ethyl-hexyl-ester: 45,25% β/ο (30% β/ο ισοδύναμο οξύ)
βοηθητικές ουσίες: 54,57 % β/β

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος έγκρισης – Υπεύθυνος τελικής συσκευασίας και σήμανσης: Αριθμός Άδειας Διάθεσης: 6777/21-11-2006
Dow AgroSciences Export S.A.S.
371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560, Valbonne, Γαλλία.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Διανομέας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 335,
15231 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 2106726381

*™ Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow



Περιεχόμενο:
2 λίτρα

Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο. Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδίων-σουλφονιδίων. Αναστέλλει τη δράση του ένζυμου οξεικογλακτική συνθετάση (acetolactate synthase-ALS). Το 2,4 D ανήκει στην ομάδα των φαινοξυαλκανοϊκών οξέων. Συσσωρεύεται κυρίως στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών στους οποίους και δρα.

Φάσμα δράσης
(πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις σκευάσματος, όγκος ψεκαστικού υγρού, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ. περίοδο):

Σιτάρι, κριθάρι: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων* με δόση 60-80 κ.εκ./ στρέμμα, ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/ στρέμμα. Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος του σταριού έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.

Αραβόσιτος: Για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων** με δόση 75 κ.εκ./ στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/ στρέμμα. Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή έως το στάδιο του πρώτου κόμβου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-12 φύλλων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 ανά καλλιεργητική περίοδο.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
***Σιτάρι, κριθάρι:** Κολητσίδα (*Gallium spurium*, *G. aparine*), Παπαρούνα (*papaver rhoeas*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*), Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*), Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*), Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*), Άδωνης (*Adonis aestivalis*) και Μπιφόρα (*Bifora radians*).

****Αραβόσιτος:** Τα παραπάνω καθώς και τα: Πλαγιαστό βλήτο (*Amaranthus blitoides*), Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*), Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*), αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*) και Ασπράγκαθο (*Xanthium spinosum*).

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνθή ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν έχει εφαρμογή
Αραβόσιτος: 15 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρυπήμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

