

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύντε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
- Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Ειδικό αντίδοτο δεν υπάρχει. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

«Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του».

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην χρησιμοποιείται αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει διακυλυδραζίνες περισσότερες από 2 με 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική απараβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο.

Ημ/νία παρασκευής / Αρ. παρτίδας:
βλέπε φιάλη



021



Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:
methoxyfenozide: 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76.83% β/β

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου



Περιέχει: 1,2-benzisothiazolin-3-one.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Κάτοχος της άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106889700

A.A.Δ.A.: 14357/ 01.03.2011

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070



™® Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Το σκεύασμα είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των διακυλυδραζινών. Καταπολεμά τις προνύμφες των λεπιδοπτέρων σε τομάτες και πιπεριές θερμοκηπίου.

Το methoxyfenozide είναι ρυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων και δρά ως μιμητικό της ορμόνης έκδυσης της εκδυσόνης, στις προνύμφες των λεπιδοπτέρων. Λόγω της δέσμευσης του methoxyfenozide στη θέση-δέκτη της εκδυσόνης, προκαλείται πρόωμη και ατελής έκδυση, με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Τομάτα, Πιπεριά (θερμοκηπίου): Κατά της Σποντόπτερα (Spodoptera sp.). Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 κ.εκ/στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα / στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μεσοδιάστημα εφαρμογής: 14-21 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να γίνει καλή διαβροχή του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το ONORE 240 SC δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ): 1 ημέρα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν ONORE 240 SC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα IPM (Integrated Pest management).

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την ίδια καλλιεργητική περίοδο σε μια καλλιέργεια το ONORE πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Αποφύγετε την διαδοχική χρήση του ONORE σε καλλέργειες που έχει ήδη γίνει εφαρμογή με σκευάσματα που περιέχουν tebufenozide (MIMIC). Χρησιμοποιήστε όλες τις δυνατές καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και φυσικές και βιολογικές μεθόδους για τον έλεγχο των εχθρών (παρακολούθηση των πτήσεων των ενηλίκων και προστασία των ωφελίμων αρθροπόδων) έτσι ώστε να μειωθεί η ασκούμενη πίεση επιλογής για ανθεκτικότητα, από τις εφαρμογές εντομοκτόνων. Αποφύγετε την εφαρμογή του ONORE σε περισσότερες από 2 με 3 συνεχόμενες γενιές των εχθρών στόχων κατ' έτος. Αποφύγετε την χρήση εντομοκτόνων της ομάδας των διακυλυδραζινών για την εξάλειψη εκτεταμένης μη ελεγχόμενης προσβολής.