



Rathan™
600EC
ZIZANIOKTONO

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ**

Rathan™

600EC

ZIZANIOKTONO

Δραστική ουσία: 2,4-D οξύ: 60%β/ο (υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας (ΕΗΕ): 90,5% β/ο)
Μορφή: Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο EC

01/2022

Το **RATHAN™ 600EC** είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου.

Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Δόσεις σκευάσματος κ.εκ./στρ.	Τρόπος & χρόνος εφαρμογής
Σιτάρι Κριθάρι	50-100 κ.εκ. σκ. ανά στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και την πυκνότητα των ζιζανίων.	Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος του σιταριού έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.
Αραβόσιτος		Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή στο στάδιο των 3-6 φύλλων και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σιτάρι - κριθάρι: **60 ημ.**
Αραβόσιτος: **μη εφαρμόσιμο**



Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Ευαίσθητα	αγριοπαμπακιά (<i>Abutilon theophrasti</i>) αναγαλλίδα (<i>Anagallis arvensis</i>) τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>) μπιφόρα (<i>Bifora radians</i>) λουμποδιά (<i>Chenopodium album</i>) κίρσιο (<i>Cirsium arvense</i>) περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>) δωδεκάνθι (<i>Lamium amplexicaule</i>) κοινή παπαρούνα (<i>Papaver rhoeas</i>) ραπανίδα (<i>Raphanus raphanistrum</i>) άγριο σινάπι (<i>Sinapis arvensis</i>) αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i>)
Μετρίως ευαίσθητα	τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) μεγαλόκαρπη κολλητσιδα (<i>Galium aparine</i>) πολυκόμπι (<i>Polygonum aviculare</i>) αγριοπιπεριά (<i>Polygonum persicaria</i>) βερόνικα (<i>Veronica persica</i>)

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

- ✓ Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.
- ✓ Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30°C.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Αρ. Έγκρισης: 7943/19-1-2011

™ Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της. © 2022 Corteva

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι.
Τηλ.: 213 006 5000 | ΕΞΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

