



Εκλεκτικό διασυστηματικό
ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο
των πηλατύφυλλων ζιζανίων
σε καλλιέργεια σιταριού,
κριθαριού & αραβόσιτου



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World



Rathan® 600EC

2,4-D οξύ: 60%β/ο (υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας (EHE): 90,5% β/ο)

Υγρό γαλακτωματοποίηση EC

Το RATHAN 600 EC είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου.

Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4 D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.



Πεδίο Εφαρμογής



Σιτάρι, Κριθάρι



Αραβόσιτος

Δόσεις σκευάσματος κ.εκ./στρέμμα

50-100 κ.εκ. σκ. ανά στρέμμα ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και την πυκνότητα των ζιζανίων.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος του σιταριού έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.

Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή στο στάδιο των 3-6 φύλλων και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια



Ευαίσθητα ζιζάνια: *Abutilon theophrasti* (αγριομαμακιά), *Anagallis arvensis* (αναγαλλίδα), *Amaranthus retroflexus* (τραχύ βλήτο), *Bifora radians* (μπιφόρα), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Cirsium arvense* (Κίρσιο), *Convolvulus arvensis* (περιπλοκάδα), *Lamium amplexicaule* (δωδεκάνθι), *Papaver rhoeas* (κοινή παπαρούνα), *Raphanus raphanistrum* (ραπανίδα), *Sinapis arvensis* (άγριο σινάπι), *Solanum nigrum* (αγριοτοματιά).

Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια: *Datura stramonium* (τάτουλας), *Galium aparine* (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι), *Polygonum persicaria* (αγριοπιπεριά), *Veronica persica* (βερόνικα)

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

- Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.
- Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30°C.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Σιτάρι - κριθάρι: 60 ημ. — Αραβόσιτος: μη εφαρμόσιμο



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



Αρ. έγκρ. κυκλοφορίας: 7943/19-1-2011



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 0065000 ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289100
E-mail: contact@elanco.gr, www. elanco.gr

