

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:** Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις οσκέυματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

**ΚΑΡΟΤΟ:** Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση: 100 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη, από τα 3 - 4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-45). Για **Βέλαιουρα** (*Sorghum halepense*) με δόση: 200 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλαιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45). **ΚΡΕΜΜΥΔΑ:** Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση: 100 - 150 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη, από τα 3 - 4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-45). Για **Βέλαιουρα** (*Sorghum halepense*) με δόση: 200 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν ο βέλαιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45). **ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ:** Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση: 100 - 150 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη, από τα 3 - 4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-19). Για **Βέλαιουρα** (*Sorghum halepense*) με δόση: 200 - 250 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν ο βέλαιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-19). Για **άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:** με δόση: 250 - 300 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 έως τα 9 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-19). **ΠΑΤΑΤΑ:** Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση: 100 - 150 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη, από τα 3 - 4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-33). Για **Βέλαιουρα** (*Sorghum halepense*) με δόση: 200 - 250 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν ο βέλαιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-33). Για **άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:** με δόση: 250 - 300 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-33). **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΗΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ:** Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση: 100 - 150 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη, από τα 3 - 4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-33). Για **Βέλαιουρα** (*Sorghum halepense*) με δόση: 200 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη, από τα 3 - 4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-33). Για **Βέλαιουρα** (*Sorghum halepense*) με δόση: 200 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν ο βέλαιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-33). Για **άλλα πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:** με δόση: 250 - 300 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ. (BBCH 12-33). **ΣΚΟΡΔΟ (Χρήση ήσσονος σημασίας):** Για ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια με δόση: 100 - 150 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη, από τα 3 - 4 πραγματικά φύλλα μέχρι την αρχή του αδελφώματος (BBCH 12-45). Για **Βέλαιουρα** (*Sorghum halepense*) με δόση: 200 κ.εκ/ στρέμμα και όγκο ψεκ. υγρού 20 - 40 λίτρα / στρέμμα. **Ένας (1)** ψεκασμός από τα 2 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας, μέχρι ο βολβός να φτάσει στο 50% της τελικής του διαμέτρου και όταν ο βέλαιουρας είναι 15 εκ. (BBCH 12-45).

**ΠΑΡΑΠΗΡΗΣΙΣ 1:** Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του. 2. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο ανάπτυξης. 3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από την χρήση του οσκέυματος. Για την χρήση του οσκέυματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομμένων ή χρήση του οσκέυματος στην καλλιέργεια αυτή γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

**ΕΥΑΙΣΧΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ: Α)** Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Αγριβορώμη (*Avena barbata*, *Avena fatua*, *Avena sativa*), Αγριο ρύζι (*Oryza sp.*), Αλεπονομή (*Alopecurus pratensis*), Αμάχτοροχο (*Digitaria sanguinalis*), Βρόμος (*Bromus erectus*), Λειβοδόξα (*Poa pratensis*), Λεπτή ήρα (*Lolium rigidum*), Λεπτοχύρα (*Leptochyra caerulea*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Πολυάνθη ήρα (*Lolium multiflorum*), Σετάρια (*Setaria verticillata*), Φάλαρη (*Phalaris brachystachys*). **Β) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια:** Βηρικόδι (*Cynodon dactylon*), Αγρόσυρος (*Agropyron repens*), Βέλαιουρα (*Sorghum halepense*), Νεραργιόδα (*Paspalum distichum*), Πολυετής ήρα (*Lolium perenne*). **ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΑΙΣΧΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:** Πόα κοινή (*Poa annua*).

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Καρότο: 40 ημέρες. Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Κρεμμύδι, Πατάτα, Σκόρδο: 56 ημέρες. Βομβάκι, Ηλιάνθος: 100 ημέρες.

7GR1501-0008

# SELECT® 12 EC

## EC (Clethodim 12%)



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με προκλήσεις επιπτώσεις. Παρεταταιμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ:** Φυλάσσετε κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

Αποφεύγετε να αναπνεύσετε το ψεκαστικό υγρό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό φοράτε κατάλληλα γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο, παντελόνι, κάλτσες και ανθεκτικά υποδήματα. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν εισαχθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό. **Μην προκαλείτε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Αναφραστείτε ότι το σκέυασμα περιέχει διαλυτή υδρογονάνθρακα. **Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκέυασμα ή τη συσκευασία του.** Για να προστατέψετε τα φυτά μη σκέυασμα να αφηστέ μιαν αδιάκεστη ζώνη προστασίας από μια καλλιεργούμενη γη: 10 μέτρων, με τη χρήση συμβατικών ακροφυσίων ή 5 μέτρων, με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Περιεχόμενο: **1L**

ZIZANIOKTONO

**Τρόπος εφαρμογής:** Μεταφυτρωτικό ψεκασμός φυλλώματος με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους, μπλεκ τύπου σκούπας, πίεση 2 - 3 atm, με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα και υπό συνεχή ανάδευση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διάλυματος εφαρμογής:** Ανακινείστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μίχρου τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συστώσιμνη δόση του σκέυασματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Μετά τον ψεκασμό και για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκαστικό μέσο, αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκέυασματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα: --**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ριχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείαις ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκέυασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκληθεί:** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαράγωγή ή πολλαπλασιασμό. **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** - Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιέργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. - Αν αναμένεται προχρόστιμο εντός τουλάχιστον μίας ώρας από τον ψεκασμό, μην ψεκαστέτε. - Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη. Μην το εφαρμόζετε όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε συνθήκες στρες από ξηρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες. - Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει για να μην προκαλούνται ζημιές σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες όπως τα σπηρά και το καλαμπόκι.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσει καλλιέργεια σπηρτων, είναι αναγκαία μια περίοδος αναμονής 3 μηνών πριν τη σπορά.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκέυασμα:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνωθεί πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό εάν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκαλλιεργητικές συνθήκες.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκέυασματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαριθμωμένη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία < 35°C, μακριά από την έκθεση σε ακτίνες UV και πηγές ανάφλεξης ή ανοικτή φλόγα. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό. **Μην προκαλείτε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως γιατρό. Αναφραστείτε ότι το σκέυασμα περιέχει διαλυτή υδρογονάνθρακα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εφόσον παραμένει ο ερεθισμός. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

GR-CDI-024-05 (03/19)



1GR0501-0033/C19