



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Symbol™
22,5 SC

ZIZANIOKTONO


Symbol™
22,5 SC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Το **Symbol™ SC** είναι ένα νέο προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο σημαντικών-δυσκολοεξώντοτων πλατυφύλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια της **Ελιάς** και των **Εσπεριδοειδών**.

Ταυτότητα προϊόντος

ΣΥΝΘΕΣΗ:	Penoxsulam 15% β/ο Florasulam 7.5% β/ο
ΜΟΡΦΗ	
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:	SC αιώρημα συμπυκνωμένο
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΣΗ:	8-10 κ.εκ. σκευάσματος/στρ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΡΑΣ:	B (αναστολέας ALS)



Symbol™ 22,5 SC

Καινοτόμο
ζιζανιοκτόνο
που προσφέρει
στον παραγωγό:



Έλεγχο πολλών σημαντικών
πλατυφύλλων ζιζανίων



Εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια



Μεγάλη διάρκεια δράσης



Μικρή δόση εφαρμογής




Υψηλή αποτελεσματικότητα



Καθόλου υπολείμματα στον καρπό και
το παραγόμενο προϊόν

Στάδιο
εφαρμογής

Symbol™ 22,5 SC




Αποτελεσματικότητα Symbol™ SC σε πλατύφυλλα ζιζάνια

Το Symbol™ SC είναι προϊόν που αποτελείται από δυο δραστικές ουσίες: το **penoxsulam** και το **florasulam** τα οποία είναι αναστολείς του ενζύμου ALS (*acetolactate synthase*). Απορροφάται από το ριζικό σύστημα και από το φύλλωμα του ζιζανίου στόχου προκαλώντας αναστολή της ανάπτυξης του. Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μέσα στις επόμενες 1 έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες.

Symbol™ 22,5 SC

Δράση σε πλατύφυλλα ζιζάνια*



* Αποτελεσματικότητα %

Ζιζάνια που καταπολεμούνται:

Λουβουδιά *Chenopodium album* (CHEAL), Βλήτο τραχύ *Amaranthus retroflexus* (AMARE), Βλήτο πλαγιαστό *Amaranthus blitoides* (AMABL), Ζωχός *Sonchus oleraceus* (SONOL), Αγριοτομάτα, Στύφνος (*Solanum nigrum*) (SOLNI), *Diplotaxis virgata* (DIPVG), Δωδεκάνθι (*Lamium amplexicaule*) (LAMAM), Στελλάρια (*Stellaria media*) (STEME), Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis*) (SONAR), Κόνυζα (*Conyza Canadensis* (ERICA), *Conyza bonariensis* (ERIBO)), Λοψάνα (*Sinapis arvensis*) (SINAR), Καλέντουλα (*Calendula arvensis*) (CLDAR), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)

1. Σε περιπτώσεις παρουσίας Καλέντουλας (*Calendula arvensis*), Λουβουδιάς (*Chenopodium album*) και πλαγιαστού Βλήτου (*Amaranthus blitoides*), να εφαρμόζεται η δόση των 10 κ.εκ. σκ./στρέμμα.
2. Μέτρια αποτελεσματικό στα ζιζάνια Μολόχα άγρια (*Malva sylvestris*) (MALSI) και Ευφόρβια (*Euphorbia chiapensis*) (EPHCl).

Φάσμα δράσης



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Ελιά	Εσπεριδοειδή
ΣΤΟΧΟΣ	Πλατύφυλλα ζιζάνια	Πλατύφυλλα ζιζάνια
ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	8 - 10 κ.εκ/ στρέμμα (max)	8 - 10 κ.εκ/ στρέμμα (max)
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Κατευθυνόμενη προφυτρωτική εφαρμογή στις σειρές φύτευσης, αποφεύγοντας να ψεκάζονται φύλλα, βλαστοί, παραφυάδες και σημεία κλαδέματος την άνοιξη ή το φθινόπωρο	Κατευθυνόμενη προφυτρωτική εφαρμογή στις σειρές φύτευσης, αποφεύγοντας να ψεκάζονται φύλλα, βλαστοί, παραφυάδες και σημεία κλαδέματος την άνοιξη.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	1	1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ	15	30

Symbol™

22,5 SC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Εφαρμογές προφυτρωτικές ως προς τα ζιζάνια στόχους

Εφόσον το προϊόν εφαρμόζεται προφυτρωτικά των ζιζανίων (σε γυμνό έδαφος) τα ζιζάνια τα οποία είναι ήδη φυτρωμένα πρέπει να καταπολεμηθούν προ της εφαρμογής με κατεργασία του εδάφους, ή με τη χρήση ενός κατάλληλου μεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου ευρέως φάσματος.

Εφαρμόζεται μόνο σε εγκατεστημένες φυτείες από τον τρίτο χρόνο μετά την φύτευσή τους και αργότερα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του φυτού.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



Αριθμός Άδειας Διάθεσης του Προϊόντος στην Αγορά (Α.Α.Δ.Α): 70104 / 11-2-2015

TM®: Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της

ΕΛΑΝΚΟ

Τά πάντα δίπλα σου!

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 213 006 5000 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 2310 289 100

E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr