

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

AVADEX® FACTOR | SENIOR™ 75WG | MUSTANG™ 306SE |
LANCELOT™ 450WG | DICOPUR | FLAME DUO | MINSTREL | EMINENT 125EW





Το **Avadex® Factor** είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων, σε σιτάρι και κριθάρι. Η δραστική ουσία tri-allate δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των λιπιδίων. Απορροφάται από τους σπόρους, τους βλαστούς και τις ρίζες των ευαίσθητων ζιζανίων, αναστέλλοντας την ανάπτυξή τους.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Ομοιόμορφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά της καλλιέργειας και προφυτρωτικά των ζιζανίων με μηχανοκίνητα μέσα, μπεκ τύπου σκούπας,

πίεση ψεκαστικού όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και υπό συνεχή ανάδευση. Το **Avadex® Factor** εφαρμόζεται στη δόση των 360 κ.εκ. σκ./στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ευαίσθητα:

- Μικρόκαρπη φάλαρη (*Phalaris minor*)
- Κοινή πτόα (*Poa annua*)

Μετρίως ευαίσθητα:

- Αγριοβρώμη (*Avena fatua*)
- Πολύανθη ήρα (*Lolium multiflorum*)

Το **SENIOR™ 75WG** είναι ένα ζιζανιοκτόνο με στόχο την καταπολέμηση σημαντικών αγρωστωδών και ορισμένων πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια σιταριού. Το **SENIOR™ 75WG** περιέχει την δραστική ουσία **pyroxulam**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

- **Σιτάρι:** Με την εμφάνιση 1^{ου} αδελφίου ως την εμφάνιση του 1^{ου} κόμβου.
- **Ζιζάνια:** Για τα αγρωστώδη στο στάδιο των 3-5 φύλλων και για τα πλατύφυλλα από το στάδιο 2-4 φύλλα έως 6-8 φύλλα.

Η συνιστώμενη δόση εφαρμογής του **SENIOR™ 75WG** είναι 20-25γρ. ανά στρέμμα σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικό παράγοντα και με όγκο ψεκαστικού υγρού 10-40λτ./στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ετήσια Αγρωστώδη:

Ευαίσθητα:

- Αγριοβρώμη (*Avena spp.*)
- Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)
- Βρόμος (*Bromus spp.*)
- Ήρα (*Lolium spp.*)

Μετρίως ευαίσθητα:

- Φαλαρίδα (*Phalaris sp.*)

Ετήσια Πλατύφυλλα:

Ευαίσθητα:

- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Σινάπι (*Sinapis arvensis*)

Μετρίως ευαίσθητα:

- Κολλητσίδα (*Galium aparine*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)

Το **MUSTANG™ 306SE** είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο. Δρα ως αναστολέας ανάπτυξης (**florasulam**: ALS / 2,4D: συνθετική αυξίνη) και καταπολεμά ετήσια και πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι) έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. Το **MUSTANG™ 306SE** εφαρμόζεται στη δόση των 60-80 κ.εκ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού υγρού 30-40 λίτρα/στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- Κολλητσίδα μικρόκαρπη (*Gallium spurium*)
- Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Gallium aparine*)
- Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)
- Στελλάρια (*Stellaria media*)
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)
- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*)
- Άδωνις (*Adonis aestivalis*)
- Μπιφόρα (*Bifora radians*)



Το **LANCELOT™ 450WG** είναι ένα διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο). Το **LANCELOT™ 450WG** είναι αποτελεσματικό σε ένα ευρύ φάσμα ζιζανίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Το **LANCELOT™ 450WG** εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια (σιτάρι, κριθάρι) βρίσκεται στα στάδια της έναρξης του αδελφώματος έως και την εμφάνιση του δεύτερου κόμβου. Στα ζιζάνια το στάδιο εφαρμογής είναι από τα 2-8 φύλλα. Το **LANCELOT™ 450WG** εφαρμόζεται στη δόση των 3,3 γρ./στρέμμα και με όγκο ψεκαστικού διαλύματος 10-40 λίτρα/στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- Ανθεμίδα (*Anthemis arvensis*)
- Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Polygonum convolvulus*)
- Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
- Κίρσιο (*Cirsium arvense*)
- Μεγαλόκαρπη Κολλιτσιόδα (*Gallium aparine*)
- Παπαρούνα (*Paraver rhoeas*)
- Ραπανίδα (*Raphanus raphanistrum*)
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Στελλάρια (*Stellaria media*)
- Αγριομαργαρίτα (*Chrysanthemum segetum*)
- Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis*)
- Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla*)
- Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)

Το **Dicopur** είναι μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη) και το χλοοτάπητα. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη αύξηση των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή των φύλλων και των νεαρών βλαστών τους και επηρεάζει την αναπνοή, τα αποθέματα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, και την κυτταρική διαίρεση. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 40-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα για τα σιτηρά. Χρησιμοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες. Το **Dicopur** εφαρμόζεται στη δόση των 85-120 κ.εκ. σκ./στρέμμα στα ετήσια και 125 κ.εκ. σκ./στρέμμα στα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ετήσια ζιζάνια:

- Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)
- Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*)
- Αλμυρίδι (*Salsola kali*)
- Ασπράγκαθο (*Xanthium spinosum*)
- Βλήτα (*Amaranthus spp.*)
- Ήμερο σινάπι (*Sinapis alba*)
- Ζωχός (*Sonchus spp.*)
- Θλάστι (*Thlaspi spp.*)
- Καφέλλα (*Capsella bursa-pastoris*)
- Λουβουδιά (*Chenopodium album*)
- Σισύμπριο (*Sisymbrium irio*)
- Τάτουλας (*Datura stramonium*)
- Ρανούγκουλος (RANAR)(*Ranunculus arvensis*)
- Ραπανίδα (RAPRA) (*Raphanus raphanistrum*)

Πολυετή ζιζάνια:

- Κίρσιο (*Cirsium arvense*)
- Λάπαθα (*Rumex spp.*)
- Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*)



Flame Duo

florasulam 10,4% β/β + tribenuron-methyl 25% β/β

Το **Flame Duo** είναι διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τις ρίζες των ζιζανίων και μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (ALS), με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων και την αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων μέσα στις επόμενες ημέρες από την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με μπεκ τύπου σκούπας με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες και υπό συνεχή ανάδευση με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα. Το **Flame Duo** εφαρμόζεται στη δόση των 4-6 γρ./στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Ευαίσθητα:

- Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)
- Στελλάρια (*Stellaria media*)

Μετρίως ευαίσθητα:

Κολλητσίδα (*Galium aparine*)

Minstrel

fluroxypyr 20% β/ο
(υπό μορφή fluroxypyr meptyl ester 29,55% β/ο)


Το **Minstrel** είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πλατύφυλλων ζιζανίων (δικοτυλήδονα) στα σιτηρά (χειμερινά και ανοιξιάτικα) και στον αραβόσιτο. Η δραστική ουσία fluroxypyr απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη των ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της ανάπτυξής τους. Παρεμβαίνει επίσης στον μεταβολισμό του αζώτου και στην ενζυμική παραγωγή. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μερικές ημέρες έως και εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων, μεταφυτρωτικά με 20-40 λίτρα ανά στρέμμα. Το **Minstrel** εφαρμόζεται στη δόση των 75-100 κ.εκ. σκ./στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine*)



Eminent 125EW

tetraconazole 12,5% β/ο

Το **Eminent 125EW** είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο ευρέως φάσματος με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Περιέχει την δραστική ουσία tetraconazole της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) που παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης στις κυτταρικές μεμβράνες των μυκήτων.

ΔΟΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

90-100 κ.εκ./στρέμμα

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Σιτάρι Μαλακό - Σκληρό:

Σκωρίαση κίτρινη, καφέ, μαύρη, Σεπτορίωση



- Πριν την εφαρμογή να γίνεται έλεγχος για την σωστή ρύθμιση του ψεκαστικού μηχανήματος και έλεγχος του εξοπλισμού (χρήση σωστού τύπου μπεκ, ρύθμιση της πίεσης ψεκασμού).
- Κατά την εφαρμογή να γίνεται σωστός ψεκασμός ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του χωραφιού.

AVADEX® FACTOR

DICOPUR

SENIOR™ 75WG

FLAME DUO

MUSTANG™ 306SE

MINSTREL

LANCELOT™ 450WG

EMINENT 125EW



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Senior™ 75WG Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70264/18-12-2017
Mustang™ 306SE Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 7677/21-11-2006
Lancelot™ 450WG Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70245/08-09-2017
Avadex® Factor Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70553/11.09.2024
Dicopur Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70506/ 15.11.2023
Flame Duo Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70499/11.09.2023
Minstrel Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70450/24.03.2022
Eminent 125EW Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60931/06.02.2020

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΑ

Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 213 006 5000

ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100

e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

