

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Διάθεση περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον ψεκασμό. • Σε περίπτωση επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε μακρύ παντελόνι, μακριμάνικη μπλούζα και γάντια.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικά:** Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για 15 λεπτά αφαιρώντας τους φακούς επαφής και καλέστε αμέσως γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ζεστό και ξεπλύνετε. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

**Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**  
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στις καλλιέργειες των σιτηρών και του αραβόσιτου.

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Το AMISTAR 25 SC είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελθασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σποριών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σποριών, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο συμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:**

**Ρύζι:** Για Πυρκαϊούλαρη (Pyricularia oryzae), Ελμινθόσπορια (Helminthosporium oryzae) με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-40 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος. Από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημασίας έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 45-61). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται από την έναρξη της έκπτυξης του φύλλου σημασίας έως την έναρξη της έκπτυξης της ταξιανθίας (BBCH 45-51), και η δεύτερη εφαρμογή εάν κρίνεται απαραίτητη από το στάδιο όπου το 70% της ταξιανθίας έχει εμφανισθεί έως και την έναρξη της άνθησης (BBCH 57-61). **Σιτάρι, Τριτικάλε, Tritordeum, Σίκαλη:** Για Σεπτορίωση (Septoria tritici), Σκωρίαση (Puccinia triticina) με δόση 60-100 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμίκυνσης του στελέχους έως το τέλος της άνθησης (BBCH 30-69). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Βρώμη, Κριθάρι:** Για Σεπτορίωση (Septoria tritici), Σκωρίαση (Puccinia triticina) με δόση 60-100 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της επιμίκυνσης του στελέχους έως την πλήρη έκπτυξη του στάχους (BBCH 30-59). Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Αραβόσιτος (για ενσίρωση και για παραγωγή σπόρων):** Για Setosphaeria turcica με δόση 100 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκ. υγρού 20-30 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη της άνθησης (BBCH 61) και 21 ημέρες μετά. Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται.

L1046468 GREC/9W PPE4100044



**Amistar®**  
25 SC

syngenta.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Επιβλαβές σε περιπτώσεις εισπνοής.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Azoxystrobin (χημική ομάδα στρομπιλουρινών)  
**Πυκνό εναιώρημα (SC)**

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60686/14.06.2018

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**  
**Azoxystrobin 25% β/ο**  
**Βοηθητικές ουσίες 76,2% β/β**

**Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών.**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.**

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.**  
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49  
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr  
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 lt e

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:**

Ρύζι: 28 ημέρες.

Σιτάρι, Τριτικάλε, Tritordeum, Βρώμη, Σίκαλη, Κριθάρι: 35 ημέρες.

Αραβόσιτος: ----.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίκνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: --**

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούργειας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσσει:**

- Μην ψεκάζετε όταν το εδάφος είναι παγωμένο ή ξηρό.
- Προσοχή κατά την εφαρμογή όταν η διηθητική καλλιέργεια είναι μηλιά, δαμασκηνιά, κερασιά.
- Στην καλλιέργεια του ριζιού να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο μικρότερη από 30%.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2 ανά καλλιεργητική περίοδο.
- Εφαρμόστε το AMISTAR 25 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπιλουρινών (QoIs) με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
- Εφαρμόστε το AMISTAR 25 SC προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.

**Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

**Φυτοεξικτότητα:**

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Το AMISTAR 25 SC, είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το AMISTAR 25 SC, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να φθάσει σε γειτονικά καλλιέργεια μηλιάς. Ψεκαστικά μέσα που είχαν χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το AMISTAR 25 SC, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.

**Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:**

Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

