

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δοσολογίες και οδηγίες χρήσης.

- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- Ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 2atm.

07/2016



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
70036/8-4-2013



ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ.: 213 006 5000

ΘΕΣ/ΚΗ: τηλ.: 2310 289 100 • e-mail: contact@elanco.gr • www.elanco.gr

Gowan

Bonalan 180EC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Σίγουρο - Σταθερό
Αποτελεσματικό

Bonalan 180EC

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

Benfluralin 18% β/ο



Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των δινιτροανιλίνων για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστώδων και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.

Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος & χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιαστήματα επεμβάσεων
		όγκος ψεκ. υγρού lt/στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα		
 • Μηνδική • Τριφύλλι	Ετήσια αγρωστώδη & πλατύφυλλα ζιζάνια	20 - 40	700	Προσπαρτικά με ενσωμάτωση	1 εφαρμογή
 • Μαρούλι			800	Προσπαρτικά ή πριν τη μεταφύτευση με ενσωμάτωση	
 • Φασόλι χλωρό • Αρακάς χλωρός • Κτηνοτροφικά μπιζέλια			600		
 • Ραδίκι • Αντίδι			600		

Ζιζάνια που καταπολεμούνται

- Αλεπονουρά (*Alopecurus myosuroides*)
- Αιματόχορτο (*Digitaria* sp.)
- Μουχρίτσα (*Echinochloa crus galli*)
- Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum*)
- Στριγγλόχορτο (*Atriplex patula*)
- Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus*)
- Λουβουδιά (*Chenopodium album*)
- Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Bilderdykia convolvulus*)
- Βερόνικα (*Veronica* sp.)
- Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*)
- Αντράκλα (*Portulaca oleracea*)



Μουχρίτσα



Λουβουδιά



Βλήτο τραχύ



Αντράκλα

Χρόνος εφαρμογής

- ▶ Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα.
- ▶ Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων.
- ▶ Δεν καταπολεμά φυτρωμένα ζιζάνια.
- ▶ Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση.

Πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης

- ▶ Μπορεί να γίνει πολλές ημέρες έως λίγο πριν τη σπορά.
- ▶ Γίνεται με άνεση χρόνου.
- ▶ Οι καιρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής.
- ▶ Το ζιζανιοκτόνο δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί σε υγρό έδαφος ούτε να ακολουθήσει βροχή ή πότισμα.

Τρόπος ενσωμάτωσης

- ▶ Το σκεύασμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο μέσα σε 4 ώρες μετά τον ψεκασμό για να μη χάσει σημαντικό μέρος από τη δραστηριότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκασμός και η ενσωμάτωση πρέπει να γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμιγνύεται το σκεύασμα πολύ καλά με το χώμα. Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται σε βάθος 5-10 εκ.